



28,925/A
200

A x p

54.2

p

~~all the other~~

~~of the other~~

~~of the other~~

Hippocrates IV d.

42900

SPECVLVM
HIPPOCRATICVM
NOTAS ET PRAESAGIA
MORBORVM
NEC NON
VARIA MEDENDI PRAECEPTA
EX MAGNI
HIPPOCRATIS COI
MONVMENTIS
PRAESERTIM APHORISTICIS
ORDINE ALPHABETICO
SIMVLQVE AD PRAXIN COMMODO
DIGESTA OB OCVLOS PONENS
IN VSV
SACR. GENTIS ASCLEPIADEAE
CONCINNATVM
EDITIO ITALICA PRIMA.



FLORENTIAE MDCCLX.
APVD ANDREAM BONDVCCIUM
FACVLTATE PVBLICA.

Πάντων τῶν πρὸς τὴν πρόρρησιν ἡγεμῶν
ἐστὶν ὁ θαυμάσιος ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ.

Omnium, quae ad praedictionem, prin-
ceps est divinus ille HIPPOCRATES.

GAL. in L III. Epid. I. 8.

Διδάσκαλος καὶ τούτων τῶν γνωρισμάτων,
ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων, ὁ θαυ-
μάσιος ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ.

Eiuscemodi signorum auctor, aequae ac
reliquorum omnium, mirus est HIP-
POCRATES.

GAL. L. de Temper. II. 14.

Ὁ μὲν ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ συμπάντων ἡμῶν
τῶν ἀρίστων μαθημάτων ἡγεμῶν.

HIPPOCRATES nobis omnibus fuit dux
atque auctor optimarum disciplinarum.

GAL. L. de Cris. III. 11.





LECTORI BENEVOLO

ANDREAS BONDVCCIUS.

SPECVLVM HIPPOCRATICVM ,
frugiferum & perrarum
summi Viri Rudolphi Zain-
geri Opus , tibi offero , ami-
ce Lector . Hoc me ut iterum in
lucem proferrem auctores fuerunt
olim duo Sapientiae Ornamenta ,
ac Etruscae Medicinae Columina ,
Antonius Cocchius , & Iosephus
Bertinius , qui meritis & monu-
mentorum gloria invidiam supera-
runt . Tantorum Virorum iudicio &
consilio suffultus , onus suscepi , quo
tandem mihi , DEO annuente , de-
fungi licuit . Attamen eam utilita-
tem ,

rem, quam ex nova hac Editione
Medicae Facultati promanaturam
speramus, Bernardi, atque Anto-
nii Bertini fratrum humanitati de-
bemus; qui memorati Iosephi, cla-
rissimi eorum parentis, in arduo
Doctrinae, Honestatis, ac Benefi-
centiae tramite vestigiis insistentes,
mibi unicum in Etruria, & for-
tasse alibi, huiusce voluminis Exem-
plar ex lectissima, qua pollent,
bibliotheca bono publico utendum
concesserunt. Hoc igitur Opus, be-
nigne Lector, hilari fronte excipias,
rogo: quod si, ut est in votis, conti-
gerit, animos addes, quò haud mi-
nus probanda, ac profutura scripta
in lucem edere aggrediar. Inter
quae principem locum sibi vindica-
bunt Opuscula, quotquot exstant,
Italice elaborata eximii Viri Anto-
nii Cocchii, quae mense Martio
insequentis anni 1761. e meo ty-
pographio prodibunt. Vale.



ORNATISS. AUDITORIBVS
SVIS

SACRAE GENTIS ASCLEPIADEAE
ALVMNIS

IO. RVDOLPHVS ZVINGERVS
S.

CVM in faciendâ medicina, tantum sit usus, ac necessitatis, Semielologiae studium, iam ab incunabulis susceptae praxeos clinicae, existimavi non levis in hac arte ponderis esse, notas & praesagia morborum, in scriptis magni HIPPOCRATIS Coi, praesertim aphoristicis, memoriae prodita. Quare animum subiit, eius observata ad singulares casus, subinde inter medendum obvios applicare, & quantum divinae naturae responderent, animadvertere. Id faciendo non sine animi voluptate didici, eum

non minus in morborum signis, quam
Therapiae praeceptis stabiliendis, naturam
ducem, & experientiam magistram, mi-
ra solertia & fidelitate secutum esse,
eiusque adeo placita, paucioribus exce-
ptis, si recte intelligantur, & cum pru-
denti iudicio accipiantur, tanquam soli-
dae veritatis axiomata haberi posse. Ex
quo valde placuit institutum HONORATI
BICAISII (1), quando ad singulos morbo-
rum titulos alphabetice digestos, omnia
HIPPOCRATIS effata eo spectantia, ex
eius Aphorismis, Praenotionibus, Prae-
dictis, & Coacis in unum collecta, ob
oculos posuit, sicque & repertu, & co-
gnitu faciliora reddidit. Quali etiam
consilio LUCAS VERHOED, Aphorismis
a se editis Lugd. Bat. 1685. indicem
locupletissimum, iuxta seriem morborum
methodice digestum subiunxit. Ac no-
vae aphorismorum editioni Tubingenfi
1730. pariter Synopsis eorundem per
locos communes digesta accessit. Vnde
visum est, in Semeiologia & Therapia
morborum adhuc maiori usui futurum,
si tam multae ac variae sententiae in
monumentis HIPPOCRATIS, praeser-
tim

(1) Vid. Manuale Medicorum, s. Synopsis aphorismo-
rum Hippocratis. 12. Lond. 1659. & Genevae 1660.

rim aphoristicis , longe lateque disper-
sae , servata utcunque alphabeti serie ,
in ordinem praxi medicae commodum
redigerentur . Eo consilio concinnatum
hoc Speculum , quae ad diagnosin , pro-
gnosin , & therapiam morborum faciunt ,
seorsim & distincte tradit . Dein quoad
diagnosin , causas evidentes praegressas ,
tum notas antecedentes , vel comitan-
tes ; & quoad prognosin , notas & prae-
sagia salutis , vel periculi , vel mortis ,
vel etiam novi morbi futuri , discretis
articulis ob oculos ponit . Demum quoad
therapiam , regulas medendi , ubi forte
plures occurrunt , ad suum quasque
fontem relatas exponit . Ita velut in
promptuario , praecipua quaeque HIP-
POCRATIS dogmata uno quasi conspe-
ctu obvia habentur , alioqui in vastis
eius operibus non sine labore inquiren-
da . Quod si tamen ipsos fontes adire
lubeat , eo haec ipsa synopsis faciliore
via Vos manuducet , si loca allegata in
opusculis aphoristicis iunctim editis , inspi-
cere atque consulere , interdum loca
plura parallela conferre , demum si quae
alibi exstant , ea in ceteris eius scriptis
legere haud gravemini . Sic pro arbi-
tratu vestro , aut ex rivulis haurire ,
aut ex ipso fonte & scaturigine sitim re-
gias



S P E C V L V M

HIPPOCRATICVM.



ABORTVS.

NOTAE AD DIAGNOSIN SPECTAN-
TES.

CAVSÆ ANTECEDENTES.

Ver boreale, siccum, & tempestosum, post hiemem
austrinam, pluuiosam, & clementem. *De Aer. Aqu.*
& *loc. XXVI. 4.*

Acrida, aut amara ingesta, praeter consuetudinem, dum
adhuc parvulus est fetus. *De Morb. Mul. I. XLII.*

Febres cum vehementi attenuatione, absque manifesta
occasione, in gravidis. *Aph. V. 55.*

Mulier in utero gerenti, si alvus multum fluxerit, pe-
riculum ne abortiat. *Aph. V. 34.*

Mulier in utero gerenti tenesmus superveniens, abor-
tire facit. *Aph. VII. 27.*

Mulier in utero gerens secta vena abortit: & magis, si
maior fuerit fetus. *Aph. V. 31.*

A

Quae

Quae praeter naturam tenues existentes in utero gerunt, abortiunt, priusquam crassescant. *Aph. V. 44.*

NOTAE ANTECEDENTES.

Mulieri in utero gerenti, si mammae ex improviseo graciles fiant, abortit. *Aph. V. 37.*

Mulieri in utero gerenti, si altera mamma gracilis fiat, gemellos gestanti, alterutrum abortit. Et siquidem dextra gracilis fiat, marem; si vero sinistra, feminam. *Aph. V. 38.*

Quae perditurae sunt fetus, his mammae graciles fiunt. Si vero rursus durae fiant, dolor erit, aut in mammis, aut in coxis, aut in oculis, aut in genibus, & non perdunt. *Aph. V. 53.*

Spirationes suspiriosae, quae foras educuntur, ac citra rationem facta colliquatio, in uterum gerentibus, abortiones indicant. *Coac. 519.*

Quae suspiriosae spirationes foras educuntur in febribus, abortionis periculum afferunt. *Coac. 540.*

Si mulier uterum gerens, ventrem aut lumbos doleat, metuendum est, ne fetum abortiat, membranis ipsum cingentibus disruptis. *De Morb. Mul. I. XLII.*

NOTAE AD PROGNOSIN SPECTANTES,

NOTAE PERICULI.

Quae ex partu, & abortu, copiosa celeriter cum impetu feruntur, si subsistant, molestiam exhibent. Huiusmodi mulieribus rigor inimicus est, & alvi perturbatio, praecipue vero, si praecordiorum dolore vexentur. *Coac. 516.*

Ex abortione ubi alba derepente percurrunt, si rigor aliquis corripiat, & ad femur impetus fiat, tremor molestus subit. *Coac. 543.*

NOTAE LETHALES.

Ex laterum inanitate ad tenue intestinum migrantes dolores, in diuturnis morbis, ex abortione, neque admodum purgata muliere, perniciem denunciant. *Coac. 515.*

ABSCES.

ABSCESVS IN GENERE.

AD DIAGNOSIN.

CAVSÆ ANTECEDENTES.

Si in ventrem sanguis effusus fuerit praeter naturam, necesse est suppurari. *Aphor. VI. 20.*

Abscessus magis hieme fiunt, tardiusque cessant, & minus recurrunt. *Praenot. 143.*

Quibus ad palatum humor colligitur, plerumque in pus vertitur. *Coac. 238.*

NOTAE ABSCESVS FUTURI.

Circa puris generationes, dolores & febres magis accidunt, quam ipso facto. *Aph. II. 47.*

Alvi durities cum dolore, in febribus horroris sensu insignibus, ac cibi fastidio laborantibus, nisi paulum humectata alvo purgationem faciat, ad suppurationem tendet. *Coac. 303.*

Lumborum & inferiorum partium dolores, cum febre, si relictis inferioribus septum transversum appetant, neque aliud periculosum signum accesserit. *Coac. 108.*

Praecordia tumida, dura, ac dolentia, ubi dies 20. superarunt, & febris detinuerit. *Coac. 280.*

Praecordia tumida, mollia, & doloris expertia, si manente febre, intra 60. non desinunt. *Coac. 281.*

Urina cruda, diu perseverans, cum reliquis signis fatalibus, abscessum & dolorem, praecipue infra septum transversum, denunciat. *Coac. 582.*

NOTAE LOCI SUPPURANDI.

Quibus ex morbo resurgentibus aliquid dolet, ibi abscessus fiunt. *Aph. IV. 32.*

Sed &, si quid doluerit ante morbum, ibi se figit morbus. *Aph. IV. 33.*

NOTAE ABSCESVS FACTI.

Doloris ac febris remissio. *Aph. II. 47.*

Quibus suppuratum quid in corpore existens, nullum sui signum prodit, his propter crassitudinem puris, aut loci, sui signum non exhibet. *Aph. VI. 41.*

In angere, & pervigilio vexatis, ad aures abscessus maxime obveniunt. *Coac.* 563. *Praedict.* I. 157.

Convulsio cum tremore, corporis iactatione, & implaciditate, ac alto stupore, quem *catochon* vocant, parvulorum circa aures obortorum abscessuum spem facit. *Praedict.* I. 162.

In capitis dolore, sopor, & furditas, aliquem ad aures abscessum effundunt. *Praedict.* I. 168.

Praecordiorum contensio, cum sopore, corporis incontinenti iactatione, & capitis dolore, tubercula ad aures attollit. *Praedict.* I. 169. *Coac.* 189.

Qui sopore detinentur, cum corporis incontinenti iactatione, praecordiorum dolore, & pauca vomitione, in iis tuberculorum ad aures exortum sperare oportet. Sed & antea, quae circa faciem contingere solent, in considerationem adhibere convenit. *Praedict.* I. 165. *Coac.* 183. 185.

Quae convulsioni in morem affligunt, cum alto stupore, quem *catochon* vocant, abscessus ad aures excitant. *Praedict.* I. 161.

Ex furditate abscessus ad aures contingere, consentaneum est, praesertim vero si implaciditas quaedam, aut inquiet corporis iactatio succedat. Ac inter hos in iis, qui sopore detinentur, ista magis sperare oportet. *Praedict.* I. 159. *Coac.* 209.

In spirituosius, & anhelatoribus, morbo regio laborantibus, & febre acuta, cum praecordiorum duritie, & tumore, si corporis summa perfrigerentur, magnorum circa aures abscessuum exortum fortassis expectare oportet. *Praedict.* I. 164.

In his considerandum, in quibus speramus abscessus circa aures futuros, num ex capite doleant? num superiorum partium tenuibus sudoribus diffuant? numquid etiam subinde novum rigorem sentiant? an forte etiam alvi affatim prorumpant? aut aliquo sopore detineantur? *Coac.* 203.

Viden-

ABSC.

Videndum quoque, num & in his urina diluta, cum sublimibus quibusdam in medio suspensis, albidis? & aliquantum variantia, exalbiantia, aut graveolentia appareant? *Ibid.*

AD PROGNOSIN.

NOTAE SALVTIS.

Tussiculæ, quæ cum crebris oris sputationibus procedunt, tubercula ad aures emolliunt. *Coac.* 204. *Prædict.* I. 167.

NOTAE PERICVLI.

Graves aurium abscessus, qui citra indicationem sensim conquiescunt, & dissipantur, damno sunt. *Prædict.* I. 170.

Tubercula ad aures excitata, in leviter sideratis, malo sunt. *Coac.* 202.

In tumoribus ad aures, urinae celeriter, ac pauco tempore concoctæ, damno sunt. Quin & perfrigerari, itidem malum est. *Coac.* 205.

NOTAE LETHALES.

In diuturnis morbis, suppurati ad aures tumores, nisi pus admodum album, ac sine odore reddant, exitium, præcipueque mulieribus afferunt. *Coac.* 206.

Ex præcipitibus morbis, in febribus ardentibus maxime, tubercula ad aures exoriuntur, ac nisi iudicæ torie solvantur, & maturescant, aut sanguis ex naribus profluxerit, aut crassum sedimentum urina acciperit, aegros interimunt. *Coac.* 207.

ABSCESSVS AD CRVRA.

AD PROGNOSIN.

NOTAE SALVTIS.

Abscessus ad crura, in peripneumoniis gravibus, ac periculosis, omnes quidem utiles sunt: optimi vero, qui fiunt, dum iam sputum in mutatione est. *Prædict.* 114. *Coac.* 396.

Si tumor, & dolor fiat, sputo pro flavo purulento evadente, & foras procedente, ita securissime homo superstes evaserit, & abscessus absque dolore celerime sedabitur. *Ibid.*

NOTAE PERICULI.

Si neque sputum pro ratione excernitur, neque in urina bonum apparet sedimentum, periculum est, ne claudicet aeger, aut ne res multum negotii sit exhibitura. *Coac. 306. Praenot. 119.*

Si abscessus intro recurrant, perseverante febre, neque prodeunte sputo, periculum aut mortis, aut delirii imminet. *Coac. 396. Praenot. 116.*

ABSCCESSVS AD GINGIVAS.

Moderatus capitis dolor, cum inexhausta siti, aut sudore febrem non solvente, gingivarum abscessus, aut circa aures tubercula denuntiat, nisi alvus erumpat. *Coac. 173.*

Dentis fideratio abscessum ad gingivas enatum solvit. *Coac. 236.*

ABSCCESSVS AD HYPOCHONDRIA.

Quae quidem suppurationes foras vertuntur, optimae sunt, ubi parvae sunt, & quam maxime foras feruntur, & in acutum tendunt. *Praenot. 38.*

Pessimae vero, quae magnae sunt, & latae, minimeque in mucronem attolluntur. *Praenot. 39.*

At quae intro rumpuntur, optimae, ubi nihil cum externa sede communicant, in sese contrahuntur, nullo dolore afficiunt, totaque regio externa unius coloris apparet. *Praenot. 40.*

ABSCCESSVS IN LATERE.

Si in latere tuberculum nascatur, & suppuratus fiat, haec paritur; Rigor tenet, & febris, & tussis sicca, per multos dies; & dolet latus, & ad mammam, & ad

ABSC.

ABST.

AET.

ad claviculam, & ad scapulas, dolor impetum facit.
De Int. affect. X. 1. ad 5.

ABSCCESSVS OSSIS.

A sphacelo, abscessus ossis. *Aph. VII. 77.*

ABSTINENTIA.

Pituitosi supernis partibus, cibi praeter morem abstinentiam, omnino facilius ferunt. *De Vict. acut. XVII. 7.*

ACVTI, vid. MORBI.

AESTAS, vid. ANNI TEMPVS.

AETAS.

NOTAE VARIAE.

Aetates septem: infantis ad annos 7. pueri ad 14. adolecentis ad 21. iuuenis ad 28. viri ad 49. senioris ad 56. senis ad vitae extremum. *De Aetat. II.*

Morborum alii ad alia tempora, bene aut male se habent: & aetates quaedam ad tempora, & regiones, & victus. *Aph. III. 3.*

Secundum tempora autem, vere quidem, & prima aetate, pueri, & his aetate proximi, optime degunt, & maxime sani sunt. Aestate vero, & autumnno ad aliquam quidem partem, senes. Reliquo autem autumnno, & hieme, qui medii sunt aetate. *Aph. III. 18.*

Morbi ante pubertatem non metuendi sunt: Peripneumonia, pleuritis, podagra, nephritis, varix in tibia, fluor sanguineus, cancer non innatus, albicans vitiligo, defluxio in medullam spinalem, haemorrhoids, chordapsus non a natura insitus. *Coac. 512.*

Aetas ab anno 14. ad 42. omnis generis morborum ferax est. *Coac. 512.*

Ab anno aetatis 42. ad 63. neque strumae fiunt, neque vesicae calculus, nisi antea occupet, neque in spinalem medullam defluxio, neque renum morbus, nisi alia aetate sequatur, neque sanguinis per ora venarum

narum profluvium , neque fluor sanguineus ; nisi prius adfuerit ; atque hi morbi ad senectutem usque absunt . *Coac.* 512.

MORBI INFANTVM recens NATORVM.

Aphthae , vomitus , tussis , vigiliae , pavores , umbilici inflammationes , aurium humiditates . *Aph.* III. 24. *de Dentib.* 1. 3. 11. 14.

DENTIENTIVM.

Gingivarum pruritus , febres , convulsiones , alvi profluvia , & maxime ubi caninos dentes producant , & iis , qui inter pueros sunt crassissimi , & qui alvos duras habent . *Aph.* III. 25.

PVERORVM.

Tonsillae inflammatae , verticuli in occipitio introrsum extrusiones , asthmata , calculorum generationes , lumbrici rotundi , ascarides , verrucae pensiles , satyriasmus , stranguriae , strumae , & alia tubercula , maxime vero supra dicta . *Aph.* III. 26.

Plurimae quidem affectiones pueris iudicantur , aliae in 40. diebus : aliae in 7. mensibus : aliae in septem annis : aliae ipsis ad pubertatem accedentibus . Quae vero pueris permanserint , neque solutae fuerint circa pubertatem , aut feminis circa menstruorum eruptiones , perseverare solent . *Aph.* III. 28.

ADOLESCENTVM.

Multi ex praecedentibus , & febres diurnae magis , & sanguinis ex naribus fluxiones . III. 27.

IUVENVM.

Sanguinis spuitiones , tabes , febres acutae , epilepsiae , & alii morbi , maxime vero supra nominati . *Aph.* III. 29.

VIRORVM.

Asthmata , pleuritides , peripneumoniae , lethargi , phrenitides , febres ardentes , alvi profluvia diuturna , cholerae , dysenteriae , lenteriae , haemorrhoides . *Aph.* III. 30.

SENVVM.

Spirandi difficultates, catarrhi tussiculosi, stranguriae, dysuriae, articulorum dolores, nephritides, vertigines, apoplexiae, cachexiae, pruritus totius corporis, vigiliae, alvi & oculorum, & narium humiditates, visus hebetudines, glaucescences, auditus gravitates.

Aph. III. 31.

ALIMENTA, vid. CIBVS.

ALVVS.

AD DIAGNOSIN.

VARIAE NOTAE.

Quibus, dum sunt iuvenes, alvi sunt humidae, iis senescentibus siccantur. Quibus vero, dum sunt iuvenes, alvi sunt siccae, his senescentibus humectantur.

Aphor. II. 20.

Quicumque alvos habent humidus, dum quidem iuvenes sunt, melius liberantur his, qui siccas habent. Ad senectutem vero, peius liberantur: siccantur enim ut plurimum senescentibus. *Aph. II. 53.*

Alvi humiditates senibus infestae. *Aph. III. 31.*

Quotidianae constitutiones aquiloniae alvos siccant. *Aph. III. 17.*

Quibus per febres, sanguinis copia undecunque eruperit, in refectionibus, his alvi humectantur. *Aph. IV. 27.*

Virium exsolutio dolorem solvens, alvum maxime humectam reddit. *Coac. 629.*

Alvus perturbata, salsuginosa demittens, una cum febre, non admodum sopore & torpore oppressos consequitur. *Coac. 641.*

Cutis corporis squallida, & plus aequo sicca, male affectae alvi index est. In his praerubrae carunculae, purulentae, fere ex alvo prodeunt. *Coac. 625.*

Serpentina ulcera supra inguina ad laterum inanitatem, & pubem enata, male affectam alvum denunciant. *Coac. 628.*

Aestuo-

Aestuosae deiectiones, & cum contentione procedentes, male affectam alvum praenunciant. *Coac.* 643.

ALVI DEIECTIO IN GENERE.

AD DIAGNOSIN.

Mistio nocturna multa contingens, parvam deiectionem significat. *Aph.* IV. 33.

Quibus spumosae egestionis in alvi profluviis, his de capite pituita defluit. *Aph.* VII. 30.

AD PROGNOSIN.

VARIAE NOTAE.

Et urinae, & alvi excrementa, & sudores, cum apparent, vel iudicatu faciles, vel difficiles, vel breves, vel longos morbos fore indicant. *Aph.* I. 12.

Alvi recrementum crassum fieri oportet, in iudicationem eunte morbo. *Coac.* 601. *Praenot.* 61.

Alvi recrementa, quae in spumosa, & sincera desinunt, omnibus quidem ingravescens mali significationem praebent, convulsione vero tentatis, vel maxime. *Coac.* 613. *Praedict.* I. 30.

DEIECTIO MELIORIS NOTAE.

Alvi recrementum optimum est molle, costans, aliquatenus fulvum, nec admodum graveolens, eoque tempore, quo per secundam valetudinem deici solet, excretum, copia vero ingestis cibis respondens. *Coac.* 601. *Praenot.* 57.

Vtile quoque, quod lumbricos teretes ad iudicationem exire cogit. *Coac.* 601. *Praenot.* 62.

Alvi recrementum purum succedens, febrem acutam solvit cum sudore. *Coac.* 649.

DETERIORIS NOTAE.

In morbo diuturno appetitus prostratus, & meracae deiectiones, malum. *Aph.* VII. 6.

In praecipitibus malis, spumans & circumbiliosum alvi recrementum, malo est. Malum quoque & exacte candicans. Adhuc vero deterius, farinae molitae in-

er,

star, & stercorosum. Praeter haec sopor malo est, & cruenta alvi deiectio, ac immoderata vaforum inanitiono. *Coac. 602.*

Alvi recrementum glutinosum, sincerum, aut album, in vitio est. Vitiosum quoque, quod abunde fermentatum est, & aliquantulum pituitosum. Pravum etiam, cum ex his quae densata feruntur, quod subsidet, aliquantulum livescit, purulentum ac biliosum est. *Coac. 604. Praedict. I. 100.*

Tenne alvi excrementum, & spumans, in quo quod subsidet aqueum est, & ex pallido virescens, malo est; malum quoque purulentum. Nigrum etiam cruentum, malum, cum febre, atque alias. Vitiosum quoque varium, abunde coloratum alvi excrementum, eoque deterius, quo colore formidandum magis, praeterquam in medicamenti potione. Tunc namque periculo vacat copia non exsuperans. Friabilis quoque mollis in febre alvi secessus, vitio est. Vitiosus quoque siccus, qui facile dissolvitur, nec cohaeret, decolor, idque praecipue, si alvum humectet: lethalis vero, si nigra antea prodierint. *Coac. 608.*

Liquidum alvi recrementum, & brevibus intervallis cumulatam, malo est. Partim namque vitium, & insomniam, partim vero exsolutionem pariet. *Coac. 609.*

Perliquidum, & aliquantulum friabile alvi recrementum, cum summa totius corporis perfrigeratione, non sine febre, vitiosum est. Rigores praeterea vesicam, & alvum corripunt. Valde vero aquosa deiectio, in praecipitibus malis non desinens, malo est; atque eo magis, si sitis vacuitatem fecerit. *Coac. 610. Praedict. I. 116.*

Alvi recrementa, quae perliquida, ac rursus consistentia, sincera, stercoracea, morbi longitudinem denunciant. *Coac. 613.*

Stercoracea alvi egestio, cum tensione, alvum male affectam denunciat. Pituitosa vero repente, cum oris ventriculi dolore, intestinorum difficultatem, & fortasse etiam lumborum dolorem. In talibus alvus cir-

cum-

cumtenfa, ex neceffitate liquida demittens, celeriter intumefcens, quandam convulfionis fignificationem prae fe fert. In iis novus fubinde rigor, periculum creat. *Coac.* 617.

In humecta alvo, perfrigeratio cum fudore, vitiofa. *Coac.* 647.

LETHALIS.

Exitialis eft deiectio pinguis, & nigra, ac livida, cum odoris gravitate; itemque biliofa, fimile quiddam lentium, aut cicerum lomento continens; aut ventri bene florulentos fanguinis grumos, & infantium egeffionem odore referens, ac varia, eademque diu perfeverans. Talis etiam fuerit cruenta, ftrigmentofa, biliofa, nigra, & fimul, & per vices excreta. *Coac.* 631.

Exitialis quoque deiectio, quaecunque prodeundo fenfum aegri fallit. *Coac.* 631.

Ex diuturno ventris affectu, vomentibus, biliofis, cibum averfantibus, copiofus fudor obortus, cum repentina virium impotentia, lethalis. *Coac.* 638.

Humefcente alvo, fanguis ex gingivis effluens, lethalis. *Coac.* 648.

ALIVM MORBVM PRAESAGIENS.

ABSCESSVM ad ARTICVLOS.

Quibus circa initia alvus turbatur, urinae autem paucae funt, temporis progreflu alvus quidem reficcatur, urina vero tenuis abundat, his abfcelfus ad articulos funt. *Coac.* 619.

DELIRIVM.

Alvi recrementum praerubrum, in febre, delirium denunciat. *Coac.* 613.

HYDROPEM.

Biliofis alvus perturbata, exigua reddens, geniturae fimilia, & mucofa, doloremque ad imum ventrem inferentia, urinae quoque non facile prodeuntes, ad hydropem tendunt ex huiusmodi cafibus. *Coac.* 455. 644.

ICTE-

ICTERVM.

Frequentes, & ex parvis intervallis desidendi labores, aliquantulum glutinosa excernentes, cum paucis stercoraceis, praecordiorum, & lateris dolore, morbum regium praenunciant, *Coac.* 621.

MANIAM.

Quibus faciei incendium, & intensus rubor solvitur, & graveolens est alvi egestio, redundans & subrubra, in his insaniae metus est. *Coac.* 624.

ALVI DEIECTIO ALBA.**AD PROGNOSIN.****DETERIORIS NOTAE.**

In gravibus malis, & biliosis, exacte candicantes, spumantes, & circumbiliosae egestionis, malo sunt. *Praedict.* I. 53. 117. *Coac.* 602.

Exacte candicans alvi recrementum in febre, nullam bonam iudicationem denunciat. *Coac.* 615.

Alvi recrementum candicans, stercorosum, in morbo regio molestiam exhibet; ac liquidum etiam, ubi refoederit, ruborem adeptum. *Coac.* 613.

In phrenitide albicans deiectio, ac torpor, malum denunciat. His succedens rigor pessimus. *Coac.* 91. *Praedict.* I. 13.

LETHALIS.

Candidum & liquidum excrementum, cum alvi tumore, lethale. *Coac.* 611.

ALVI DEIECTIO BILIOSA.**AD DIAGNOSIN.**

Contractum labrum biliosae alvi perruptionem denunciat. *Coac.* 240.

AD PROGNOSIN.**MELIORIS NOTAE.**

Biliosus alvi fluxus, & qualis in intestinorum difficultate

te fieri affolet, die 7. 9. aut 14. contingens, a febribus vindicat. *Coac.* 152.

Biliofas alvi deiectiones surditas, & surditatem biliosa alvi deiectio sedat. *Coac.* 627. *Aph.* IV. 28. 60.

DETERIORIS NOTAE.

In biliosis & sinceris deiectionibus, spumosa efflorescentia malo est, iis praesertim, quos antea lumborum dolor, ac desipientia vexavit. *Praedict.* I. 21.

Quibus, prodeunte egestionem alvi biliosa, ad pectus morsus, ac amaritudo sentitur, ii male habere iudicantur. *Coac.* 43.

Alvi recrementa mala, quaecunque varia, & quae bile abunde sunt saturata. *Coac.* 612.

ALIVM MORBVM PRAESAGIENS.

ICTERVVM.

Spumans, & bile obductum alvi recrementum, vitio est.

Quin & inde morbus regius contrahitur. *Coac.* 606.

PAROTIDES.

Glutinosae, biliosae deiectiones, magis quodammodo abscessus iuxta aures excitant. *Coac.* 622.

In biliosa alvo, molli, stercoracea egerente; apparentes aestus tumorem ad aures excitant. *Coac.* 626.

AD THERAPIAM.

Quibus deiectiones biliosae, & qui in acutis sunt febribus, his lac alienum est. *Aph.* V. 64.

ALVI DEIECTIO NIGRA.

AD DIAGNOSIN.

NOTAE ANTECEDENTES.

Pectoris dolor cum febre, & alvus perturbata cum torpore, nigras deiectiones praese fert. *Coac.* 274.

In suppuratis surditas suborta, & sanguinolenta deiectio secuta. *Coac.* 420.

Pruritus omnibus nigrorum secessum denunciant, & grumos vomitione refusus. Tremulae etiam affectiones, cum morsu, ac capitis dolore, nigras deiectiones

nes praedicunt. Tales vero praecedat vomitus, & ubi vomuerint, talia multa praeterea revelluntur. *Coac.* 636.

Quibus cum alvi perturbatione, sub indicationem morbus ingravescit, iis nigra per alvum prodeunt. *Coac.* 637.

NOTAE COMITANTES.

Quibus nigra per alvum secedunt, ii tenuibus & frigidis sudoribus diffuunt. *Coac.* 618. 633.

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Tenues nigrorum deiectiones horrorem inducentes, in talibus meliores. Tales praecipue iuvant aetatem, quae vigorem antecedit. *Coac.* 635.

DETERIORIS NOTAE.

Deiectiones nigrae, qualis sanguis niger, sponte prodeuntes, & cum febre, & sine febre, pessimae. Et quanto colores deiectionum plures fuerint peiores, eo deterius; cum purgante vero melius. Et quanto colores plures, non mali sunt. *Aph.* IV. 21. *Coac.* 612.

Vbi alvus modice intercepta, nigra, stercoribus caprarum similia, nec nisi coacta demittit, hoc casu nasus erumpens, malo est. *Coac.* 603.

LETHALIS.

Morbis quibusvis incipientibus, si bilis atra vel fursum, vel deorsum prodierit, lethale. *Aph.* IV. 22.

Quibuscumque, ex morbis acutis, aut ex diuturnis, aut ex vulneribus, aut aliter quocumque modo extenuatis, bilis atra, vel qualis sanguis niger, prodierit, postridie moriuntur. *Aph.* IV. 23.

Quibus praecordia inflammatione tentantur, & pus colligunt, iis sub mortem nigra deiciuntur. *Coac.* 288.

Ex signis autem, nigra alvi egestio, mortem significat. *De Vi&.* acut. XLVIII. 1.

Egestio nigra, post furditatem pus intro colligentibus subortam, & sanguinolentam deiectionem. *Coac.* 420.

PAROTIDES PRAESAGIENS.

Alvo stercora nigra demittente, si sopor appareat, tubercula ad aures excitat. *Praedict. I. 166.*

ALVI DEIECTIO SANGVINEA,
AD DIAGNOSIN.

NOTAE ANTECEDENTES.

Qui in febribus tertianis ingravescent dolores, tertianarum naturam assumunt, & sanguinis grumos per secessum egerunt. *Coac. 123.*

Ex praecordiorum doloribus, alvus aliquantum viscida paulatim transmittens, stercoracea pauca effundit, ac fortassis sanguinem profundit. *Coac. 293.*

Surditas pus intro colligentibus suborta, sanguinolentam deiectionem denunciat. *Coac. 420.*

Lumborum dolores sanguinis profluvium excitant. *Coac. 306.*

Frequentes, & ex parvis intervallis desidendi labores, aliquantulum glutinosa excernentes, cum paucis stercoraceis, praecordiorum & lateris dolore, morbum regium praenunciant. Animadvertendum autem, num ex istorum suppressione, ii cum virore palleant. Eos vero etiam existimo sanguinem profundere. Hos quoque lumborum dolores affligunt, & his sanguinem profundentibus, sanguis splendidus prodit. *Coac. 621.*

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Sanguis niger subtus secedens, bonum. *Aph. IV. 25.*

Qui praecordiorum doloribus, oris ventriculi, iecoris, ac earum, quae sunt circa umbilicum, partium consistantur, cruenta alvi deiectione liberantur; secus autem, moriuntur. *Coac. 295.*

DETERIORIS NOTAE.

Alvi excrementum nigrum, cruentum, malum, cum febre, atque alias. *Coac. 608. Aph. IV. 21.*

San-

ALV.

Sanguis splendidus alvo per secessum reiectus, malo est, praesertimque si dolor aliquis addit. *Coac.* 605.

A sanguinis eruptione, nigrorum per alvum egestio, malo est. Quin & praeurubrae, ac aeruginosae deiectiones, damno sunt. *Coac.* 330.

In medicamentorum purgantium usu, & circumfluo humorum affluxu, sanguis tenuis frequenter eliquatus, vitio est. *Coac.* 639.

LETHALIS.

In praecipiti malo, quae post sanguinis eruptiones, & nigrorum per alvum refusiones, surditas obvenit, malum denunciat. In his sanguinis egestio perniciem affert; surditas autem solvit. *Coac.* 331.

Lethale vero est etiam, multum sanguinem grumosum ex alvo effluere. *Coac.* 611.

Post lumborum dolores, & sanguinis splendidi egestionem, cum sopore, & capitis dolore, subinde incallescere, perniciem denunciat. *Coac.* 621.

Vitiosae etiam sunt praeurubrae deiectiones, aeruginosae, quarta die apparentes, ac eiusmodi sanguinis profluvia soporem inducunt. In his casibus ex convulsione moriuntur, nigris ante prodeuntibus. *Coac.* 632. 330.

ALVI FLVXVS. DIARRHOEA. AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Aetas dentitionis infantum. *Aph.* III. 25.

Aetas senilis. *Aph.* III. 31.

Anni tempus aestivum. *Aph.* III. 21.

Tempestas pluviosa. *Aph.* III. 16.

Balbi ab alvi profluvio maxime corripiuntur longo; *Aph.* VI. 32.

Quae circa sedem cum dolore suppurant, alvum conturbant. *Coac.* 630.

NOTAE ANTECEDENTES.

Hypochondria elevata, murmurantia, cum dolore lum-

borum superveniente, in febribus, nisi flatus eruperint, aut urinae copia prodierit. *Aph. IV. 73.*

Ructus, flatus, ventris sonitus, cum inflatione. *Coac. 142.*

Urina diluta, aut arenida & facile dissolubili asperitate returbata, liquidam fore alvum denunciat. *Coac. 583.*

Lingua tremula nonnullis prorupturae alvi significacionem praebet. *Coac. 645.*

NOTA FONTIS.

Quibus spumosae egestionis in alvi profluviis, his de capite pituita defluit. *Aph. VII. 30.*

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Convulsiones derepente ortas febris solvit, ac alvi fluxus. *Coac. 358.*

Ex capitis dolore interdum liberat somnus, ac alvi fluxus. *Coac. 172.*

Si a leucophlegmatia detento vehemens diarrhoea superveniat, morbum solvit. *Aph. VII. 29. Coac. 457. 482.*

Ophthalmia laborantem ab alvi profluvio corripit, bonum. *Aph. VI. 17. Coac. 224. De Indic. 83.*

Quibus in febre aures obsurduerint, his sanguis e naribus effluens, aut alvus exturbata, morbum solvit. *Aph. IV. 60. Coac. 210.*

Alvi fluxus interdum solvit praecordiorum, aut crurum, & inferiorum partium dolorem, derepente absque febre natum. *Coac. 294.*

Alvus perturbata, cum frequenti desidendi labore, maxillas intendit, rubores etiam faciei solvit. *Coac. 616.*

In alvi profluviis, mutationes excrementorum iuvant, nisi in prava mutantur. *Aph. II. 14.*

Qui alvi profluvio diutius cum tussi detinentur, non liberantur, nisi dolores vehementes ad pedes contigerint. *De Indic. 77.*

DETERIORIS NOTAE.

Ex morbo diuturno alvi defluxus, malum. *Aph. VIII. 5.*

Praerubrum in alvi proluvie excrementum, vitio est;

Vitiosum etiam, admodum ex viridi pallescens, aut albicans, aut spumans, aut aquosum. Item malum est, quod exiguum, glutinosum, leve, & ex viridi subpallidum. Pessima quoque deiectio liquida, in sapore & torpore detentis. *Coac.* 611.

LETHALIS.

Alvus in febre ardente affatim prorumpens, mortis periculum adfert. *Coac.* 129.

Quibus tabe laborantibus, capilli de capite defluunt, hi alvi fluxu superveniente moriuntur. *Aph.* V. 12.

A tabe detento, alvi profluvium superveniens, lethale. *Aph.* V. 14.

In iis qui longo tempore consumpti sunt, temerariae, & quae praeter rationem fiunt, alvi exsolutiones, una cum vocis defectione tremula, perniciem denunciant. *Coac.* 634. 258.

INSANIAM PORTENDENS.

Vbi alvus humecta est, aegri lassitudine, capitis dolore siti, insomnia torquentur, in praerubro colore liberatis, insaniam metuere oportet, si spirandi difficultas adfuerit. Quos etiam ex virore pallescences facilis spiratio iuvat, alvo subinde prorumpente. *Coac.* 642.

AMAVROSIS, *vid.* CAECITAS.

ANGINA.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Tempus anni vernale, & autumnale. *Aph.* III. 20. 22.

Constitutio pluviosa. *Aph.* III. 16.

AD PROGNOSIN.

NOTAE SALVARES.

Ab angina detento, tumorem fieri in collo, bonum; foras enim morbus vertitur. *Aph.* VI. 37.

Ab angina detento, tumor & rubor in pectore superveniens, bonum; foras enim vertitur morbus. *Aph.* VII. 49.

Securius est, tumorem & ruborem ad externa conver-
ti. *Praenot.* 136.

Securitatis indicium est, ruborem & abscessus ad exter-
nas quamaxime partes vergere. *Coac.* 365.

Praecipue autem malum prorogatur, quibus non solum
fauces, sed cervicem quoque, & pectus una rubor
occupat. Maxime vero potest inde secundā valetu-
do contingere, si rubores ad internā minime rever-
tantur. *Coac.* 365. *Praenot.* 134.

Erysipelas foris exstare, utile. *Coac.* 366.

In angina laborantibus, absque ulla significatione gra-
cilescantibus faucibus, dolor intensus ad pectus, aut
ad alvum progressus, purulentas deiectiones facit.
Alioqui autem tale quid solutionem praese fert.
Coac. 375.

NOTAE LONGIORIS MORBI.

Quae tumorem, ac ruborem in collo capiunt, in re-
liquis quidem eodem modo se habent, verum diu-
turniores sunt. *Coac.* 364.

Diurni sunt, qui ad crura progrediuntur dolores,
aegreque ad pus deducuntur. *Coac.* 376.

NOTAE PERICULI.

In angina laborantibus subarida sputa, gracilescantibus
faucibus, malum praenunciant. *Coac.* 369.

In angina, absque ulla significatione redundantes in ca-
put dolores, cum febre, periculum indicant. *Coac.* 372.

In angina, quaecunque conspicuum dolorem non pro-
dunt, periculi plena sunt. *Coac.* 376.

Sputa ex angina viscida, crassa, exalbida, vi educta,
malum denunciant: omnisque eiusmodi maturatio ma-
la est. *Coac.* 377.

NOTAE LETHALES.

Anginae, in quibus neque in collo, neque in faucibus
quicquam apparet, sed quae vehementem suffocatio-
nem, ac spirandi difficultatem adferunt, eodem,
aut tertio die necant. *Coac.* 363. eodem die, & 2.
& 3. & 4. strangulant. *Praenot.* 132.

Qui-

Quibus anginam effugientibus, ad pulmonem vertitur ;
7. diebus moriuntur. Si verò hos effugerint, suppu-
rati fiunt. *Aph. V. 10.* nisi pituitosa sursum educan-
tur. *Coac. 367.*

Quod si rubores evanescant; neque in exteriores partes
conversum sit tuberculum, neque pus facile, & sine
dolore excreetur, aut neque ista diebus iudicatoriis
contingant, perniciem denunciant. *Coac. 365. Prae-
not. 135.*

Erysipelas intro vergere, lethale. Cuius quidem rei in-
diciū est, cum rubore evanescente pectus gravatur,
& aegrius spiritum trahit aeger. *Coac. 366.*

Quibus in vehementi pulsatione stercus derepente dei-
citur, lethale. *Coac. 368.*

In anginis, linguae tumores absque ulla significatione
evanescentes, periculum denunciant. Quin etiam do-
lores citra evidentem causam disparentes, perniciem
ostendant. *Coac. 370.*

Angina laborantes, nisi celeriter costā expuant, perni-
ciose habent. *Coac. 371.*

In angina, absque ulla significatione delati ad crura
dolores, cum febre, perniciosi. *Coac. 373.*

In angina laborantibus, citra iudicationem praecordiū
dolor, cum impotentia & torpore obveniens, laten-
ter necat, etsi moderate admodum habere videantur.
Coac. 374.

Post sputa prava, multa deorsum purgatio, levis fide-
rationis modo, mortem adfert. *Coac. 377.*

Sputa ex angina subarida, crebra, per tussim, & cum
lateris dolore educta, perniciem minantur. Atque ea
quae inter potandum per tussim reiciuntur, quae-
que difficulter deglutiuntur, malum portendunt.
Coac. 378.

AD THERAPIAM.

Auxilia: Venaesectio in brachiis, & sub lingua, ecleg-
mata, gargarismi, tonsura capitis, ceratum collo &
capiti circumpositum, lana obvoluta, fots cum spon-

giis mollibus ex aqua calida expressis, potus ex aqua, & mulla non frigida; tandem succus ptisanæ, quum iam ex iudicatione in tuto fuerit. *De Vict. acut. XXXIX. 8. ad 16.*

Anginam & ophthalmiam venaesectione solvit. *Epid. VII.*

ANIMVS, vid. MENS.

ANIMI DELIQUIVM, vid. LIPOTHYMIA.

ANNI TEMPVS.

IN GENERE.

Mutationes anni temporum maxime pariunt morbos; & in ipsis temporibus magnae mutationes, aut frigoris, aut caloris, & alia pro ratione eodem modo. *Aph. III. 1.*

Naturarum aliae quidem ad aestatem, aliae vero ad hiemem, bene, aut male sunt constitutae. *Aph. III. 2.*

Morborum alii ad alia tempora, bene aut male se habent; & aetates quaedam ad tempora, & regiones, & victus. *Aph. III. 3.*

In temporibus, quando eadem die modo calor, modo frigus fit, autumnales morbos expectare oportet. *Aph. III. 4.*

In constantibus temporibus, si tempestive tempestiva reddantur, constantes, & iudicatu faciles fiunt morbi; in inconstantibus autem, inconstantes, & difficiles iudicatu. *Aph. III. 8.*

Morbi omnes quidem, in omnibus temporibus fiunt: nonnulli vero in quibusdam ipsorum magis & fiunt, & exacerbantur. *Aph. III. 19.*

TEMPVS VERNALE, eiusque MORBI.

Ver saluberrimum, & minime exitiale. *Aph. III. 9.*

Vere quidem insaniae, & melancholiae, & epilepsiae, & sanguinis fluxiones, & anginae, & gravedines, & raucedines, & tusses, & leprae, & impetigines, & vitiliginis, & pustulae ulcerosae plurimae, & tubercula, & articulorum dolores. *Aph. III. 20.*

TEM.

TEMPVS AESTIVVM.

Aestate vero & vernalium nonnulli, & febres continuae, & ardentes, & tertianae plurimae, & quartanae, & vomitus, & alvi fluxus, & ophthalmiae, & aurium dolores, & oris exulcerationes, & pudendorum putredines, & sudamina. *Aph. III. 21.*

TEMPVS AVTVMNALE.

In autumno morbi acutissimi, & perniciosissimi omnino. *Aph. III. 9.*

Autumnus tabidis malus. *Aph. III. 10.*

Autumno autem & multi ex aestivis, & febres quartanae, & erroneae, & lienes, & hydropes, & tabes, & urinae stillicidia, & lienteriae, & dysenteriae, & coxae dolores, & anginae, & asthmata, & volvuli, & epilepsiae, & infaniae, & melancholiae. *Aphor. III. 22.*

TEMPVS HIEMALE.

Hieme vero pleuritides, peripneumoniae, lethargi, gravedines, raucedines, tussis, dolores pectorum, & laterum, & lumborum, & capitis dolores, vertigines, apoplexiae. *Aph. III. 23.*

ANNI AC COELI CONSTITVTIO VARIA.
SICCA.

Ex anni constitutionibus, in universum quidem siccitates pluviosis sunt salubriores, & minus lethales. *Aph. III. 15.*

In siccitatibus, tabidi, ophthalmiae, arthritides, stranguriae, & dysenteriae. *Aph. III. 16.*

In siccitatibus febres acutae sunt, & siquidem annus pro maiori parte talis fuerit, qualem fecit constitutionem, ut plurimum etiam tales morbos expectare oportet. *Aph. III. 7.*

PLUVIOSA.

Morbi in pluviosis plerumque sunt, & febres longae, & alvi fluxiones, & putredines, & epileptici, & apoplectici, & anginae. *Aph. III. 16.*

AQUI.

AQVILONIA;

Si aquilonium fuerit anni tempus; tussis, fauces asperae, alvi durae, urinae difficultates, horrores, dolores costarum, & pectorum expectandi: *Aph. III. 5.*

Quotidianae constitutiones aquiloniae corpora compingunt; & robusta; & facile mobilia; & bene colorata; & melius audientia faciunt; & alvos siccant; & oculos mordent; & dolorem circa thoracem; si quis praeeexistat; maiorem faciunt: *Aph. III. 17.*

AVSTRINA;

Austri auditum gravantes; caliginosi; caput gravantes; segnes; dissolventes: *Aph. III. 5.*

Quotidianae constitutiones austrinae corpora dissolvunt; & humectant; & auditus graves; & capitis gravitates faciunt; & vertigines in oculis; & corporibus motum difficilem; & alvos humectant: *Aph. III. 17.*

CONSTITVTIO VARIA SVCCESSTVA.

De temporibus, siquidem hiems sicca & aquilonia fuerit; ver autem pluviosum, & austrinum, aestate necesse est febres acutas fieri; & ophthalmias; & dysenterias; maxime autem mulieribus; & viris natura humidis: *Aph. III. 11.*

Si vero hiems austrina, & pluviosa, & tranquilla sit; ver autem siccum & aquilonium, mulieres quidem; quibus partus in ver incidit; ex omni occasione abortiunt; quae vero pepererint; infirmos & morbosos pariunt pueros; ita ut vel statim illi pereant; vel tenues & morbofi vivant. Ceteris vero mortalibus dysenteriae; & ophthalmiae siccae sunt; senioribus autem catarrhi brevi perimentes: *Aph. III. 12.*

Si vero aestas sicca & aquilonia fiat, autumnus autem pluviosus; & austrinus, capitis dolores ad hiemem sunt; & tussis; & raucedines; & gravedines; quibusdam vero etiam tabes: *Aph. III. 13.*

Si vero aquilonius, & sine pluviis autumnus fuerit; iis quidem qui natura sunt humidi; & mulieribus; con-

ANOR.

ANX.

27

modus erit: reliquis vero erunt ophthalmiae siccae,
& febres acutae, & gravedines diurnae: nonnullis
vero etiam melancholiae. *Aph. III. 14.*

ANOREXIA.

AD PROGNOSIN.

Vt plurimum omnes qui male habent, circa principia
quidem bene comedentes, & nihil proficientes, ad
finem rursus cibum non appetunt. Qui vero circa
initia quidem cibum omnino non appetunt, postea
autem bene appetunt, melius liberantur. *Apher. II. 32.*

In morbo diurno appetitus prostratus, & meracae de-
iectiones, malum. *Aph. VII. 6.*

In longis dysentericiis appetitus prostratus, malum: &
cum febre, peius. *Aph. VI. 3.*

AD THERAPIAM.

Non febricitanti, appetitus deiectus, & oris ventriculi
morsus, & tenebriosa vertigo, & os amarefcens,
fursum purgante opus esse, indicat. *Aph. IV. 17.*

ANXIETAS.

AD PROGNOSIN.

MALA.

Qui in diebus indicatoriis, cum angore, aut inconti-
nenti corporis iactatione, absque sudore perfrigeran-
tur, atque omnino qui sine sudore perfrigerantur ci-
tra indicationem, male habent. *Coac. 38.*

Qui anxie se iactantes, citra vomitum exacerbantur,
male habent. *Praedict. I. 76.*

LETHALIS.

Anxietate vexatis praecordiis, oborta ad aures tuber-
cula, mortem adferunt. *Coac. 302.*

ABSCESSUM ad AURES PRAESAGIENS.

Angor, & pervigilium. *Coac. 563.*

ABSCES-

ABSCÉSSVM LACRYMOSVM ad OCVLOS.

Anxietas cum alvi turbulenta suppressione, & velut cunicum puncturis celeriter in cutem erumpentibus.

Coac. 564.

AD THERAPIAM.

Anxietatem, oscitationem, horrorem, vinum par pari aqua potum, solvit. *Aph.* VII. 56.

APHTHAE.

Parvis & recens natis pueris infestae. *Aph.* III. 24.

APOPLEXIA.**AD DIAGNOSIN.****CAUSAE ANTECEDENTES.**

Aetas senilis. *Aph.* III. 31.

Aetas ab anno 40. ad 60. *Aph.* VI. 57.

Tempus hiemale. *Aph.* III. 23.

Tempestas pluviosa. *Aph.* III. 16.

NOTAE ANTECEDENTES.

In morbis melancholicis periculosi humorum decubitus. *Aph.* VI. 56.

Torpores, & stupores, praeter consuetudinem evenientes, adfuturam fiderationem denunciant. *Coac.* 476.

Impotentia ex vulnere accidens, nisi febre citra rigorem oborta sani evadant. *Coac.* 477.

AD PROGNOSIN.**NOTAE SALVTARES.**

In fideratis succedentes haemorrhoides, utiles. *Coac.* 478.

In fideratis, si febris accedat, solutio contingit. *Coac.* 479.

NOTAE PERICVLI.

In fideratis refrigerationes, & torpores, malum denunciant. *Coac.* 478.

NOTAE LETHALES.

Solvere apoplexiam, vehementem quidem, impossibile; debilem vero, non facile. *Aph.* II. 42.

Qui

Quibus sanis dolores derepente sunt in capite, & statim muti sunt, ac stertunt, in 7. diebus pereunt, nisi febris apprehenderit. *Aph. VI. 51.*

AD THERAPIAM.

Qui derepente sine febre voce deficiunt, iis venam secare oportet. *Epid. II. V. 21.*

APPETENTIA CIBI.

A morbo belle comedenti nihil proficere corpus, malum est. *Aph. II. 31.*

AQVA.

EIVS QUALITATES.

Aqua, quae cito calefit, & cito refrigeratur, levissima. *Aph. V. 26.*

Aquae pluviales, levissimae & dulcissimae, tenuissimae ac limpidissimae sunt. *De Aer. aq. & loc. XVII.*

Aquae optimae sunt, quae ex sublimibus locis, ac terris collibus fluunt, maxime ad solis ortum, praesertim aestivum scaturientes. *Ibid. XIV.*

Aquae optimae sunt, quae fontes suos ad orientem habent; 2. quae inter aestivos solis exortus, ac occasus emergunt; 3. quae inter occasus aestivos, ac hibernos scaturiunt; 4. pessimae, quae ad austrum, & quae inter aestivum ortum, & occasum. *Ibid. XIV. XV.*

Aquae ex nive, & glacie productae, omnes malae sunt. *Ibid. XX.*

Aquae palustres, stabiles, & lacustres, pravae sunt. *Ibid. X.*

EIVS VSVS.

Aquae plurimam partem conferunt ad sanitatem. *Ib. X.*

Aquae salsae, crudae, & durae, non omnibus bonae; nonnullis tamen naturis, & morbis conveniunt. *Ibid. XIV.*

Quorum ventres duri sunt, his aquae dulcissimae, levissimae, & limpidissimae conferunt. *Ibid. XV.*

Quo-

Quorum ventres molles, humidi, & pituitosi sunt, his aquae durissimae, crudissimae, ac subsalsae conveniunt. *De Aer. aq. & loc. XV.*

AQVOSA ANTE PARTVM, vid. PARTVS.

AQVILLO, vid. VENTVS.

ARS.

Vita brevis, ars longa. *Aph. I. 1.*

ARTHRITIS. PODAGRA.

AD DIAGNOSIN.

CAVSAE ANTECEDENTES.

Aetas senilis. *Aph. III. 31.*

Tempus vernale, & autumnale. *Aph. III. 20. VI. 55.*

Siccitates. *Aph. III. 16.*

Febres longae. *Aph. IV. 44. 45. VII. 64. Coac. 118.*

NOTAE ANTECEDENTES.

Urina crassa, albam subsidentiam habens, articulorum dolorem, aut tumorem denunciat. *Praedict. II. 35.*

NOTAE VARIAE.

Eunuchi non laborant podagra, neque calvi fiunt. *Aph. VI. 28.*

Puer non laborat podagra, ante veneris usum. *Aph. VI. 30.*

Mulier non laborat podagra, nisi menses ipsi defecerint. *Aph. VI. 29.*

AD PROGNOSIN.

VARIAE NOTAE.

Qui podagrici morbi fiunt, hi sedata inflammatione in 40. diebus decedunt. *Aph. VI. 49.*

Morbus longus ac molestus est, sed non lethalis. *De Affect. XXXII.*

Podagra violentior est omnibus circa articulos morbis, diuturnissimus, ac aegre cedens morbus. *Ibid.*

SANABILIS.

Iuvenis, cui necdum circa articulos calli induruerunt, cui.

cuique victus ratio curae est , ad laborem est impiger , alvumque habet vitae instituto probe cedentem , is sane prudentem nactus medicum , sanus evadet . *Prædict. II, 54.*

INSANABILIS.

Qui in senectute tofos , aut callos in articulis induratos habent , aut laboriose vitam tolerant , cum alio sicca , ii sane omnes , (ut sentio) humana arte sanari nequeunt , His certe succedentes dysenteriae optime medentur , quin & quaecunque aliae colliquationes infernae eos valde iuvant , *Prædict. II, 53.*

AD THERAPIAM.

Tumores in articulis , & dolores absque ulcere , & podagricos , & convulsiones , horum plurima , frigida multa affusa , & levat , & attenuat , & dolorem solvit , Torpor enim modicus doloris solvendi vim habet , *Aph. V, 25.*

Arthritidi conducit adhibere , qua parte dolor haeret , frige-factoria , alvum subducere per clysteres , aut glandem subditam ; Quum vero dolor intus fuerit , pharmacum infra purgans bibendum dare ; & post hoc serum coctum , & asinum lac , *De Affect. XXXI.*

Podagrae eadem conveniunt , quae morbo articulari . *Ibid. XXXII.*

ARTICULI.

Quibus ad articulos praerubrae pustulae superficiales enatae sunt , ac subinde rigent , iis velut ex acceptis plagis , cum dolore venter , & inguina rubescunt , & pereunt . *Coac. 489.*

ARTICULORVM DOLOR, vid. ARTHRITIS.

ARTICULORVM ABSCESSVS, vid. ABSCESSVS.

ASTHMA.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES,

Aetas

Aetas puerilis, virilis, senilis. *Aph. III. 26. 30. 31.*

Tempus autumnale. *Aph. III. 22.*

Ulcera faucium proserpentina, graviora, & magis acuta. *De Dentit. III. 17.*

AD PROGNOSIN.

EIVS SOLVTIO.

Spinae perversionem, & spirandi difficultatem, sanguinis fluxus liberat. *Coac. 311.*

NOTAE LETHALES.

Qui gibbi ex asthma, aut tussi, fiunt ante pubertatem, moriuntur. *Aph. VI. 46.*

Desipientia cum difficultate spirandi, & sudore, lethalis est. Quin etiam cum difficultate spirandi, & singultu, mortem adfert. *Coac. 89.*

Cum spirandi difficultate arescentes, in tabe, cruda multa educentes, exitialiter habent. *Coac. 445.*

NOTAE HYDROPIIS SICCI FUTURI.

Spirationes quae non nisi erecta cervice ducuntur, hydropem siccum faciunt. *Coac. 424.*

CONF. RESPIRATIO.

ATRA BILIS, *vid. BILIS.*

AVDITVS GRAVITAS. BARYCOIA.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Aetas senilis. *Aph. III. 31.*

Constitutio austrina. *Aph. III. 5. 17.*

AD PROGNOSIN.

Quibus in febre aures obsurduerint, his sanguis ex naribus effluens, aut alvus exturbata, morbum solvit. *Aph. IV. 66.*

In acuta febre aures obtusae, vehementem insaniam portendunt. *Coac. 196.*

CONF. SVRDITAS.

AVRES.

Aurium humiditates , parvis & recens natis pueris infestae. *Aph. III. 24.*

Aures frigidae , pellucidae , contractae , lethales. *Aph. VIII. 24.*

AVRIVM DOLOR.

AD DIAGNOSIN.

Ipsi tempus aestatis obnoxium. *Aph. III. 21.*

AD PROGNOSIN.

NOTAE SALVTAES.

Si pus album ex aure fluxerit , iuniorem superfuturum spes est , siquidem aliud quoddam ei bonum signum supervenerit. *Praenot. 130.*

Si puris copia ex aure , & sanguis ex naribus effluat , aut aliud quoddam laudabile signum exstiterit. *Coac. 189.*

NOTAE PERICULI, vel EXITII.

Auris dolor acutus , cum febre continua & vehementi , gravis : periculum enim delirii , & mortis aegro adfert. *Praenot. 130.*

Moriuntur autem ex hoc morbo , iuniores quidem homines die 7. aut citius ; senes vero multo tardius , Nam & febres , & deliria , minus eis suboriuntur , auresque eam ob causam suppuratio praeoccupat. Verum his quidem aetatibus succedentes morbi reversiones plurimos interficiunt : iuniores vero , priusquam auris suppuret , intereunt. *Praenot. 130. Coac. 189.*

AD THERAPIAM.

Si auris doleat , lacte utendum. *Epid. II. V. 29.*

Ad auris dolorem cucurbitam affigito. *Epid. II. VI. 46.*

Si auris doleat , lana digito obvoluta oleum calidum instillato. *Epid. VI. V. 20.*

AVRIVM SONITVS , TINNITVS ,
MVRMVR.

AD DIAGNOSIN.

Qui lethargo, aut veterno conflantur, (post varia Symptomata superata) tandem mentis compotes facti, de cervicis dolore conqueruntur, ac incertos sonitus per aures impetu ferri sentiunt. *Coac.* 139.

AD PROGNOSIN.

NOTA LETHALIS.

In praecipitibus morbis, murmur edentes, ac tinnientes aures, mortem praenunciant. *Coac.* 193.

NOTAE ALIAE MORBI FUTURI.

HAEMORRHAGIAE LIBERALIS.

Quibus Lumborum dolor in caput recurfat, & manus torpore affectae, ac oris ventriculi dolorem sentiunt, aut aurium sonitus, ii liberaliter sanguinem profundunt. *Coac.* 308.

HAEMORRHAGIAE NARIVM cum MENTIS EXCESSV.

Aurium sonitus, cum visus hebetudine, & ad nares gravitatis sensu, mentis excessum, ac sanguinis ex naribus profluvium praefagiunt. *Coac.* 131. 194.

HAEMORRHAGIAE NARIVM, aut MENSTRUORVM PROFLUVII.

Quae caput concutiant, & aurium sonitus excitant, sanguinem e naribus profundunt, aut mulieri menstrua deturbant, idque praesertim, si ad Spinam ardor consequatur. *Coac.* 167.

APOPLEXIAE, EPILEPSIAE, aut OBLIVIONIS, Capitis dolores, & aurium tinnitus, citra febrem, &c. *Coac.* 161.

AVRIVM ABSCESSVS, *vid.* ABSCESSVS.

AVRIVM TUBERCVLA, *vid.* PAROTIDES.

AVSTER, *vid.* ANNI TEMPVS.

BALBI.

Balbi ab alvi profluvio maxime corripiuntur longo. *Aph.* VI. 32.

Mor-

Morbos habent balbus, aut calvus, aut gracili voce praeditus, aut hirsutus, fortiter atrabilarios, *Epid. II. V. 6.*

Balbi celeri lingua praediti, atrae bilis humori obnoxii, biliosique sunt, *Bpid. II. VI. 3.*

BALNEVM.

EIVS VSVS.

Solvit oculorum dolores. *Aph. VI. 31. VII. 46.*

Aqua potabilis humectat, & frigefacit: falsum autem balneum calefacit ac siccat. *De Diet. II. XXXV. 2. 4.*

Calida balnea ieiunum attenuant, ac frigefaciunt; a cibo accepto, eadem calefaciunt, ac humectant. *Ibid. 6. 7. 10.*

Balnea frigida, vacuo quidem corpore, praebent quamdam caliditatem: ubi autem cibus ingestus est, ab humido existente detrahunt, & frigidum existens siccitate replent. *Ibid. 12. 13. 14. 15.*

Conveniunt magis peripneumoniis, quam febribus ardentibus. *De Viſſ. acut. XXXII. 7.*

Dolorem lateris, & pectoris, ac dorsi, balneum lenit, & sputum maturum facit, ac educit; & facilem spirationem reddit, & lassitudinem eximit, articulos enim, & cutis superficiem mollit; sed & urinam ciet, & capitis gravitatem solvit, & nares humectat. *Ibid. 8. ad 13.*

EIVS NOXA.

Minime tempestivum est, eos lavare, quibus alvus in morbis liquidior est; itemque eos, quibus plus iusto adstricta est, & non prius subiit. Sed neque debilitatos lavare oportet, neque ex ciborum fastidio nauseantes, aut vomentes, neque eos, qui biliosum eructant, neque eos, quibus sanguis ex naribus erumpit, nisi minus, quam pro occasione convenit, fiat. *Ibid. 17. ad 22.*

BILIS.

Aestate & Autumno viget. *De Nat. hum. XIV. 1. 5.*

BILIS ATRA.**AD DIAGNOSIN.**

Autumno & plurima, & fortissima est. *Ibid. 13.*

Quae cruda deorsum secedunt, ab atra sunt bile; si plura, maior, si pauciora, minor est morbus.

Aph. VII. 68.

AD PROGNOSIN.

Atra bilis inter omnes corporis humores viscosissima est, & sedes diuturnissimas facit. *De Nat. hum. XXVIII. 8. 9.*

NOTAE LETHALES.

Morbis quibusvis incipientibus, si bilis atra vel sursum, vel deorsum prodierit, lethale. *Aph. IV. 22.*

Quibuscunque, ex morbis acutis, aut ex diuturnis, aut ex vulneribus, aut aliter quocunque modo extenuatis, bilis atra, vel qualis sanguis niger prodierit, postridie moriuntur. *Aph. IV. 23.*

Dysenteria, si ab atra bile inceperit, lethale. *Aph. IV. 24.*

Februm initio, si atra bilis sursum, aut deorsum prodeat, lethale est. *Coac. 68.*

Ex quacunque causa male affligente, quis atram bilem revomuerit, moritur qui vulnus habet. *De Loc. in hom. XLIV. 5.*

AD THERAPIAM.

Melancholicos uberius deorsum purgabis; eadem ratione contraria adhibens. *Aph. IV. 9.*

BVBONES.

In bubonibus febres omnes malae, praeter ephemerarum.

Aph. IV. 55.

CACHEXIA.

Aetas senilis ipsi obnoxia. *Aph. III. 31.*

CAE.

CAECITAS.**AD DIAGNOSIN.****CAUSAE ANTECEDENTES.**

In morbis melancholicis periculosi humorum decubitus.

Aph. VI. 56.

Quibus cum lippitudine, capitis dolor accedit, & longo tempore perseverat, caecitatis metus impendit.

Coac. 223.

Infantibus accedens convulsio, oculorum aciem retundit. *Coac. 485.*

AD PROGNOSIN.

Caecitas febrem ardentem solvit. *De Indicat. 69.*

AD THERAPIAM.

Si cui oculi, dum sani sunt, visum corrumpunt, huic sectione, & insuper excoriatione in Sinciput facta, os excindere, & aquam auferre oportet, sicque curare, & ita sani fiunt. *De Visu IV. 5. 9.*

CALCVLVUS.**AD DIAGNOSIN.****VARIAE NOTAE.**

Derepente obortus renum dolor, cum urinae suppressione, calculorum, aut urinae crassae mictionem indicat. *Coac. 589.*

Tremores senioribus in febre contingentes, ubi apparent, calculi fortasse per urinas excluduntur. *Coac. 590.*

NOTAE CALCULI VESICAE.

Quibus in urina, arenosa subsident, illis vesica calculo laborat. *Aph. IV. 79.*

Calculo laborantes, eo corporis habitu ac positu constituti, ut ne in urinariam fistulam calculus illabatur, prompte urinam reddunt. *Coac. 472.*

Mictio dolorifica, urina paulatim fluens, velut in stranguria, subcruenta, quandoque arenosa, lapides parvi aliquando eiectioni. *De Morb. IV. XXIX, 2. & seqq.*

Vrinae interceptio , cum dolore vehementi . *De Aer. aq. & loc. XXIII. 4.*

Pueri calculosi fricant , ac trahunt pudenda . *Ibid. 5.*

Vrinam splendidissimam calculosi mingunt , ad similitudinem feri . *Ibid. 8.*

CALIDVM.

EIVS VSVS .

Calidum , utile ossibus , dentibus , nervis , cerebro , spinali medullae . *Aph. V. 18.*

Calidum suppuratorium , non in omni ulcere , maximum signum ad securitatem , cutem emollit , attenuat , dolores sedat , rigores , convulsiones , tetanos mitigat , capitis vero gravitatem solvit : plurimum autem confert ossium fracturis , maxime denudatis : ex his quidem maxime , qui in capite ulcera habent , & quae a frigore moriuntur , aut ulcerantur : & herpetibus exedentibus , sedi , pudendo , utero , vesicae . His calidum quidem amicum , & decretorium : frigidum vero inimicum , & occidens . *Aph. V. 22.*

EIVS NOXA.

Calidum , eo frequenter utentibus , has affert noxas : carnis effeminationem , nervorum impotentiam , mentis torporem , sanguinis eruptiones , animi deliquia . Haec , quibus mors . *Aph. V. 16.*

CALOR CORPORIS.

AD DIAGNOSIN .

VARIAE NOTAE .

Quae crescunt , plurimum habent calidi innati . *Aph. I. 14.*

Senibus paucus calor est . *Aph. I. 14.*

Ventres hyeme , & vere , natura sunt calidissimi , & somni longissimi . *Aph. I. 15.*

Qua corporis parte inest calor , aut frigus , ibi morbus est . *Aph. IV. 39.*

Quibus plurimus calor est , maxima voce sunt praedicati . *Epid. VI. IV. 43.*

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Optimum est, totum corpus aequaliter calidum esse,
ac molle. *Praenot.* 47. *Coac.* 492.

Frequens coloris cum calore mutatio, bono est. *Coac.*
125.

DETERIORIS NOTAE.

Ab ardoribus vehementibus convulsio, aut tetanus;
malum. *Aph.* VII. 13.

AD THERAPIAM.

Multum & repente calefacere, periculosum. *Aph.*
II. 51.

CALVI.

Qui calvi sunt, his varices magni non fiunt. Quibus
vero dum sunt calvi superveniunt varices, hi rur-
sus capillati fiunt. *Aph.* VI. 34.

Eunuchi non calvi fiunt. *Aph.* VI. 28.

CANCER.

A ventris turbatione, aut a tussi, si cancer fiat, os
amarefcit. *II.* VI. 42.

Quibus occulti cancri fiunt, eos non curare melius est.
Curati enim cito pereunt. Non curati vero longius
tempus perdurant. *Aph.* VI. 38.

CAPILLI.

Eorum defluvium, cum sputo graviter olente, in ta-
be vexatis, lethale. *Aph.* V. 11.

Quibus tabe laborantibus capilli de capite defluunt,
hi, alvi fluxu superveniente, moriuntur. *Aph.* V.
12. *Coac.* 436.

CAPVT.

Pituitae fons est. *De Morb.* IV. II. 7.

Caput & Lien maxime sunt morbis obnoxia. *De Morb. IV. XIV. 1.*

CAPITIS DOLOR.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Tempus hyemale. *Aph. III. 23.*

Autumnus pluviosus, & austrinus, post aestatem siccam & aquiloniam. *Aph. III. 13.*

NOTAE ANTECEDENTES, vel COMITANTES.

Quibus in febre urinae conturbatae, qualis iumentorum, his capitis dolores aut adsunt, aut aderunt. *Aph. IV. 70. Coac. 582.*

AD PROGNOSIN.

NOTAE SALVTARES.

Caput laboranti, & circumcirca dolenti, pus, aut aqua, aut sanguis effluens per nares, aut per os, aut per aures, solvit morbum. *Aph. VI. 10. De Indic. 81.*

Ex capitis dolore liberat pus e naribus effluens, aut sputa crassa, & inodora; liberat quoque & ulcerum eruptio, interdum vero & somnus, ac alvi fluxus. *Coac. 172.*

Quibus capitis, & cervicis dolor, ac totius corporis potentia quaedam cum tremore adest, ab his sanguinis eruptio liberat, fortassisque ista tandem dissolvuntur. Verum interim vesicae intercipiuntur. *Coac. 170. Praedict. I. 152.*

NOTAE PERICVLI.

Qui subinde inhorrescunt, ex capite laborantes, tenuiter exsudantes, ii maligne habent. *Coac. 12.*

In angina absque ulla significatione redundantes in caput dolores, cum febre periculum indicant. *Coac. 372.*

In utero gestantibus capitis dolores, qui cum sopore, gravitate, & convulsione fiunt, ut plurimum malo sunt. *Coac. 517. 534.*

NOTAE LETHALES.

Continens capitis dolor in febre acuta, cum gravibus aliis signis. *Coac.* 160. *Praenot.* 129.

Quae in capitis dolore ante faciem feruntur, frustra venari, & festucas legere, & floccos de vestibus evellere, & de pariete paleas detrahere. *Praenot.* 17.

Dolor capitis, cum virium exsolutionibus ex rigore, vel etiam cruentis urinis. *Coac.* 22. 28.

Dolor capitis, cum vocis defectionibus, & rigore subinde accedente. *Coac.* 255.

Qui ex rigore perfrigent, cum capitis ac cervicis dolore, vocis defectione, ac tenui sudore, ii, ubi vires resumpserint, ac sese velut recollegerint, moriuntur. *Coac.* 1.

Qui capite dolent, cum levi aliqua furditate, manuum tremore, cervicis dolore, nigricantes reddentes urinas, ac densas, ii, si nigra vomitione refuderint, perniciose habere suspicandi sunt. *Coac.* 176.

In his, qui inter initia sopore detenti, capitis, lumborum, cervicis, praecordiorum dolore, ac insomnia conflantur, narium stillatio perniciem ostendat, tum vero vel maxime, si 4. die, aut inter initia contingat. Alvi quoque praerubra proluvia, malo est. *Coac.* 179.

Quibus sanis dolores derepente fiunt in capite, & statim muti fiunt, ac stertunt, in 7. diebus pereunt, nisi febris apprehenderit. *Apb.* VI 51.

NOTAE ALIAE MORBI FVTVRI.

ABSCESSVS ad AVRES.

Num dolor capitis, cum superiorum partium tenuibus sudoribus, rigore subinde novo, forte etiam alvi profluvio, aut aliquo sopore? *Coac.* 203.

Capitis dolor, cum praecordiorum contensione, sopore, & incontinenti corporis iactatione. *Coac.* 289.

ABSCESSVS GINGIVARVM, vel PAROTIDVM.

Moderatus capitis dolor, cum inexhausta siti, aut sudore

dore febrem non solvente , nisi alvus erumpat
Coac. 173.

CAECITATIS.

Cum lippitudine dolor capitis accedens , & longo tempore perseverans. *Coac.* 223.

CONVULSIONIS.

Sudor tenuis per febres , cum capitis dolore , & alvo intercepta. *Coac.* 154. 177.

Graves & acuti capitis dolores , cum torpore , & gravitatis sensu. *Coac.* 171. 174.

Faucium gracilium praefocantes dolores , ubi ex capitis dolore ortum duxerint. *Coac.* 262.

Quae ex lumbis in cervicem , & caput redundantia , levis siderationis more , resolutionis sensum inducunt. *Coac.* 313.

Vesica intercepta , maximeque cum capitis dolore. *Coac.* 588.

CONVULSIONIS OPISTHOTONI.

Capitis dolor , cum alto stupore , delirio , alvi interceptione , intuitu ferociente , vultuque florido. *Coac.* 162.

HAEMORRHAGIAE.

Capitis dolor , cum alto stupore , & oculis praeerubris. *Coac.* 166.

HAEMORRHAGIAE NARIVM, aut PVRIS EFFLUVVS, aut ABSCESSVS ad inferiores partes.

Capitis dolor vehemens , & continens , cum febre , si absque aliis lethalibus signis 20. dies superet. *Praenot.* 129. *Coac.* 160.

Quoad dolor recens fuerit , eodem modo sanguinis e naribus eruptionem , aut suppurationem expectare convenit , cum alias , tum si dolor circa tempora , & frontem adfuerit. *Praenot.* 129.

Sanguinis eruptio magis expectanda venit in iunioribus 35. annis : in senioribus vero suppuratio. *Praenot.* 129. *Coac.* 160.

INSANIAE.

Vomitibus virulentis, & aeruginosis, in capitis doloribus, cum surditate, & insomniis. *Coac.* 169.

PHRENITIDIS.

In praecipiti morbo, capitis dolor, & praecordia re-
vulsa, nisi sanguis ex naribus profluat. *Coac.* 119.

Qui inter initia sopore detenti, capitis, lumborum,
cervicis, praecordiorum dolore, ac insomniis con-
sistuntur, considerandi num phrenitici evadant?
Coac. 179.

SIDERATIONIS, EPILEPSIAE, vel OBLIVIONIS.

Qui capitis doloribus, & aurium tinnitibus citra fe-
brem, aut tenebrosam vertiginem, & vocis tarditate,
manuumque stupore tentantur. *Coac.* 161.

AD THERAPIAM.

Postica capitis parte dolenti, recta in fronte vena
secta iuvat. *Aph.* V. 68.

Lac dare capite dolentibus, malum. *Aph.* V. 64.

In capitis dolore ex crapula, vini meraci cotyla po-
tui danda. *Epid.* II.

Doloris in capite gratia sanguinem de venis detrahito;
si vero non sedetur, & diuturnus sit, perurere venas,
& sanus evadet. *De Loc. in hom.* XLIX. 10. 11.

Si caput purgaveris, magis affliges. *Ibid.*

Capitis dolores ab utero, Castoreum solvit. *Epid.* VII.

CAPITIS GRAVITAS.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Austri. *Aph.* III. 5.

Quotidianae constitutiones austrinae. *Aph.* III. 17.

Suffitus aromatum. *Aph.* V. 28.

AD PROGNOSIN.

NOTAE HAEMORRHAGIAE FUTURAE.

Qui capite gravati, ad Sinciput dolorem sentiunt; per-
vigilio torquentur; iis sanguinis eruptionem fore
spes

spes est, tum vero praecipue, si aliquis contentio-
nis sensus ad cervicem pertingat. *Coac.* 168.

Qui furditate, cum capitis gravitate, ac praecordio-
rum contensione vexantur, si oculorum acies pertur-
batur, in iis sanguinis è naribus fluxum sperare o-
portet. *Coac.* 195.

AD THERAPIAM.

Calido solvitur. *Aph.* V. 22.

CAPITIS VVLNVS.

AD PROGNOSIN.

NOTAE SALVTARES.

Optimum est, neque febrim, neque sanguinis eruptio-
nem, neque inflammationem, neque dolorem acces-
sisse, aut in principio tantum ad breve tempus.
Praedict. II. 81.

NOTAE PERICVLI.

A plaga in caput, stupor, aut delirium, malum.
Aph. VII. 14.

Os insigne denudatum, os medium desidens, os diffu-
sum. At si ulceris osculum exiguum fuerit, ossis
vero fissura longe pertingat, maius periculum su-
best. *Praedict.* II. 79.

Omnia magis terrent, ubi iuxta Suturam contingunt,
& in summa capitis parte existunt. *Ibid.*

NOTAE LETHALES.

Ex capitis vulneribus lethalissima sunt quae ad ce-
rebrum pertingunt. *Praedict.* II. 79.

Febris in capitis vulnere, die 4. aut 7. aut 11. exor-
ta, valde exitialis est. *Ibid.* 83.

CONF. CEREBRVM. CRANIVM.

CARTILAGO.

Dissecta neque augetur, neque coalescit. *Aph.* VI. 19.
VII. 28, *Coac.* 505.

CATARRHVS.

AD DIAGNOSIN.

CAVSÆ ANTECEDENTES.

Aetas fenilis. *Aph. III. 31.*

Tempus hiemale. *Aph. III. 23.*

Ver ficcum & aquilonium, post hiemem austrinam, pluuiosam, & tranquillam. *Aph. III. 12.*

AD PROGNOSIN.

Destillationes in ventrem supernum, in 20. diebus suppurantur. *Aph. VII. 38.*

Raucedines & gravedines in valde fenibus non coquuntur. *Aph. II. 40.*

Senioribus accidunt catarrhi breui perimentes, si hiems austrina, & pluuiosa, & tranquilla, ver autem ficcum aquilonium fuerit. *Aph. III. 12.*

CATOCHVS.

AD DIAGNOSIN.

CAVSÆ ANTECEDENTES.

Quae convulsionis in morem affligunt. *Coac. 104.*

AD PROGNOSIN.

NOTAE PERICVLI.

Altus stupor in aegris lassitudine confectis, & singultuosis. *Coac. 45.*

NOTAE LETHALES.

Vocis defectiones, cum virium exsolutione, ac alto stupore. *Coac. 250.*

NOTAE ALIAE MORBI FVTVRI.

HAEMORRHAGIAE.

Altus stupor, cum dolore capitis, & oculis praerubris. *Coac. 166.*

OPISTHOTONI.

Dolor capitis, cum alto stupore, delirio, alvi interceptione, ferociente intuitu, & vultu florido. *Coac. 162.*

PAROTIDVM.

Quae convulsionis in morem affligunt, cum alto stupore. *Coac. 352.*

CE-

CEREBRVM.

Sedes & metropolis est frigidi, & glutinosi: *De Carn. IV. 11.*

CEREBRI CONCVSSIO.

Quibus cerebrum concussum fuerit ab aliqua causa, necesse est eos statim mutos fieri. *Aph. VII. 58.*

Quibus concussum fuerit cerebrum, vel ex plaga do-
luerit, aut aliquo casu, his illico vox deficit, ne-
que vident, neque audiunt, fereque intereunt.
Coac. 499.

CEREBRI VVLNVS.

Eius perfectio lethalis. *Aph. VI. 18. Praedict. II. 79.*

Quibus percussum fuerit cerebrum, his necesse est fe-
brem, & bilis vomitum supervenire. *Aph. VI. 50.*

Ex cerebri vulnere, febris ut plurimum, ac bilis vo-
mitus succedit, & corporis resolutio, iique per-
niciose habent. *Coac. 500.*

CEREBRI SPHACELVS.

Quibus cerebrum sphacelo fuerit affectum, in tribus
diebus pereunt: si vero hos effugerint, sani fiunt.
Aph. VII. 50.

Vbi cerebrum fideratione periclitatur, quidam 3. diebus,
quidam etiam 7. moriuntur, quos si evaserint, fer-
vantur. Ex quorum numero pereunt, quibus per-
fectionem os disparatam fuerit. *Coac. 187.*

CONF. CAPVT, CRANIVM.

CERVIX. COLLVM.

Si a febre detento collum derepente inversum fuerit,
& vix deglutire possit, tumore non existente, le-
thale. *Aph. IV. 35. VII. 58.*

Collum neque converti, neque devorare posse, ple-
rumque lethales. *Coac. 278.*

CER-

CERVICIS DOLOR.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Vehementes faucium dolores. *Coac.* 268.

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Capitis & cervicis dolor, ac totius corporis impotentia quaedam, cum tremore, si sanguinis eruptio accesserit. *Coac.* 170.

Cervicis dolor ex rigore, cum lassitudinis sensu febricitantibus superveniens, & narium haemorrhagiam praefagiens. *Coac.* 555.

DETERIORIS NOTAE.

Cervicis, cubitorumque dolores, convulsiones minantur; ex facie autem ad fauces ista procedunt. *Coac.* 270. *Praedict.* I. 114.

Cervicis dolor in omni quidem febre, malum; in his vero pessimum, in quibus etiam vehementis insaniae metus est. *Coac.* 173. *Praedict.* I. 73.

LETHALIS.

Cervix dura, cum dolore, maxillarum connexione, iugularium venarum palpitatione vehementi, ac tendinum distensione. *Coac.* 261.

CERVICIS VERTEBRA.

Quibus spiritus retrahitur, & vox strangulabunda est, iis cervicis vertebra intro desidet, & ad exitum velut ex convulsione quadam, respiratio ducitur. *Coac.* 266.

CHOLERA.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Aetas virilis. *Aph.* III. 30.Tempus aestivum. *Epid.* VII. XL. 19.

Car.

Carnis esus, maxime suillae crudioris; sepie, locustae, gammari; ciceres, ervum; olera, porrum, cepae, lactuca coctae, brassica, rumices crudiores; poma, cucumeres, pepones; polenta recens, placentae, ac dulciaria, & mellita liba; ebrietas ex vino odorato veteri; insolatio. *Epid. VII. XL. 8. & seqq.*

Ad PROGNOSIN.

Febres lipyriae, nonnisi per choleram effusa bile, solvuntur. *Coac. 120.*

AD THERAPIAM.

Cholerae medentur, si dolor adsit, anodyna; ventri autem superiori & inferiori potiones humectantes, & balnea calida, caput mollientia, capite excepto. *De Affect. XXVIII. 8. ad xi.*

CIBVS.

EIVS COPIA.

Quae crescunt, plurimum habent calidi innati: plurimo igitur egent alimento: sin minus, corpus consumitur. Senibus autem paucus calor: propterea paucis fomitus indigent, a multis enim extinguitur. *Aph. I. 14.* Vere & hieme alimenta plura exhibenda. *Aph. I. 15.* Vbi cibus praeter naturam copiosior ingressus fuerit, id morbum facit. Ostendit autem sanatio. *Aph. II. 17.*

EIVS QUALITAS.

Cibi ad sanitatem optimi, qui parce ingesti, fami & siti sufficiunt, quique diu in corpore retinentur, & moderate per alvum secedunt. *De Affect. XLIV. 23.* Alimentum quod aegre coquitur, aegre dissipatur: quod facile adponitur, facile consumitur. *De Aliment. XI. 4.* Eorum, quae confertim & celeriter nutriunt, celeres etiam sunt egestionēs. *Aph. II. 18.* Imbecilles cibi vitam breviorē reddunt. *Epid. II. 5.* Quae alimenta humida & frigida, insipida, odoreque gravi sunt, per alvum magis, quam per urinas secedunt. *De Diet. II. 11.*

Quae

Quae acerbæ & austerae sunt, alvum sistunt. *Ibid.*

Acrida, & odorata, urinam eient. *Ibid.*

Pinguia, & dulcia, humiditatem, & pituitam exhibent. *De Affect. XLIX. 8.*

Salsa alvum, & urinam movent. *Ibid. 7.*

Acida extenuant, & morsum faciunt. *Ibid. 6.*

Pinguia, caseosa, mellita, & ex sesamo parata, ructum acidum plerumque creant, & choleram, & tormina, flatumque, & repletionem. *De Affect. XLIV. 29.*

Panis, & farina integra siccant, alvumque subducit, purus vero magis quidem nutrit, sed minus per alvum secedit. *De Diet. II.*

EIVS VSVS.

Impura corpora quo magis nutriveris, eo magis laedes. *Aph. II. 10.*

Paulo deterius & potus, & cibus, iucundior autem, eligendus potius, quam meliores quidem, sed ingratiore. *Aph. II. 38.*

Quosunque cibos, aut obsonia, aut potus aegroti concupiscunt, exhibeto, si non corpori damnum inde accessurum est. *De Affect. XLII. 1. 2.*

Si quis febricitanti cibum det, convalescenti quidem, robur; aegrotanti vero, morbus fit. *Aph. VII. 65.*

Esculenta & potulenta, alia aliorum sunt medicamenta. *De Morb. IV.*

A cibis & potibus licet convenientibus, intempestive, aut immodice sumptis, & morbi, & hinc mortis sunt. *De Affect. XLV. 1. 2. 3.*

Cibus semel in die sumptus, extenuat & siccant, alvumque sistit. *De Diet. I.*

Cibi aut potus valentiores, eos conturbant, qui sunt ventriculo calido. *Epid. VI. V.*

Qui per sanitatem pravo utuntur cibo, cito exsolvuntur. *Aph. II. 36.*

Qui cibi flatum, vel ardorem, morsum, repletionem, aut tormina movent, ab his liberat vinum meracum superingestum. *De Affect. LII. 1. 2. 3.*

CIBI FASTIDIVM. AD DIAGNOSIN.

Si mulieri purgationes non prodeant, neque horrore, neque febre superveniente, cibi autem fastidia ipsi accendant, hanc in utero gerere putato. *Aph. V. 61.*
Quos stomachi fastidia vexant, cum oris ventriculi morfu, & crebra sputatione, iis vomitio adfutura est. *Coac. 142.*

AD PROGNOSIN.

Quibus cum febre, lateris dolore accedente, alvus aquosa multa bile permixta transmittens, allevationem affert, deinde vero cibos averfantur, & sudoribus disfluunt, cum bene colorata facie, ac humefcente alvo, & dolor aliquis oris ventriculi succedit, ii diutius morbum trahentes, pulmonum vitiiis laborantium more intereunt. *Coac. 67.*

CONF. ANOREXIA.

CLAVDICATION. AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Nervi crassi vulnerati, praecipue si obliquum vulnus fuerit, ac in musculorum capitibus, praesertim femorum. *Coac. 508.*

Morbis coxendicis. *De Morb. I. III. 16.*

Diuturnus coxendicis morbus, & femoris dislocatio, nisi ulla fuerint. *Aph. VI. 60.*

Abscessus in cruribus, in gravibus peripneumoniis, si neque sputum pro ratione excernitur, neque in urina bonum apparet sedimentum. *Coac. 396.*

COCTA.

Concocta purgare, & movere oportet, non cruda: neque in principiis, nisi turgant. Plurima vero non turgent. *Aph. I. 22.*

COL.

COLLIQVATIO.

Eam denunciat urina, quae araneorum telis similia quaedam habet. *Coac.* 582.

Febricitantium corpus magis quam pro ratione colliquesieri, infirmitatem indicat. *Aph.* II. 28.

Quaecunque in utero gerentes a febribus corripuntur, & vehementer attenuantur, absque manifesta occasione, difficulter & periculose pariunt, aut abortientes periclitantur. *Aph.* V. 55.

COLLVM, vid. CERVIX.

COLOR.

AD DIAGNOSIN.

Quibus iuvenibus diu coloris foedatio inest, non tamen continenter adinstar regii morbi, ii & viri, & feminae, capitis dolore conflictantur, & lapides & terram edunt, aut haemorrhoidas patiuntur. *Praedict.* II. 17.

Colores cum virore pallidi, diuturni, absque vehementi regio morbo, cetera quidem eadem facere solent; verum praecordiorum dolores eos magis vexant, quam ceteros, neque tamen lapides, aut terram edunt. *Praedict.* II. 158.

Qui diu pallidi faciem habent tumidam, eos certum est, aut capitis, aut viscerum dolore laborare, aut sedem internam quodammodo male affectam esse. *Praedict.* II. 159.

AD PROGNOSIN.

Frequens coloris cum calore mutatio, bona. *Coac.* 125.
In his, qui ad septimum progressi sunt, cum coloris foedatione, inter ambulandum spiratio coacervata, & terrae appetentiâ, sanguinis corruptionem, ac virium exsolutionem denunciat. *Coac.* 339.

CONCEPTIO.

MVLIERES ad CONCIPENDVM APTIORES.

Parvae, tenues, albae, nigrae. *Praedict. II. 130.*
 Cum venis conspicuis, mammis tumidis, ac magnis.
Ibid.

Recte menstruatae, quovis mense, iisdem diebus, copia satis magna, aequali, boni coloris. *Ibid. 131.*

Vtero sano, sicco, & molli, neque contracto, neque proclivi, neque ore distorto, aut compresso, aut diducto. *Ibid. 132.*

Vtero nec frigido ac denso, nec praehumido, nec sicco magis, & adurente, sed ex utrisque bene temperato. *Aph. V. 62.*

His, quae non pariunt, ad conceptum sanguinis vomitus prodest. *Coac. 551.*

TEMPVS CONCIPIENDI OPPORTVNVM.

Vernale. *De Superfet. XVIII. 2.*

Post menstruam purgationem. *De Nat. puer. XXXIX. 6.*

EXPERIMENTVM a SVFFITV.

Mulier si in ventre non concipiat, velis autem scire, an conceptura sit, vestibus circumtectam subter suscito. Et siquidem procedere tibi videatur odor per corpus ad nares, & ad os, scito, hanc non propter se ipsam infecundam esse. *Aph. V. 59.*

MVLIERES ad CONCIPIENDVM minus aptae.

Praeter naturam crassae, quibus omentum os uteri comprimit. *Aph. V. 46.*

Menstrua purgatione carentes. *De Nat. puer. VII. 2.*

Pallidae, neque febre, neque visceribus in causa existentibus, caput dolentes, malae menstruatae. *Praedict. II. 133.*

Bene coloratae, carnosae, & pingues, doloris expertes, cum venis latentibus, & mensruis aut deficientibus, aut paucis, & sinceris. *Praedict. II. 134.*

Vtero frigido ac denso nimis, vel praehumido, vel sicco magis, & adurente. *Aph. II. 62.*

Vtero contracto, vel proclivi, ore distorto, aut compresso, aut diducto. *Praedict. II. 132.*

CON. CONF. CONG. 33

Loco uteri ulcerato , dein a sanatione leviores , ac du-
riore faſco. *Praediſt. II. 137.*

NOTAE CONCEPTIONIS VERAЕ.

Retentio menſtruorum , cum cibi faſtidio , neque hor-
rore , neque febre ſuperveniente. *Aph. V. 61.*

Os uteri clauſum. *Aph. V. 51.*

Lac in mammis. *Praediſt. II. 143.*

Tormina circa ventrem , poſt aquam mulſam , mulieri
dormiturae (incoenatae) propinatam. *Aph. V. 41.*

A peſſis minus validis , dolores ad articulos , ſtridor
dentium , tenſio membrorum , oſcitatio. *De Superf.
IX. 3.*

NOTAE CONCEPTIONIS non faſtae.

Tormina circa ventrem non ſecuta , poſt aquam mul-
ſam , mulieri dormiturae (incoenatae) datam. *Aph.
V. 41.*

Menſium defectus , cum ventris turgelcentia , ac motu ,
dolore capitis , cervicis , & praecordiorum , lacte
autem in mammis nullo , vel modico , & aquoſo ,
tandem ventris mole evaneſcente. *Praediſt. II. 143.*

NOTAE MASCVLI ; vel FEMELLAE.

Mulier praegnans , ſi quidem marem geſtat , bene colo-
rata eſt : ſi veſo feminam , male colorata. *Aph. V. 42.*

Fetus , mares quidem in dextris , feminae vero in
ſiniſtris magis. *Aph. V. 48.*

Si ulcus uteri ſiniſtra tantum occupet , mulierque con-
cipiat , aut ubi adhuc ulcus habet , aut poſtea ubi con-
valuit , eam marem potius enixuram , ſpes eſt . Sed
ſi ulcus dextra teneat , & mulier concipiat , fetus fe-
mineus magis expectandus eſt. *Praediſt. II. 138. 139.*

CONFLVXVS.

Confluxio una , conſpiratio una , conſentientia omnia.
De Alim. IV. 24.

CONGRVVS MORBVS.

In morbis minus periclitantur , quorum naturae , & ae-
tati ,

tati, & habitui, & tempori magis similis fuerit morbus, quam in quibus horum nulli fuerit similis. *Aph. II. 34. VIII. 1.*

CONSVETVDO.

Consuetudini aliquid concedendum. *Aph. I. 17.*

A multo tempore consueta, etiamsi fuerint deteriora, infuetis minus turbare solent. Oporter igitur etiam ad insolita mutare. *Aph. II. 50.*

Consueti solitos labores ferre, etiamsi fuerint debiles, aut senes, infuetis, robustis licet, & iuuenibus, facilius ferunt. *Aph. II. 49.*

Praeter consuetudinem aliquid facere, prauum, & de-
hrio proximum. *Coac. 47.*

CONTRARIA.

Contraria contrariorum sunt medicamina. *De Flat. II. 15.*

A repletionem quicumque fiunt morbi, evacuatio sanat: Et quicumque ab evacuatione, repletio: Et aliorum contrarietas sanat. *Aph. II. 22. De Nat. hum. XVII. 11. & seqq.*

Medicum scire oportet, opponere se contrarium instantibus, & morbis, & naturis, & temporibus, & aetatibus, & dissidentia solvere, & soluta distendere. *De Nat. hum. XVIII. 1. & seqq.*

CONVULSIO.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Aetas tenella infantum usque ad 7. annum. *Prænot. 15.*

Tempus dentitionis. *Aph. III. 25.*

Frigidum. *Aph. V. 17. 20.*

Frigus partium posteriorum. *Coac. 7.*

Repletio, aut evacuatio. *Aph. VI. 39.*

Dolores faucium vehementes. *Coac. 268.*

Paucium gracilium praefocantes dolores, ex capitis dolore orti. *Coac.* 262.

Largae sanguinis ex naribus eruptiones, per vim suppressae. *Coac.* 336.

Phrenitis. *Coac.* 96. *Praenot.* 152.

Ossum ad tempora effracturae. *Coac.* 188.

Quibus tempora secantur, iis ex adversa sectionis parte convulsio contingit. *Coac.* 498.

In pueris, si febris acuta fuerit, venter non deiciat, si vigilant; perterreantur, plorent assidue, & color immutetur, & ex viridi pallidus, aut lividus, aut ruber contrahatur. *Praenot.* 151. *Coac.* 109.

Elleborus sano corpore adhibitus. *Aph.* IV. 16.

NOTA PRIVATIVA.

Quibus tumores in ulceribus apparent, non valde convelluntur; neque insaniunt. *Aph.* V. 65.

NOTAE ANTECEDENTES.

Humorum decubitus in morbis melancholicis. *Aphor.* VI. 56.

Capitis dolor, cum tenui sudore, & alvo intercepta. *Coac.* 177.

Graues & acuti capitis dolores, cum torpore, & gravitatis sensu. *Coac.* 171. 174.

Ex praegresso dolore, rubores ad aures subnascentes, in febribus. *Coac.* 200.

In tremulis, & anxietate vexatis, parvi ad aures tumores excitati; si alvus male affecta sit. *Coac.* 353.

Alvus circumtensa, ad necessitatem liquida demittens, celeriter intumescens. *Praedict.* I. 99.

Ex perfrigeratione metus, ac animi abiectio praeter occasionem. *Coac.* 4.

Desipientiae cum sopore. *Coac.* 84.

Mentis emotiones sensim feroces, tandem ferinae. *Coac.* 85.

Turbulentae cum confidentia expergefactiones, quae mentem emoveant, praesertim si cum sudore contingant. *Coac.* 83.

Crebrae in phreniticis permutationes. *Coac.* 101.

In praecipitibus malis, corporis motio, iactatio, ac turbulentus somnus. *Coac.* 82.

Cervicis ac dorsi perfrigerationes, praesertim quae totum corpus pervadunt, in quibus mictiones membranularum speciem referunt. *Coac.* 83.

Lumborum & oris ventriculi dolor, cum forti secretione. *Coac.* 320.

Praecordia non mollia, & facies bene habita. *Coac.* 296.

Si venae temporum pulsant in febribus, cum facie bene habita, absque praecordiorum mollitie. *Coac.* 128.

Temerarii ventris tumores in morbis longis. *Coac.* 86.

Tumores ulcerum in postica parte, repente disparantes. *Aph.* V. 65.

Quae ex lumbis in cervicem, & caput redundant, levis siderationis more, resolutionis sensum inducunt. *Coac.* 313.

Post tremores, ac sudores, somnus multus, frontis gravitates, ac mictio molesta. *Coac.* 348.

Qui subinde rigoreprehenduntur, & sub noctem aliquanto gravius habent, pervigiles, in somnis nugantes, aut delirantes, interdum sese lotio perfundentes. *Praedict.* I. 101.

Vesica intercepta, maxime cum capitis dolore. *Coac.* 588.

Vox acuta, eiulabunda, & oculorum hebetudo. *Coac.* 257.

NOTAE COMITANTES.

Spiratio magna, & ex longis intervallis. *Coac.* 260.

In febribus spiritus offendens, malum. Convulsionem enim significat. *Aph.* IV. 68.

Urina membranosa. *Coac.* 582. 584.

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE, & SPEI.

Febrem convulsioni supervenire melius est, quam convulsionem febri. *Aph.* II. 26.

In uteri strangulatu non antea expertae convulsionem faciles sunt. *Coac.* 349.

Con-

Convulsiones in hystericis, sine febre. *Praedict. I. 119.*

Convulsio in febre suborta, eademque die desinens.
Coac. 156.

Convulsio in febre suborta, febri 1. 2. vel 3. die
finiens. *Coac. 157.*

A convulsione, aut tetano defento, febris superveniens
solvit morbum. *Aph. IV. 57. Coac. 354. 358.*

A quartanis correpti, a convulsione non admodum
corripiuntur. Si vero prius corripiantur, & postea
quartana supervenerit, liberantur. *Aph. V. 70.*

Convulsionem muliebria, si circa initia appareant, ne-
que febris accesserit, solvunt. *Coac. 531.*

DETERIORIS NOTAE, & maioris PERICULI.

Convulsio feбри succedens, periculum denunciat, mi-
nimum vero pueris. *Coac. 356. 357.*

Convulsio horam, quaprehendit, superans, nec de-
sinens. *Coac. 157.*

In febre convulsio, manuumque ac pedum dolores,
malignum quiddam praenunciant. *Coac. 30.*

In febribus acutis, convulsiones, & circa viscera do-
lores vehementes, malum. *Aph. IV. 56.*

Si fluxui muliebri convulsio, & animi deliquium su-
perveniat, malum. *Aph. V. 56.*

Quibus dum convelluntur, oculi fixi, & immoti splen-
dent. *Praedict. I. 124. Coac. 351.*

Loquendi impotentia in convulsionibus multum perse-
verans, malo est. *Coac. 359.*

Ex tremoribus, quae convulsiones fiunt, cum sudori-
bus, recidivas minantur. *Coac. 348.*

Ab ardoribus vehementibus convulsio, aut tetanus,
malum. *Aph. VII. 13.*

Convulsio a sanguine multo effuso. *Aph. V. 3. VII. 9.*

Ab ileo. *Aph. VII. 10.*

A Vigilia. *Aph. VII. 18.*

A purgatione immodica. *Aph. V. 4. Coac. 565.*

A vomitionibus sinderis. *Coac. 565.*

LETHALIS.

Convulsio ex ebrietate, cum aphonía improvísá, nisi febris corripuerit, aut soluta crapula homo ad vocem redierit. *Aph. V. 5.*

Convulsio ex Elleboro, lethale. *Aph. V. 1. Coac. 567.*

A purgantis potione convulsio, lethale. *Aph. VII. 25.*

Vulneri convulsio superveniens, lethale. *Aph. V. 2.*

Coac. 355. 506.

Convulsiones cum febre acuta, perniciem denunciant.

Coac. 269.

Cum rigore, & febre, inordinate ingravescentibus.

Coac. 26.

ALIUM MORBVM PORTENDENS.

Infanientibus accedens convulsio, oculorum aciem retundit. *Coac. 485.*

Loquendi impotentia in convulsionibus, parum durans, linguae, aut brachii, aut eorum, quae in dextra parte sunt, siderationem denunciat. *Coac. 359.*

AD THERAPIAM.

Calidum convulsiones mitigat. *Aph. V. 22.*

Item frigida multa affusa. *Aph. V. 25.*

CONVULSIO TETANVS DICTA.**AD DIAGNOSIN.****CAUSAE ANTECEDENTES.**

Frigidum. *Aph. V. 17.*

Frigidum ulceribus admotum. *Aph. V. 20.*

Tumores ulcerum in postica parte, repente disparescentes. *Aph. V. 65.*

AD PROGNOSIN.**MELIORIS NOTAE.**

Convulsio, vel tetanus, a febre superveniente sanabilis. *Aph. IV. 57. Coac. 354.*

DETERIORIS NOTAE.

Ab ardoribus vehementibus convulsio, vel tetanus, malum. *Aph. VII. 13.*

LETHALIS.

Qui a tetano corripuntur in quatuor diebus pereunt;
si vero hos effugerint, sani fiunt. *Aph. V. 6.*

In tetanis, & opisthotonis, dissolutae maxillae mortem
afferunt. *Coac. 361.*

AD THERAPIAM.

Est vero, ubi in tetano sine ulcere, iuveni bene car-
noso, aestate media, frigidae multae affusio; caloris
revocationem facit; calor autem haec solvit. *Aph.*
V. 21.

CONVULSIO OPISTHOTONOS DICTA,
AD DIAGNOSIN.

Ex capite dolentes, & alto stupore detenti, ac deli-
rantes, cum alvi interceptione, & ferociente intui-
tu, floridi, opisthotono tentantur. *Praedict. I. 88.*

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Febres cum posteriorum partium distentione, urinae
genitale semen referentes solvunt. *Coac. 362.*

NOTAE LETHALES.

Maxillae resolutae. *Coac. 361.*

Sudare, & corpus dissolvi, ac per nares removere,
aut ubi per initia vox defecta fuit, clamare, aut
nugari. *Coac. 361.*

COR.

Eius vulnus lethale. *Aph. VI. 18. De Morb. I. III. 4.*

CORPVS.

Corporis nullum est principium, sed omnes partes ae-
que principium, & finis sunt. *De Loc. in hom. I. 1.*

Corpus totum inspirabile, & expirabile est. *Epid. VI.*

CORYZA, vid. GRAVEDO.

COXAE DOLOR.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Aetas a 40. ad 60. annos. *Praedict. II. 176.*

Tempus autumnale. *Aph. III. 22.*

Lumborum frigiditas, & gravitas, cum alvi suppressione, tempore hiemali. *Coac. 487.*

Febres longae & vehementes quaedam, ad solutionem spectantes. *Coac. 294.*

NOTAE ANTECEDENTES.

Praecordiorum dolores in febre, aegro fari nequeunte, si absque sudore solvantur. *Coac. 297. Praedict. I. 90.*

Mammae ex gracilibus rursus durae, in gravidis. *Aph. V. 53.*

Surditas in morbis longis. *Coac. 190.*

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Dolor ad coxas, supernarum partium dolorem solvens. *Epid. II. VI. 47.*

Febrim ardentem solvens. *De Indicat. XI. 2.*

Tussim siccam solvens. *Epid. II. V. 23.*

DETERIORIS NOTAE.

Dolor ischiadicus coxam dislocans, & si haec rursus incidat, mucum ingenerans. *Aph. VI. 59.*

Dolor coxendicis diuturnus coxam dislocans, inde cruris tabem, & claudicationem inducens, nisi urantur. *Aph. VI. 60.*

Dolores ad coxendices, cum febre ardente, & alvo affatim erumpente, post dolores in febre ad praecordia affilientes, sine sudore solutos. *Coac. 299. Praedict. I. 90.*

AD THERAPIAM.

In Ischiade confert, mollire per balnea, & tepesfactoria, ac fomenta, & alvum subducere; ubi vero
quie-

quieverit dolor, deorsum purgare, & postea lac a-
finium coctum bibere. *De Affect. XXX. 4. ad 7.*

CRANII FRACTURA.

AD DIAGNOSIN.

VARIAE NOTAE.

Fracturae circa Sutures, cognitu difficillimae. *Coac. 501.*

Ossa capitis fissa 7. die, partim 14. partim etiam 21.
lias, sui significationem edunt. *Coac. 501.*

NOTAE COMITANTES.

Ab osse percusso delirium, si in vacuum penetraverit.

Aph. VII. 24.

Strepitus ossis in loco laesionis, dum aliquid inter
dentes manducatur. *Coac. 501.*

Caro ab osse abscedens, aut os livescens, aut dolores
ex saniei influxu oborti. *Coac. 501.*

AD PROGNOSIN.

Si os frangitur alia capitis parte, quam qua vulnera-
tum, & nudatum est, huic malo nullis remediis
subvenies. *De Cap. Vuln. IX. 1.*

Quibus ex posteriore parte ossibus fractis, capitis do-
lor inest, vehemens & crassa e naribus fluxio, malo
est. *Coac. 188.*

CRISIS. IUDICATIO.

AD DIAGNOSIN.

NOTAE ANTECEDENTES.

Quibus iudicatio contingit, iis nox accessionem praece-
dens gravis, succedens vero plerumque levior esse
solet. *Aph. II. 13.*

Crassiores fieri deiectionem oportet, morbo ad iudi-
cationem procedente. *Praenot. 61.*

Quibus 7. die crisis contingit, iis urina rubram die 4.
nubeculam habet, aliaque pro ratione. *Aph. IV. 71.*

Oculorum claritas, ac eorum album ex nigro, aut li-
vido clarum fieri, ad iudicationem confert. *Coac.*

NOTAE IUDICATIONIS CITAE, vel TARDAE.

Oculi quo celerius clarescunt, eo celeriore iudicationem: at tardius, tardiore significant. *Coac.* 217.
 Quibus in urinis cito aliquid subsidet, hi brevi iudicantur. *Coac.* 598.

NOTAE LONGITVDINIS.

Iudicationis cessationes in febribus. *Coac.* 74.

Abscessus in febribus, qui non solvuntur ad primas indicationes. *Aph.* IV. 51.

AD PROGNOSEIN.**NOTAE CRISIS SUSPECTAE.**

Rigor, qui cum indicatione fit. *Coac.* 321.

His, quae non secundum rationem levant, credere non oportet: neque timere valde, quae praeter rationem sunt prava. *Aph.* II. 27.

NOTAE RECIDIVAE.

Quae per morbos post crisin relinquuntur. *Aph.* II. 12.
 Febricitantem nisi diebus imparibus febris dimiserit, reverti solet. *Aph.* IV. 61.

AD THERAPIAM.

Quae iudicantur, & indicata sunt perfecte, neque movere oportet, neque innovare, sive purgantibus, sive aliis irritamentis, sed sinere. *Aph.* I. 20.

CRITICI DIES.

Febres iudicantur die 4. 7. 11. 14. 17. 21. Nonnullae etiam ex acutis, die 30. 40. & 60. *De Dieb. iud.* 15.
 Septenariorum dies 4. est index, alterius septimanae dies 11. tertiae dies 17. *Aph.* II. 24.

Sudores febricitantibus boni sunt, & indicatorii, qui coeperint die 3. 5. 7. 9. 11. 14. 17. 21. 27. 31. 34. *Aph.* IV. 36.

Quibus ex naribus fluxiones die 7. 9. aut 14. contingunt, ut plurimum a febribus iudicant. *Coac.* 152.

Similiter alvi fluxus biliosus, & dysentericus, ac genitum & coxendicum dolor, urina sub iudicationem congesta, & in muliere mensium profluvium. *Coac.* 152.

CRVR. CVB. CVT. DEC. 63
CRVRVM ABSCESSVS, vid. ABSCESSVS
ad CRVRA.

CRVRVM DOLOR.

Dolor fortis ad crura, solvit tussim siccam. *Epid. II. V. 23.*
Quos derepente, absque febre, praecordiorum, aut
oris ventriculi dolor, aut crurum, & inferiorum
partium affligit, alvusque intumescit, venaesectio,
aut alvi fluxus solutionem adfert, *Coac. 294.*

CVBITVS.

Cubiti, & colli dolores, convulsorii sunt, *Praedict. L.*
114. Coac. 276.

CVTIS.

AD DIAGNOSIN.

Cutis viris rara est. Hoc quidem pilus indicat. *Aph.*
V. 69.

Cutis corporis squalida, & plus aequo sicca, male af-
fectae alvi index est. In his praerubrae carunculae
purulentae fere ex alvo prodeunt. *Coac. 625.*

Cutis raritas, ventris densitas; cutis contritio, car-
nium incrementum. *Epid. VI. III. 1. 2.*

AD PROGNOSIN.

Quibus cutis obtenditur arida, ac dura, sine sudore
moriuntur. Quibus vero laxa, ac rara, cum sudore
moriuntur. *Aph. V. 71.*

Cutis circa frontem dura, intenta, & resiccata, cum
aliis notis faciei Hippocraticae, lethalis. *Praenos. 2.*
Coac. 212.

DEAMBULATIO, vid. MOTVS.

DECVBITVS.

AD DIAGNOSIN.

In ventrem iacere, ei qui per bonam valetudinem ita
dormire minime consuevit, delirium, aut partium cir-
ca ventrem dolorem iadicat. *Praenos. 13. Coac. 497.*

AD

BONAE NOTAE.

Decubitus optimus, qui bene valentium similis est.
Praenot. 8. Coac. 497.

Decubitus in latus dextrum, aut sinistrum, manibus, & cervice, & cruribus paulum reductis, totoque corpore molliter posito; hic enim fere sani iacentis est habitus. *Praenot. 8.*

Aegrum facile converti oportet, & cum sese attollit, levem esse. *Praenot. 48.*

DETERIORIS NOTAE.

Supinum iacere, manibus, cervice, & cruribus porrectis. *Praenot. 9. Coac. 497.*

Pronum fieri, & subinde deorsum ad pedes prolabi.
Praenot. 10. Coac. 497.

Cum reliquo corpore, tum manibus, & pedibus, gravem esse. *Praenot. 49.*

Pedes nudos, neque admodum calidos habere, & magnus, & cervicem, & crura inaequaliter dispersa, & nuda. *Praenot. 11. Coac. 497.*

Aegrum residere velle in ipso morbi impetu, pravum in omnibus morbis acutis, pessimum in peripneumoniacis. *Praenot. 14. Coac. 497.*

LETHALIS.

Lethale quoque, & hianti ore assidue dormire; & ubi supinus iacet, cruribus valde contortis, & implexis. *Praenot. 12. Coac. 497.*

DEGLUTITIO.

Potum aegre deglutienti, cum spiritu tussiculoso, eructatio quodammodo revulsa, intro convoluta, ventris dolorem denunciat. *Coac. 632.*

Si a febre detento collum derepente inversum fuerit, & vix deglutire possit, tumore non existente, lethale. *Aph. IV. 35. VII. 58. Coac. 278.*

DEIECTIO, *vid. ALVI DEIECTIO.*
DE-

DELIRIVM.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Ab offe percusso delirium , si in vacuum penetraverit.

Aph. VII. 24.

NOTAE ANTECEDENTES.

Aurium sonitus , cum visus hebetudine , & gravitatis sensu ad nares. *Coac. 194.*

Dolores circa umbilicum palpitantes ; & sub indicationem plurimus & creber flatus ; nec non dolores ad furam. *Praedict. I. 36.*

Dolor capitis , cum siti , levi pervigilio , obscura loquela , ad motum impotentia , humecta alvo , & lassitudine. *Coac. 175.*

In ventrem iacere , praeter consuetudinem. *Praenot. 13. Coac. 497.*

Praeter consuetudinem aliquid facere , ut v. g. aliquid propensius curare , & magno studio eniti , prius non consuetum , aut contra , pravum , & delirio proximum. *Coac. 47.*

Lumborum dolor in caput recurans , cum manuum torpore , & oris ventriculi dolore , vel aurium sonitu. *Coac. 303.*

Lumborum tensio ex mensium copia ; tum varie prodeuntia , glutinosa , graveolentia strangulatum inducentia , suppurationem indicantia. *Coac. 324.*

Nam in vocis defectione , respiratio suffocativa , conspiciue elata , & visui exposita ? *Coac. 252.*

Somnus diu nocturneque deficiens. *Coac. 497.*

In turbatis vigilantibus , urinae decolores , cum nigris sublimamentis , & tenuibus sudoribus *Praedict. I. 4.*

NOTAE COMITANTES.

Quicumque aliqua corporis parte dolentes , dolorem ferre non sentiunt , his mens aegrotat. *Aph. II. 6.*

Leves , & per intervalla lateris dolores , post biliosas,

& sinceræ deiectiones , cum spumosa efflorescentia .
Praedict. I. 22.

Flatus cum strepitu emissus , nisi aeger studio id fecerit .
Coac. 495.

Lingua tremula . *Coac. 233.*

Oculi intense splendentes in convulsionibus . *Coac. 351.*

Pulsus in praecordiis . *Praenot. 31.*

Inspiratio magna , & rara . *Praenot. 19.*

AD PROGNOSIN .

MELIORIS NOTAE .

Deliria , cum risu quidem accidentia , securiora : cum studio vero , periculosiora . *Aph. VI. 53.*

Vbi somnus delirium sedat , bonum . *Aph. II. 2.*

Delirium solvens tremores , in febre ardente . *Aph. VI. 26.*

DETERIORIS NOTAE .

Deliria cum studio . *Aph. VI. 53.*

Mentis emotio , cum furarum doloribus , praecipue si sublime quid in urina innatet . *Coac. 30.*

Desipientiae cum voce stridula , linguae revulsione , ac ipsi quoque tremuli , vehementem mentis alienationem significant . In his durities & asperitas perniciem minatur . *Coac. 99.*

A multo potu rigor , & delirium , malum . *Aph. VII. 7.*

Delirium a plaga in caput . *Aph. VII. 14.*

Ab ileo . *Aph. VII. 10.*

A sanguinis fluxu . *Aph. VII. 9.*

A vigilia . *Aph. VII. 13.*

LETHALE.

Desipientiae , quae circa necessaria fiunt , pessimae : & quae ex his ingravescent , exitium portendunt . *Coac. 98.*

Quae caput quodammodo concutiant , cum intensa oculorum rubedine , ac manifesto delirio , perniciem denunciant . Neque tamen hoc ad mortem comitatur , verum circa aurem tumorem excitat . *Coac. 163.*

De-

Desipientiae , quae iam admodum fractis , & debilitatis viribus succedunt , pessimae . *Coac.* 100. *Praedict.* I 8.

Vbi in febre non intermittente difficultas spirandi , & delirium fit , lethale . *Aph.* IV. 50.

Delirium circa febrium initia obortum , nisi aut prorsus optimum aliquod signum supervenit , aut corporis virtus subsit . *Praedict.* II. 95.

Ad dentis siderationem vehemens accedens febris cum delirio , mortem minatur . *Coac.* 237.

Lumborum dolores ad os ventriculi recurstantes , cum febre , horrore , si tenuia , & aquosa , vomitione reiecerint , delirant , voce defesti sint , ii post nigrorum vomitionem moriuntur . *Coac.* 316.

ALIVM MORBVM PORTENDENS.

CONVULSIONES.

Desipientiae cum sopore , convulsiones minantur . *Coac.* 84.

Qui subinde rigoreprehenduntur , & sub noctem aliquanto gravius habent , pervigiles , in somnis nugantes , ac delirantes , interdum se lotio perfundentes , ii in convulsionem tendunt . *Coac.* 20.

OPISTHOTONVM.

Ex capite dolentes , & alto stupore detenti , ac delirantes , cum alvi interceptione , & ferociente intuitu , floridi , in scapulas rigescunt , ac posteriorum partium distentione tentantur . *Coac.* 162.

HAEMORRHAGIAM.

Quibus in morbis subita fit mentis percussio , cum inquietata corporis iactatione , iis sanguinis eruptionem fore , spes est . *Coac.* 184.

PHRENITIDEM.

Dementiae , in quibus aegri sunt tremuli , & aliquid investigantium more sensim contrectant , aut palpant , phrenitim praenunciant . Quin & ad furam dolores , in his mentem emovent . *Coac.* 76.

CONF MANIA , MELANCHOLIA , PHRENITIS , DEMENTIA , *vid.* MANIA.

DENTES.

AD DIAGNOSIN.

Aetas 4 septenarii dentes sapientiae profert, plerumque duos. *De Princip. & Carn. XIV. 3. 4.*

Homines longaevi plures dentes habent. *Epid. II. VI.*

Quibus in febre ad dentes viscosa circumascuntur, his febres sunt vehementiores. *Aph. IV. 53.*

AD PROGNOSIN.

Dentium collisio, aut stridor, praeter consuetudinem a teneris contractam, infantiam ac mortem denunciat. Quod si iam deliranti istud accidat, prorsus exitiale est. Quin & dentes resiccati, perniciem denotat. *Coac. 235.*

Dentium sideratio abscessum ad gingivas enatum solvit. *Coac. 236.*

Ad dentis siderationem vehemens adcedens febris, cum delirio, mortem minatur. Quod si servantur aegri, ulcera pus colligent, & ossa abscedent. *Coac. 237.*

AD THERAPIAM.

Frigidum, dentibus inimicum. *Aph. V. 18.*

DENTITIO.

AD DIAGNOSIN.

Qui cum tussicula dentiunt, tardius dentes producant, in perpunctione autem magis gracilescunt. *De Dentit. II. 6.*

Ad dentitionem adcedentibus, gingivarum pruritus, febres, convulsiones, alvi profluvia; & maxime, ubi caninos dentes producant, & iis qui inter pueros sunt crassissimi, & qui alvos duras habent. *Aph. III. 25.*

AD PROGNOSIN.

Quibus in dentitione alvus amplius subducit, minus convelluntur, quam quibus parum. *De Dentit. II. 1.*

Quibus in dentitione febris acuta adcedit, parum convelluntur. *Ibid. 2.*

Qui-

Quicumque dentientes habitiores manent, & altiore somno utuntur, periculum est; ne convulsione corripiantur. *Ibid.* 3.

Qui hieme dentiunt, reliquis similibus existentibus, melius liberantur. *Ibid.* 4. 7.

Non omnes, in dentitione convulsi, moriuntur, sed multi etiam servantur. *Ibid.* 5.

DESIPIENTIA, vid. DELIRIVM.

DIAETA SANORVM.

REGVLAE GENERALES.

Et quibus semel, aut bis, & plura, vel pauciora, & per partes offerri conducatur, videndum. Concedendum autem aliquid & consuetudini, & tempestati, & regioni, & aetati. *Aph.* I. 17.

Non satietas, non fames, neque aliud quicquam bonum est, quod naturae modum excedat. *Aph.* II. 4.

Facilius est repleri potu, quam cibo. *Aph.* II. 11.

Sanis periculosus est valde tenuis, & constitutus, & exquisitus victus; quia delicta gravius ferunt. Ob hoc igitur tenuis, & exquisitus victus, periculosus magis quam paulo plenior. *Aph.* I. 5.

Aestate & autumnno cibos difficillime ferunt, hieme facillime, deinde vere. *Aph.* I. 18.

Imbecilla victus ratio frigida, valida vero calida. *Epid.* VI. IV.

Oportet ad aetatem, & ad tempus anni, & ad corporum species, ac habitus, diaetas constituere. *De Sal. diet.* II. 9.

Occasio haec est, ut cibos offeramus ea copia, quantum corpus, cui offeruntur, superare valeat. *De Loc. in hom.* LIV. 7.

DIAETA IVNIORVM.

Quae crescunt, plurimum habent calidi innati, plurimo igitur egent alimento: sin minus, corpus consumitur. *Aph.* I. 14.

Iuniores corpora sicca & compacta habent, ipsisque mollior & humidior diaeta confert. *De Sal. diet. II. 5.*

Cibus iuvenibus facile ac leviter putrefactus. *De Aliment. IX. 1.*

His, qui in vigore aetatis consistunt, impermutabilis. *Ibid.*

SENIORVM.

Senibus paucus calor, propterea paucis fomitibus indigent: a multis enim extinguitur. Idcirco etiam febres senibus non similiter acutae. Frigidum enim est corpus. *Aph. I. 14.*

Senibus convenit cibus ad summum transmutatus. *De Alim. IX. 1.*

Seniores siccioris victus modo, maiori temporis parte degere oportet; corpora enim in hac aetate, humida sunt, & mollia, & frigida. *De Sal. diet. II. 7. 8.*

DIAETA HOMINVM NATURA HUMIDORVM.

Habitibus corporum carnosus, & mollibus, ac rubris, plurimo anni tempore, siccioribus dietis uti conducit. Humida enim est ipsorum natura. *Ibid. II. 12.*

NATVRA SICCORVM.

Duros & graciles, fulvosque ac nigros, humidioris diaeta maiori temporis parte victitare oportet. Corpora enim talia sicca existunt. *Ibid. 3. 4.*

Calidae naturae refrigeratio, aquae potus, & quies. *Epid. VI. IV.*

DIAETA AESTIVA.

Aestate convenit maza mollis, & potus aquosus, ac multus, obsonia omnia cocta. *De Sal. diet. I. 17.*

AVTVMNALIS.

Autumno cibi plures, & sicciores, & obsonia iuxta eandem rationem; potus vero pauciores, & meraciores. *Ibid. 25.*

HIEMALIS.

Hieme iuvat comedere quamplurima, bibere autem quam parcissime. Sit potus vinum quam meracissimum,

num, cibi, panis, & obsonia affata omnia. Oleribus quam paucissimis hoc tempore utendum. *De Sal. diet. I. 2. ad 6.*

Ventres hieme & vere natura sunt calidissimi, & somni longissimi. In his igitur temporibus etiam alimenta plura exhibenda. Innatum enim calorem maiorem habent. Nutrimento igitur copiosiore indigent. Iudicium sunt aetates, & athletae. *Aph. I. 15.*

VERNALIS.

Vere potum ampliozem assumere oportet, vinum dilutius, & paulatim. Cibis quoque mollioribus, ac paucioribus tum utendum est, & ablato pane, mazam exhibere; & iuxta eandem rationem obsonia detrudere, & ex assatis omnia cocta facere. Oleribus vero paucis tunc uti oportet, donec ad aestatem perveniat homo, cibis mollioribus utendo, & obsoniis coctis, & oleribus tam crudis, quam coctis; similiterque potibus quam dilutissimis, ac plurimis. Itz tamen ut paulatim, non derepente his utatur, ne videlicet magna mutatio fiat. *De Sal. Diet. 8. ad 16.*

DIAETA AEGRORVM.

REGVLAE GENERALES.

Ex hominum adhuc sanorum victus ratione discendum, quatenam in eorum morbis conveniant. *De Vlt. acut.* Quae longo tempore extenuantur corpora, lente reficere oportet; quae vero brevi, celeriter. *Aph. II. 7.* Quicumque veloci adpositione opus habent, his humidum ad reficiendas vires medicamen optimum. Quicumque vero adhuc velociori indigent, per elactum. Qui autem tardiore adpositione opus habent, solido alimento utantur. *De Aliment. 5. 6. 7.*

Aegrotis aliquid indulgere licet in iis, quae non valde nocent, aut quorum noxa facile refarciri queat; *Epid. VI.*

Impura corpora , quo magis nutritiveris , eo magis lae-
des. *Aph. II. 10. VII. 67.*

Si a morbo cibum quis capiens non roboretur , indicat
corpus uberiore alimento uti. Si vero cibum non
cipienti hoc eveniat , evacuatione opus habere , nos-
se oportet. *Aph. II. 8.*

Multum & derepente evacuare , aut replere , aut cale-
facere , aut frigefacere , aut aliter quocunque modo
corpus movere , periculosum est. Nam etiam omne
multum (idest nimium) naturae est inimicum . Quod
vero paulatim fit , tutum est : tum alias , tum si quis
ex altero ad alterum transeat. *Aph. II. 51.*

RATIONE VICTVS TENVIORIS, vel PLENIORIS.

In exercitantibus boni habitus ad summum progressi ,
periculosi , si in extremo fuerint . Non enim possunt
in eodem manere , neque quiescere . Cum vero non
quiescant , neque ultra possint in melius proficere ,
reliquum igitur in deterius . Horum igitur causa bo-
num habitum solvere confert haud cunctanter , quo
rursus renutritionis principium sumat corpus . Neque
confidentiae ad extremum ducendae : periculosum e-
nim . Sed qualis natura fuerit eius , qui perferet ,
eo usque ducendae . Sic & evacuationes ad extremum
ducentes , periculosae . Et rursus refectiones , cum
extremae fuerint , periculosae. *Aph. I. 3.*

Tenuis & exquisitus victus in longis morbis semper , &
in acutis , ubi non convenit , periculosus . Et rursus
ad extremum tenuitatis progressus victus , difficilis .
Nam & repletiones ad extremum progressae , diffici-
les sunt. *Aph. I. 4.*

In tenui victu delinquant aegri , ob id magis laeduntur .
Omne enim delictum , quod committitur , multo ma-
ius fit in tenui , quam in paulo pleniori victu. *Aph.*

I. 5.

Vbi cibis praeter naturam copiosior ingressus fuerit , id
morbum facit . Ostendit autem sanatio , *Aph. II. 17.*

Vbi

Vbi peracutus est morbus, statim extremos habet labores, & extreme tenuissimo victu uti necesse est. Vbi vero non, sed plenius cibare licet, tantum a tenui recedendum, quantum morbus remissior extremis fuerit. *Aph. I. 7.*

RATIONE STATUS MORBOSI.

Considerare oportet etiam aegrotantem, num ad morbi vigorem victu sufficiet, & an prius ille deficiet, & victu non sufficiet: vel morbus prius deficiet, & obundetur. *Aph. I. 9.*

Cum morbus in vigore fuerit, tunc vel tenuissimo victu uti necesse est. *Aph. I. 8.*

Quibus statim vigor adest, statim tenuiter alendi. Quibus vero in posterum vigor, his ad illud, & paulo ante illud tempus subtrahendum. Antea vero uberius alendum, ut sufficiat aeger. *Aph. I. 10.*

In exacerbationibus cibum subtrahere oportet; exhibere enim noxium est. Et quaecunque per circuitus exacerbantur, in exacerbationibus subtrahere oportet. *Aph. I. 11.*

His, qui per circuitus exacerbantur, nihil dare oportet, neque cogere, sed auferre de adpositionibus ante iudicationes. *Aph. I. 19.*

Si quis febricitanti cibum det, convalescenti quidem, robur: aegrotanti vero, morbus fit. *Aph. VII. 65.*

DIAPHRAGMA.

Eius vulnus lethale. *Aph. VI. 18.*

DIARRHOEA, vid. ALVI FLUXVS.

DIES CRITICI, vid. CRITICI DIES.

DIGITI.

Si cum gravitate digiti ac ungues lividi fiant, in propinquo mors est. At si omnino nigrescant, minusquam liventes periculum portendunt. Verum tunc reliqua consideranda sunt. Etenim si facile morbum susti-

sustinet aeger, & aliud quiddam ex his, quae securitatem pollicentur, se prodit, morbus in abscessum vergit, & denigratae corporis partes decidunt. *Coac.* 493.

DOLOR.

AD DIAGNOSIN.

Quicumque aliqua corporis parte dolentes, dolorem ferre non sentiunt, his mens aegrotat. *Aph.* II. 6.

Duobus doloribus simul obortis, non in eodem loco, vehementior alterum obscurat. *Aph.* II. 46.

Circa puris generationes, dolores, & febres magis accidunt, quam ipso facto. *Aph.* II. 47.

Flatus cum strepitu prodians, dolorem & delirium denunciat, nisi sua sponte aeger ita flatum emiseric. *Coac.* 495.

Spiratio frequens, & parva, aut inflammationem, aut dolorem partium principalium indicat. *Coac.* 260.

Vrina, in qua quod subsidet bonum est, & derepente evanescit, dolorem ac mutationem denunciat. *Coac.* 585.

Dolores circa umbilicum cum palpitatione, mentis alienatae significationem quandam praebent. *Praedict.* I. 36.

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Pallidis, gracilibus, salivantibus, & in somno sudantibus, si dolores ad inferiora decumbant, toleratu faciles existunt. *Coac.* 271.

Virium exsolutio dolorem solvens. *Coac.* 629.

Dolorem in locis infernis fortem surditas solvit, itemque sanguis multus ex naribus erumpens. *Epid.* II V. 9.

NOTAE LONGIORIS MORBI.

Dolores ex glandularum tumoribus, in febribus. *Coac.* 73.

Et vehementibus doloribus obortae febres, diuturnae. *Coac.* 75.

NOTAE PERICULI.

A dolore diuturno partium circa ventrem suppuratio
malum. *Aph. VII. 22.*

Femoris dolore evanescente, si quid sublime per uri-
nam innatet, mentis emotionem expectare oportet,
talique, qualia circa aurium sonitus contingunt.
Prædict. I. 37.

NOTAE LETHALES.

Dolores sensim ingravescentes, si ad iugulum, & supe-
riores partes transeant, perniciem minantur. *Coac. 70*

AD THERAPIAM.

Calidum dolores sedat. *Aph. V. 22.*

Torpor modicus doloris solvendi vim habet. *Aph. V. 25.*

DOLOR VARIARVM PARTIVM, vid. sub nomine
PARTIVM.

DYSENTERIA.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Aetas virilis. *Aph. III. 30.*

Tempus autumnale. *Aph. III. 22.*

Tempus aestivum, post hiemem siccam, & aquiloniam,
ver autem pluviosum, & austrinum. *Aph. III. 11.*

Ver siccum, & aquilonium, post hiemem austrinam,
& pluviosam, & tranquillam. *Aph. III. 12.*

Siccitates. *Aph. III. 16.*

Alvi profluvium. *Aph. VII. 75.*

NOTAE ANTECEDENTES.

Num quae caput concutiunt, & aurium sonitus exci-
tant? *Coac. 167.*

In febribus, venae, quae est in cervice, pulsatio, & do-
lor, rem ad intestinorum difficultatem deducit. *Coac.*
124.

Tumores rubicundi in ulceribus, quae in antica parte
fuerint, derepente disparentes. *Aph. V. 65.*

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Lienosis dysenteria superveniens, bonum. *Aph. VI. 48.*
non longa. *Coac. 456.*

Ab infania dysenteria, bonum. *Aph. VII. 5.*

Dysenterico plurimum inest spei, cui pravorum symptomatum paucissima adsunt. *Praedict. II. 118.*

Vbi sanguis, & strigmenta per alvum reiecta fuerint 7. die desinunt, aut 14. aut 20. aut 40. aut intra hoc tempus. Huiusmodi namque deiectiones etiam eos, qui ante fuerunt, morbos tollunt; inveteratos quidem, spatio temporis maiore; recentes vero, etiam paucis diebus levare possunt. *Praedict. II. 121.*

DETERIORIS NOTAE.

A meraca deiectione dysenteria, malum. *Aph. VII. 23.*
Intestinorum difficultate laborantibus, vomitio biliosa circa initia, malum est. *Coac. 463.*

Tormina omnia mala sunt, si cum febre invadunt, aut variis alvi recrementis, aut iecoris inflammatione, aut praecordiorum, aut ventris; aut quaecunque doloribus cruciant, aut cibos cohibent, sitimque inferunt. *Praedict. II. 118.*

In gravi intestinorum difficultate, quibus humor ad pus pervenit, quod summum insidet, exalbidum erit, & copiosum. *Coac. 464.*

Praegnantes ipsae etiam plerumque ad partum supersunt, & ex partu, fetumque conservant, etiam si per multos menses sanguis, & strigmenta per alvum secedant, nisi si dolore affligantur, aut aliquod ex malis signis adcesserit. *Praedict. II. 122.*

Si aliquod ex malis signis adesse visum fuerit, & fetui perniciem, ac praegnantis periculum denunciat, nisi post fetus absolutionem, aut secundarum dimissionem, ipsa tormina eodem die, aut non multo post, cessaverint. *Praedict. II. 123.*

In longis dysenteriis cibi fastidia, mala, tum alias, tum si insuper febrierint. *Epid. VI. VIII. 1.*

LETHALIS.

Dysenteria si ab atra bile inceperit, lethale. *Aph. IV. 24.*
 Si a dysenteria detento, velut carunculae secesserint,
 lethale. *Aph. II. 26.*

Qui lienosi a dysenteria corripuntur, his longa superveniente dysenteria, hydrops supervenit, aut intestinorum levitas, & pereunt. *Aph. VI. 43. Coac. 466.*

Celerrime is perit, quem maxima pars malorum symptomatum occupat. *Praedict. II. 118*

Is morbus praecipue pueros a 5. anno perimit, & qui eum superant ad 10. usque: ceterae aetates tutiores sunt. *Praedict. II. 119.*

ALIVM MORBVM PORTENDENS.

A dysenteria intestinorum levitas supervenit. *Aph. VII. 76.*

Intempestive suppressa intestinorum difficultas, abscessum in costis, aut visceribus, aut articulis, inducit.

Ac forte biliosa quidem, in articulis: sanguinea vero, in costis ac visceribus abscessum facit. *Coac. 462.*

Intestinorum difficultate laborantibus, aliquantulum rubrae, limosae, & copiosae deiectiones, in flammeo colore, & praerubro perfusis solutae, insaniam suscipiunt. *Coac. 465.*

AD THERAPIAM.

Vbi purgaveris caput, pharmaco in potu exhibito, quod sursum pituitam purgat, & alvum lacte cocto elueris, reliquum corpus curato. Et siquidem febre caruerit, pinguibus, & dulcibus, ac liquidis semper, ea quae insunt, ex alvo subducito; & multa calida partes sub umbilico lavato, si dolor adfuerit. Potus autem, & sorbitiones, ac cibos exhibeto convenientes. *De Affect. XXIV. 4. ad 8.*

DYSVRIA. VRINAE DIFFICULTAS.**AD DIAGNOSIN.****CAUSAE ANTECEDENTES.**

Aetas

Aetas senilis. *Aph. III. 31.*

Tempus anni aquilonium. *Aph. III. 5.*

AD THERAPIAM.

Vrinae difficultatem venaesectio solvit: secundae vero internae. *Aph. VI. 36.* Vini potus, & venaesectio. *Aph. VII. 48.*

EBRIETAS.

Si quis ebrius ex improvise mutus fiat, convulsus moritur, nisi febris corripuerit: aut ubi ad horam, qua crapulae solvuntur, pervenit, locutus fuerit. *Aph. V. 5; De Morb. II. XXII. 2. 3. 4.*

Si quis inebriatus fuerit, utique quam prius magis sudaverit, & difficilius spirabit, & se ipso gravior, & humidior evadet. Quin & alacrior fuerit, nisi caput aliquatenus dolore vexetur. *Praedict. II. 24.*

ELLEBORVS.

AD PROGNOSIN.

Convulsio ex Elleboro, lethale. *Aph. V. 1.*

Ex epoto veratro, praerubrorum & nigrorum purgationes, vitiosae. Virium exsolutio cum talibus, mala est. *Coac. 569.*

In intenso lumborum dolore, & alvi subductione largiore, sumpto veratro, spumosoform crebra vomitio prodest. *Coac. 310.*

AD THERAPIAM.

Elleborus periculosus est sanas carnes habentibus: convulsionem enim inducit. *Aph. IV. 16.*

Ad Elleboros, qui non facile sursum purgantur, iis ante potionem corpora praehumectanda, copiosiore alimento, & quiete. *Aph. IV. 13.*

Vbi biberit quis Elleborum, ad motiones quidem corporum magis ducit: ad somnos vero, & quietem, minus. Declarat autem & navigatio, quod motus turbat corpora. *Aph. IV. 14.*

Quoniam

Quan-

Quando vis magis ducere Elleborum, moveto corpus;
quando cessare, somnum facito, & non moveto.
Aph. IV. 15.

EMPHYEMA. PYRIS INTRO COLLECTIO.

SUPPURATIO.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Quibus ang nam effugientibus, ad pulmonem vertitur,
nisi in 7. diebus moriantur. *Aph. V. 10.*

Sanguis in ventrem effusus praeter naturam. *Aph. VI. 20.*

Pleuritis, nisi in 14. diebus superne repurgetur. *Aph. V. 8.*

Pulmonis inflammatio, in diebus iudicatoriis non repur-
gata, verum cum delirio 14. dies superans. *Coac. 396.*

In morbo laterali, quibus circa initia in totum purulentae
sunt sputiones, nisi 3. aut 5. die moriantur. *Coac. 379.*

NOTAE COMITANTES.

Febris non dimittens, interdiu levior, noctu gravior,
sudores multi, tussis & tussendi cupiditas, absque
sputo notabili, oculi cavi, malae rubentes, ungues
adunci, digiti summi incalescentes, in pedibus tu-
mores, inappetentia, & pustulae toto corpore oriun-
dae. *Praenot. 104.* Sudores circa cervicem, & clavi-
culam, digiti summi calentes, & scabri, ungues un-
ci, & perfrigescetes. *Coac. 402.*

Quae ob puris intro collectionem febres intermittunt,
in his magna ex parte aegri tenuibus sudoribus dis-
fluunt. *Coac. 419.*

Quibus latus in tumorem sublatum est, ac calidius exi-
stit, ubi in alterum latus incumbentibus, pondus
quoddam suspensum esse videtur, iis pus una in par-
te collectum est. *Coac. 428.*

Quibus ex lateris dolore, facies ruboribus velut efflo-
rescit, & alvus est liquidior, pus in pulmonibus
collectum habent. *Coac. 423.*

Qui pus intro collecturi sunt, iis primum quidem falsugi-
nosum sputum expuitur, deinde dulcius. *Coac. 403.*

AD

AD PROGNOSIN.
 VARIAE NOTAE.

Qui ex pleuritide suppurati sunt, si intra 40. dies, ex quo ruptio fuerit facta, repurgentur superne, liberantur; si vero minus, ad tabem transeunt. *Aph. V. 15.*
 Qui suppurati uruntur, aut secantur, siquidem purum effluat pus, & album, evadunt. Si vero subcruentum, & coenosum, ac graveolens, pereunt. *Aph. VII. 44.*
 Quibus purulentis, ab humeris concussis multus editur strepitus, ii minus habent puris, quam quibus paulo difficilior inest spiratio, iique melius colorati videntur. Quibus vero nullus intus fit strepitus, difficultas tamen spirandi vehemens adest, & livescunt ungues, ii pure pleni sunt, & perniciose habent. *Coac. 432.*

NOTAE LETHALES.

Quibus, si concutiuntur, pus lutulentum & graveolens prodit, utplurimum moriuntur. *Coac. 409.*
 In pulmone pus colligentibus, per alvum pus secedere, mortiferum. *Coac. 429.*
 Qui suppurati, aut hydropici uruntur, aut secantur, hi pure aut aqua acervatim effluente, omnino moriuntur. *Aph. VI. 27.*
 Purulentos moderatius habentes, si sputa graveolentia consequantur, recidiva interimit. *Coac. 406.*

AD THERAPIAM.

Suppuratis caput purgare oportet, non fortibus medicamentis, sed paulatim avertere in nares, & simul eduliis ventrem subducentibus uti. Et quum principium morbi nondum est, sed eo fluxus vertitur, ac vergit, excreationem facere, & tussim excitare, & medicamentis infusilibus in nares uti, & cibis simul ingestis. Quum autem excreationem facere oportet, pluribus cibis, & salis, ac pinguibus utendum est, & vino austero, & cum sic habet, tussis inducenda. *De Lec. in bom. XXXI. 1. ad 9.*

CONF.

EPILEPSIA. MORBVS COMITIALIS.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Aetas iuuenilis. *Aph. III. 29.*

Temperies atrabilaria. *Epid. VI. VIII. 95.*

Tempus vernale, & autumnale. *Aph. III. 20. 22.*

Constitutio pluviosa. *Aph. III. 16.*

Purgamenta muliebria retenta. *Coac. 522.*

Oppilationes multae per venas, & impeditus sanguinis
cursus. *De Flat. XXI. 2, 3.*

NOTAE ANTECEDENTES.

Capitis dolores, & aurium tinnitus, citra febrem, aut
tenebricosa vertigo, & vocis tarditas, manuumque
stupor. *Coac. 161.*

NOTAE INSTANTIS PAROXYSMI.

Vrinae praeter consuetudinem tenues, & crudae, absque
repletionem, morbo comitiali obnoxiiis, morbi insul-
tum denunciant, idque praecipue, si in summum
humerum, aut cervicem, aut dorsum, dolor aut con-
vulsio incidat; aut torpor totum corpus occupet,
aut turbulentum insomnium visum fuerit. *Coac. 599.*

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Epilepticis pueris mutationes, maxime aetatis, & re-
gionum, & vitarum, liberationem faciunt. *Aph. II.
45.*

Quibus epilepsiae ante pubertatem contingunt, mutatio-
nem habent. *Aph. V. 7.*

Liberantur aliquando huic morbo obnoxii, maxime ac-
cedente hieme. *De Flat. XXIII. 1.*

DETERIORIS NOTAE.

Quibus epilepsiae accidunt 25 annos natis, his plerum-
que commoriuntur. *Aph. V. 7.*

LETHALIS.

Quum aetatem adeptus fuerit morbus, non amplius curabilis est. *De Morbo Sacr. XIII. 15.*

Qui statis temporibus sanguinem fundunt, si sticuli sint, neque sanguinem profuderint, comitiali morbo pereunt. *Coac. 345.*

Hydropicis succedentes morbi comitialis offensiones, perniciem adferunt, pravis invicem succedentibus signis, & alvos humectant. *Coac. 454.*

Ex aqua inter cutem morbus comitialis, perniciem adfert. *Coac. 459.*

ERYSIPELAS.**AD DIAGNOSIN.**

In febribus, ex praegresso dolore, rubores ad aures subnascentes, ignis sacri in facie spem faciunt. *Coac. 200.*

AD PROGNOSIN.**MELIORIS NOTAE.**

Erysipelas ab intus foras versum. *Aph. VI. 25. Praenot. 136. Coac. 366.*

DETERIORIS NOTAE.

Erysipelas foris intro versum. *Aph. VI. 25. Praenot. 136. Coac. 366.*

Ab ossis denudatione erysipelas, malum. *Aph. VI. 19.*

Ab erysipelate putredo, aut suppuratio, malum. *Aph. VII. 20.*

LETHALE.

Si mulieri praegnantis erysipelas in utero fiat, lethale. *Aph. V. 43.*

Erysipelas foris quidem exstare, utile; intro autem vergere, lethale. Cuius quidem rei indicium est, cum rubore evanescente pectus gravatur, & aegrius spiritum trahit aeger. *Coac. 366.*

AD THERAPIAM.

Frigidum iuvat erysipelas non exulceratum; sed exulceratum laedit. *Aph. V. 23.*

EVA.

EVACUATIO.

INDICANTIA VARIA.

Morbi a repletionē facti. *Aph. II. 22.*

Tempus vernale. *Aph. VI. 47. VII. 53.*

Sudor multus a somno citra causam manifestam factus, in homine cibum non capiente. *Aph. IV. 41.*

Si a morbo cibum quis capiens non roboretur, indicat corpus uberiore alimento uti. Si vero cibum non capienti hoc eveniat, evacuatione opus habere, nosse oportet. *Aph. II. 8.*

REGVLAE GENERALES.

Quae ducere oportet, quo maxime vergant, eo ducenda, per loca convenientia. *Aph. I. 21.*

Evacuationes ad extremum ducentes, periculosae. *Aph. I. 3.*

Multum & derepente evacuare, periculosum. *Aphor. II. 51.*

Vasorum evacuatio, si qualem fieri decet, fiat, confert, & facile ferunt; sin minus, contra. *Aph. I. 2.*

Si, qualia purgari oportet, purgentur, confert & facile ferunt; si vero contraria, difficulter. *Aph. I. 25.*

Quae prodeunt, non copia sunt aestimanda, sed si prodeant, qualia oportet, & facile ferat. *Aph. I. 23.*

Neque intempestivas, neque vehementissimas vasorum inanitiones moliri fas est. *De Vict. acut.*

EVNVCHI.

Non laborant podagra, neque calvi fiunt. *Aph. VI. 28.*
De Nat. puer. XIX. 1. 2.

EXACERBATIO, vid. PAROXYSMVS.

EXCREMENTA ALVI, vid. ALVI DEIECTIONES.

EXSOLVTIO, vid. VIRIVM EXSOLVTIO.

EXPERIMENTVM.

Periculosum. *Aph. I. 1.*

EXSCREATIO.

In febre distractio, velut a vomitu, in excreationem desinens, malum portendit. *Coac.* 55.

Excretatio frequens, siquidem etiam aliud quoddam signum adfuerit, phrenitidem portendit. *Coac.* 244.

EXTENSIVATIO, vid. COLLIQVATIO.

EXTREMA CORPORIS.

Celeres extremorum corporis ad utraque extrema permutationes, perniciem denunciant. *Praedict.* I. 43.

In morbis acutis extremarum partium frigus, malum. *Aph.* VII. 1.

CONF. FRIGVS.

EXTREMA REMEDIA.

Ad extremos morbos, extrema remedia exquisite optima. *Aph.* I. 6.

FACIES.

AD DIAGNOSIN.

Bene colorata facies; cum sudoribus diffuentibus, absque febre, vetusta stercora subesse, aut inordinatam victus rationem, praesefert. *Coac.* 214.

Quos ex lateris dolore cibi fastidia comitantur, iis os ventriculi aliquantulum dolet, & sudoribus diffiunt. Vbi autem facies ruboribus velut efflorescit, & alvus est liquidior, pus in pulmonibus collectum habent. *Coac.* 423.

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Facies optima, bene valentium, praecipueque sui ipsius similis. *Praenot.* 2.

Facies bona, in magnis malis. *Epid.* VI. II. 61.

Facies ex tumida depressa, ac vox levior, & remissior evadens, spiritus quoque rarior, ac lenior, postera die remissionem fore, denunciat. *Coac.* 211.

Qui-

Quibus praegnantibus, tibi opportunis, faciei rubor exoritur, hunc stillationes e naribus avertunt. *Coac.*

524.

DETERIORIS NOTAE.

Bene colorata facies, ac valde tetrica, & superciliosa. *Praedict. l. 49. Coac. 213.*

Si venae temporum in febribus pulsant, & facies bene habita fuerit, absque praecordiorum mollitie, *Coac. 128.*

LETHALIS.

Faciei corruptela lethalis est, minus tamen, si ob pervigilium, aut inediam, aut alvi perturbationem contingat: nam quae ex his causis orta est corruptelae species, una die, aut nocte in integrum restituitur. Huiusmodi autem faciei hae sunt notae: oculi concavi, nares acutae, collapsa tempora, frigidae aures, contractaeque, cutis dura, color pallidus, aut niger; ad haec quoque livescens palpebra, aut labrum, aut nasus, mortem in propinquo esse significat. *Coac. 212. Praenot. 2. 3.*

NOTAE ALIAE MORBI FUTURI.

PHRENITIDIS.

Vultus bene coloratus, tetricus, ac superciliosus, cum fronte contracta, in morbo acuto. *Coac. 213.*

INSANIAE.

Quibus faciei incendium, & intensus rubor solvitur, & graveolens est alvi egestio, redundans, & subrubra, in his insaniae metus est. *Coac. 624.*

HAEMORRHAGIAE.

Febris cum faciei rubore, & capitis vehementi dolore, & venarum pulsu. *Coac. 142.*

FAMES. INEDIA.

AD PROGNOSIN.

Inedia faciei corruptelam velut lethalem parit, sed una die, aut nocte finiendam. *Coac. 212. Praenot. 3.*

AD THERAPIAM.

Fames magnam vim habet in naturam hominis, & faciendi, & debilitandi, & occidendi. *De Vet. medo. XV. 10. ad 13.*

Senes facillime ieiunium ferunt; secundo, aetate consistentes; minime adolescentes; omnium minime pueri: ex his autem, qui inter ipsos sunt alacriores. *Aph. I. 13.*

Corporibus humidis carnes habentibus, famem inducere oportet: fames enim siccatur corpora. *Aph. VII. 59.*

Fames naturae modum excedens, nocet. *Aph. II. 4.*

Vbi fames, non oportet laborare. *Aph. II. 16.*

Famem vini potio solvit. *Aph. II. 21.*

Ieiunium ad capitis dolores, & crapulam, non confert. *De Viſſ. acut.*

FASTIDIVM, vid. CIBI FASTIDIVM.

FAUCES.

AD DIAGNOSIN.

Aquilonium anni tempus fauces asperas reddit. *Aph. III 5.*

AD PROGNOSIN.

NOTAE PERICVLI.

Vbi febricitanti fauces exulcerantur, si aliud quoque ex gravioribus signis affuerit. *Coac. 276. Praenot. 131.*

Fauces leviter exasperatae, & alvus inanibus exurrectionibus fatigata, frontis dolores, in aegris palpan-
tibus, & more investigantium sensim contrectantibus,
aut dolore affectis, si quae ex his increſcunt, mole-
ſtiam exhibent. *Coac. 267. Praediſt. I. 109.*

NOTAE LETHALES.

Fauces dolentes, absque tumore, cum labore, & molestia, ac suffocatione, praeceps exitium minantur. *Praediſt. I. 86.*

In praecipitibus malis strangulatus, gracileſcentibus faucibus, perniciem minatur. *Coac. 61.*

NO-

NOTAE ALIAE MORBI FUTURI.

CONVULSIONIS.

Faucium gracilium praefocantes dolores, ubi ex capitis dolore ortum duxerint, convulsiones adferunt. *Coac.* 262. *Praedict.* I. 104.

Vehementes faucium dolores, aurium tubercula & convulsiones excitant; itemque cervicis, ac colli dolores. *Coac.* 268.

PAROTIDVM.

Quibus ad fauces irritamenta sunt, iis moderata aurium tubercula excitantur. *Coac.* 264.

PHRENITIDIS.

Vbi fauces in morbis acutis graciles sunt, parvae, ac dolentes, atque ubi os hiarit, si gracile appareat, nec facile contrahi possit, mentis emotionem metueri oportet; indeque succedens phrenitis perniciofa est. *Coac.* 275. *Praedict.* I. 11.

FEBRIS IN GENERE.

AD DIAGNOSIN.

VARIAE NOTAE.

Calidum solum non est februm causa, sed calidum & amarum simul, calidum & acidum, calidum & salsum, aliaque innumera. *De Vet. med.*

Aetas dentitionis febribus obnoxia. *Aph.* III. 25.

Quum aestas sit veri similis, sudores in febribus multos expectare oportet. *Aph.* III. 6.

Linguae bifurcum velut saliva alba obductum, febris remissionem indicat, eo quidem, quod agnatum est, crasso existente, eodem die; si vero tenuius fuerit, postridie; perendie quoque, si adhuc tenuius fuerit. Eadem etiam significatio est, si haec circa summam linguam contingant, minus tamen firma. *Coac.* 230.

Quibus in febre ad dentes viscosa circumnascuntur, his febres sunt vehementiores. *Aph.* IV. 53.

Qui aestum sentiunt, & progressis deiectionibus, tenuibus sudoribus diffuunt, iis febris ingravescit. *Coac.* 546.

AD PROGNOSIN.

FEBRIS ALIOS MORBOS SANAT.

Aphoniam ex ebrietate ortam. *Aph.* V. 5.

Convulsionem, aut tetanum. *Aph.* IV. 57. *Coac.* 354.

Dolores capitis, cum aphonia, & stertore, sanis drepente obortos. *Aph.* VI. 51.

Quibus hepar circumcirca dolet, his febris superveniens dolorem solvit. *Aph.* VII. 52. *Coac.* 449.

Quibus ad hypochondrium dolores fiunt, absque inflammatione, his febris superveniens solvit dolorem. *Aph.* VI. 40.

Volvulum ex urinae stillicidio subortum. *Aph.* VI. 44. *Coac.* 475.

Lippitudine affecto suborta febris, solutionem avertit. *Coac.* 222.

Quibus ex vulnere, corporis impotentia accidit, si febre citra rigorem oborta, sani evadunt. *Coac.* 477.

In sideratis, &c. si febris accedat, solutio contingit. *Coac.* 479.

NOTAE IUDICATIONIS VARIAE.

Februm indicationes iisdem numerantur diebus, quibus & evadunt, & moriuntur homines. *Praenot.* 122.

Febres mitissime, & securissimae, die 4. aut ante desinunt; maxime vero malignae & gravissimae, die 4. vel prius interficiunt. *Praenot.* 122.

Primus februm insultus ad dies 4. secundus ad 7. tertius ad 11. quartus ad 14. quintus ad 17. sextus ad 20. dies excurrit. *Praenot.* 122.

Inter initia perquam difficile est dignoscere, quinam morbi longo temporis spatio iudicari debeant, quod simillima sint eorum principia. *Praenot.* 124.

Qui morbi intra brevissimum temporis spatium iudicationem sunt subituri, facilius dignoscuntur, cum maxime inter se ab initio dissideant. *Praenot.* 125.

Qui-

Quibus per febres sexta die rigores fiunt, difficulter iudicantur. *Aph. IV. 29.*

Quibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres solvuntur. *Aph. IV. 63.*

Quibus exacerbationes fiunt, quacunque hora dimiserit febris, postridie eadem hora si corripuerit, difficulter iudicantur. *Aph. IV. 30.*

Febricitare incipientibus, sanguinis stillationes cum ster-
nutatione adcedentes, & quod in urina desidet al-
bum 4. die visum, 7. solutionem adfore denunciant.
Coac. 149.

Urina in febre album & laeve depositum habens sedi-
mentum, celerem liberationem denunciat; celerem
quoque, quae diluta indiscretam quandam habet pin-
guedinem. *Coac. 575.*

Quae aliquantulum rubet, subrubrum habet sedimen-
tum, & leve, siquidem ante diem 7. appareat, 7.
die solutionem fore designat; post 7. autem, tardio-
rem, aut plane diurnam. *Coac. 575.*

Quae 4. die subrubram nubeculam capit, 7. die liber-
rat, dum reliqua pro ratione habeant. *Coac. 575.*

NOTAE LONGITVDINIS.

Febricitantium non omnino leviter, permanere, & ni-
hil remittere corpus, morbi longitudinem indicat.
Aph. II. 28.

In febribus abscessus, qui non solvuntur ad primas
iudicationes, morbi longitudinem significant. *Aph. IV.
51.*

Dolores ex glandularum tumoribus. *Coac. 73.*

Iudicationis cessationes in febribus, temporis quidem
longinquitatem, non tamen perniciem inducunt.
Coac. 75.

Ex vehementibus doloribus abortae febres, diurnae.
Coac. 75.

Sudores febricitantium extra dies criticos orti, labo-
rem significant, & morbi longitudinem, & recidi-
vas. *Aph. IV. 36.*

Febric.

Febricitanti sudor superveniens, febre non remittente, malum. Prolongatur enim morbus, & copiosior humiditatem indicat. *Aph. IV. 35.*

Si venae temporum in febribus pulsant, & facies bene habitata fuerit, absque praecordiorum mollitie, longum fore morbum, sperare oportet, qui nec sine liberali sanguinis ex naribus profusione, aut singultu, aut convulsione, aut coxendicum dolore, desinet. *Coac. 128.*

In febre cum sudore, vocis ex capitis dolore defectio- nes, si per se resolvuntur aegri, ac praeter volun- tatem excrementa demittantur, malumque remitti vi- deatur, diuturni morbi metus est. In his subinde obortus rigor, dampnari non debet. *Coac. 253.*

Quibus febricitantibus in urinis subsidentiae sunt cras- siori farinae similes, longam infirmitatem significant. *Aph. VII. 31.*

Urina tenuis & biliosa, & aegre lentum habens sedi- mentum, & quae in melius ac deterius commutatur, temporis diuturnitatem postulat. *Coac. 575.*

In febre variarum interdum urinarum mictiones, mor- bum producant. *Coac. 595.*

NOTAE SALVTARES.

Febrem convulsioni supervenire melius est, quam con- vulsionem febre. *Aph. II. 26.*

Febres quocunque modo intermittant, quod sine peri- culo sint, significat. *Aph. IV. 47. VII. 62. Coac. 117.*

Qui ex morbo superfuturi sunt, facile spirant, dolore vacant, noctu dormiunt, aliaque securissima signa ha- bent. *Prænot. 126.*

Sudores febricitantibus si inceperint, boni sunt die 3. & 5. & 7. & 9. & 11. & 14. & 17. & 21. & 27. & 31. & 34. hi enim morbos iudicant. *Aph. IV. 36.*

Quibus in febre, die 7. aut 9. aut 11. aut 14. mor- bus regius supervenit, bonum est; nisi dextrum hy- pochondrium durum sit, alioqui non bonum. *Aphor. IV. 64.*

Quis

Quibus in febre anres obsurduerint, his sanguis e naribus effluens, aut alvus exturbata, morbum solvit. *Aph. IV. 60.*

Quibus urinae crassae, grumosae, paucae, non sine febre, copia ex his succedens tenuis iuvat. Tales autem maxime prodeunt, quibus ab initio, aut brevi, subsidientiam continent. *Aph. IV. 69.*

Quibus ex naribus fluxiones, die 7. 9. aut 14. contingunt, ut plurimum a febribus vindicant. Eodem vero modo & biliosus alvi fluxus, & qualis in intestinorum difficultate fieri assolet; ac genuum & coxendicum dolor; urinaque sub iudicationem concocta; & vero in muliere mensium profluvium. *Coac. 152.*

NOTAE PERICULI.

Convulsio febris superveniens. *Aph. II. 26.*

Deiectiones nigrae, qualis sanguis niger, sponte prodeuntes. *Aph. IV. 21.*

In bubonibus febres omnes malae, praeter ephemerarum. *Aph. IV. 55.*

In febribus circa ventrem aestus vehemens, & oris ventriculi dolor, malum. *Aph. IV. 65.*

Quibus in febre morbus regius supervenit ante 7. diem, malum est. (Nisi confluxus humorum per alvum fiant.) *Aph. IV. 62.*

In febribus, ex somnis pavores, aut convulsiones, malum. *Aph. IV. 67.*

In febribus spiritus offendens, malum. Convulsionem enim significat. *Aph. IV. 68.*

Qui sanguinem vomunt, siquidem sine febre salutare: si vero cum febre, malum. *Aph. VII. 37.*

Ex praecordiorum doloribus abortae febres, malignae sunt. *Praedict. I. 56.* In his profundus, ac altus sopor, pessimus. *Coac. 31.*

Febres, quae soporem, lassitudinemve inducunt, aut in quibus caligant aegri, insomnia, ac tenuibus sudoribus vexantur, malignae sunt. *Praedict. I. 74.*

Cor-

Corporis iactationes, & incontinentiae, cum perfrigeratione, pessimae. *Coac.* 2.

In febre convulsio, manuumque ac pedum dolores, malignum quiddam praenunciant. Malignus quoque ex femore doloris impetus. Sed & neque genuum dolor probari potest. Quin & surarum quoque dolores maligni sunt, ac mentis emotio, tum vero praecipue, si sublime quid in urina innatet. *Coac.* 30.

In febre mutum esse, malo est. *Coac.* 34.

In febribus, alvo a flatibus distenta, flatum non erumpere, malum. *Coac.* 44.

In febre tenuiter exsudantes, maligne habent. *Coac.* 42.

In febre distractio, velut a vomitu, in exscreationem definens, malum portendit. *Coac.* 55.

Qui accessione correpti, postero die gravius habent, iis malum denunciatur. *Coac.* 78.

Quaecunque feбри ex adverso respondent, nisi abscessum faciant, malignitatem denunciant. *Coac.* 145.

In febre sputi exscreationes lividae, nigrae, biliosae, subsistentes quidem malae sunt: si vero pro ratione excernantur, utiles. *Coac.* 242.

NOTAE LETHALES.

Qui perituri sunt, difficultate spirandi vexantur, delirant, vigilant, ceteraque signa pessima habent. *Prænot.* 127.

Si a febre detento, tumore in faucibus non existente, suffocatio ex improvise superveniat, lethale. *Aph.* IV. 34.

Si a febre detento, collum derepente inversum fuerit, & vix deglutire possit, tumore non existente, lethale. *Aph.* IV. 35. VII. 58. *Coac.* 277.

Febrium initio, si atra bilis sursum, aut deorsum prodeat, lethale est. *Coac.* 68.

Vbi livores in febre sunt, prope adfore mors significatur. *Coac.* 66.

Febres vertiginosae, & cum tenuis intestini morbo, & sine hoc, perniciem intentant. *Coac.* 106.

Qui-

Quibus per febres assiduas pustulae toto corpore enascuntur, lethale est, nisi quid purulentum abscedat. In his vero praecipue adnasci ad aures tubercula solent. *Coac.* 114.

Cum oculorum perversione, febribus, & lassitudinis sensu detento, rigor perniciem minatur. Atque in huiusmodi casibus soporati malum denunciant. *Coac.* 221.

Vocis defectiones in febre, quae convulsivae speciem praefecerunt, & in mentis emotionem cum silentio desinunt, perniciem ostendant. *Coac.* 248.

NOTAE RECIDIVAE.

Febricitanti, nisi in diebus imparibus dimiserit febris, reverti solet. *Apb. IV. 61. Coac.* 80.

Quibus febres cessant, neque apparentibus solutionis signis, neque diebus indicatoriis, iis recidiva expectanda est. *Pracnot.* 138. *Coac.* 146.

Vrina densitatem divulsam habens, morbi reversionem, aut sudorem portendit. *Coac.* 593.

NOTAE ALIAE MOREI EVTVRI.

ABSCESSES.

Febris assidua, diutius cum securitate trahens, si neque ex dolore, neque ex inflammatione, neque ex alia ulla manifesta causa contingat. *Coac.* 143. *Pracnot.* 139.

Qui subinde horrore corripuntur, ad suppurationem deveniunt. Quin etiam febris talem ad suppurationem ducit. *Coac.* 422.

Quos febris detinet, si tremor absque iudicatione conquiescit, iis temporis successu abscessus cum dolore purulenti ad articulos decumbunt, & vesica dolet. *Coac.* 141.

Lassatis per febres, ad articulos, & circa maxillas maxime, abscessus fiunt. *Apb. IV. 31.*

CONVULSIONIS.

In febribus tenuiter exsudantes, cum capitis dolore, & alvo intercepta, ad convulsiones praeconi sunt. *Pracnot. I. 115.*

DOLORIS CAPITIS.

Quibus in febre urinae conturbatae, qualis iumentorum, his capitis dolores aut adsunt, aut aderunt. *Aph. IV. 70.*

DOLORIS ad COXAS.

Praecordiorum dolores in febre, aegro fari nequeunte, si absque sudore solvantur, malum indicant. His ad coxendices dolores decumbunt. *Coac. 297.*

DIARRHOEAE.

Quibus hypochondria elevata sunt, murmurantia, dolore lumborum superveniente, his alvi humectantur, nisi flatus eruperint, aut urinae copia prodierit. In febribus autem haec. *Aph. IV. 73. Coac. 291.*

Quibus per febres sanguinis copia undecunque eruperit, in refectionibus, his alvi humectantur. *Aph. IV. 27. Coac. 153.*

Quibus ructus adsunt, flatus, ventris sonitus, cum inflatione, iis alvus exturbatur. *Coac. 142.*

DYSENTERIAE.

In febribus, venae quae est in cervice pulsatio, & dolor, rem ad intestinorum difficultatem deducit. *Coac. 124.*

ERYSIPELATIS in FACIE.

In febribus, ex praegresso dolore, rubores ad aures subnascentes, ignis sacri in facie spem faciunt. *Coac. 200.*

HAEMORRHAGIAE.

Capitis gravitas, & dolor sincipitis, cum pervigilio, vel etiam contensionis sensu ad cervicem. *Coac. 168.*

Dolor capitis, visus hebetudo, splendores oculis obversantes, cum praecordiorum tensione, absque dolore, vel inflammatione. *Praenot. 149.*

Faciei rubor, & vehemens capitis dolor, cum venarum pulsu. *Coac. 142.*

Ex rigore febris, cum lassitudinis sensu, & cervicis dolore. *Coac. 555. Praedict. I. 142.*

Quae contingunt in febre circa ventrem palpitationes, mentis emotiones adferunt. Quin & sanguinis ex nari-

in febribus profluvium, cum horrore sensu interdum
adcedit. *Coac.* 298.

PROFLUVII MVLIEBRIS.

Ex rigore febris, cum lassitudinis sensu. *Coac.* 555.

PHRENITIDIS.

Quibus 3. die subsistit adcessio, & 4. ingravescit, ma-
lum denunciatur. Ac metus est, ne huiusmodi adces-
siones phrenitim inducant. *Coac.* 79.

Vehementer & acute mente emoti, si febris iterum re-
petat, phrenitici evadunt. *Coac.* 95.

Qui in febribus, ad tactum nullum ardoris sensum prae-
se ferunt, phrenitici fiunt, idque magis, si sanguis
fluxerit. *Coac.* 228.

VOMITVS.

Quos stomachi fastidia vexant, cum oris ventriculi mor-
su, & crebra sputatione, iis vomitio adfutura est.
Coac. 142.

AD THERAPIAM.

Vitus humidus febricitantibus omnibus confert, ma-
xime vero pueris, & aliis tali victu uti consuetis.
Aph. I. 16.

Si quis febricitanti cibum det, convalescenti quidem,
robur; aegrotanti vero, morbus fit. *Aph.* VII. 65.

His, qui per circuitus exacerbantur, nihil dare oportet,
neque cogere, sed auferre de adpositionibus,
ante indicationes. *Aph.* I. 19.

Si febris, quae non est a bile, detineat, aqua multa,
& calida in caput affusa, febris solutio fit. *Aph.*
VII. 42.

FEBRIS CONTINVA ACUTA.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Aetas iuvenilis. *Aph.* III. 29.

Tempus aestivum. *Aph.* III. 21.

Aestas,

Aestas, post hiemem siccam, & aquiloniam, ver autem pluviosum, & austrinum. *Aph. III. 11.*

Autumnus aquilonius, & siccus. *Aph. III. 14.*

Siccitates. *Aph. III. 7.*

AD PROGNOSIN

NOTAE SALVTARES.

Convulsionem solvit febris succedens acuta, quae prius non aderat, aut si prius adfuit, ingravescent. *Coac. 358.*

Excreationes, alvi egestionem, & urinae, probe secedentes. *Aph. IV. 47. VII. 69.*

Febres acutas, cum mentis perturbatione, in oris ventriculi dolore non bilioso, insania solvit. *Coac. 550.*

Alvi recrementum purum succedens, febrem acutam solvit, cum sudore. *Coac. 649.*

Morbi acuti effluente ex naribus sanguine, iudicatione absolvuntur, idque die iudicatorio; ac sudore copioso exorto, urinaque purulenta, ac vitrea affatim reddita, in qua quod subsidit, laudabile sit; aut abscessu effatu digno, & alvo mucosa, & sanguinea deiciente, ac derepente prorumpente, vomitionibusque non pravis, sub iudicationem contingentibus. *Coac. 150.*

NOTAE LONGITVDINIS.

Vocis defectiones, cum virium exsolutione, & cum sudore. *Coac. 256.*

NOTAE PERICVLI.

Febres quaecunque non intermittentes tertia die vehementiores fiunt, magis periculosae. *Aph. IV. 43. Coac. 116.*

In febribus acutis, convulsionem, & circa viscera dolores vehementes, malum. *Aph. IV. 66.*

In acutis affectionibus, quae cum febre sunt, luctuosae respirationes, malae. *Aph. VI. 54.*

Qui in febre non intermittente, tenuiter & crebro exsulant, cum praecordiorum distensione, ii ut plurimum maligne habent; atque in his dolores in humeri caput, ac claviculas affixi, pravi sunt. *Coac. 32.*

NOTAE LETHALES.

Auris intensus dolor, cum febre acuta, ac ceteris aliquanto gravioribus signis, *Coac.* 189.

Continens capitis dolor, cum gravibus aliis signis. *Coac.* 160.

Sudores frigidi, cum acuta febre evenientes. *Aph.* IV. 37.

In plurimis graveolentibus deiectionibus, cum febre acuta, praecordiorum contensione, ex longo intervallo oborta ad aures tubercula, mortem adferunt. *Coac.* 201.
non intermittentibus febribus, si externa quidem frigida sint, interna vero urantur, & sitim habeant, lethale. *Aph.* IV. 48. VII. 72.

In febre non intermittente, si labium, aut supercilium, aut oculus, aut nasus pervertatur, si non videat, si non audiat, corpore iam debili existente, quicquid horum fiat, in propinquo mors est. *Aph.* IV. 49. VII. 73.

Si rigor incidat febri non intermittenti, debili iam existenti aegro, lethale. *Aph.* IV. 46.

Vbi in febre non intermittente, difficultas spirandi, & delirium fit, lethale. *Aph.* IV. 50.

Qui in febre assidua defectu iacent, & oculis conniventibus nistantur, hi evadunt quidem, si post sanguinis ex naribus fluxum, ac vomitum, ad loquelam, & ad se ipsos redeant. Sin vero secus accadat, cum spirandi difficultate celeriter intereunt. *Coac.* 77.

Vocis defectiones, cum virium exsolutione, in acuta febre, sine sudore, lethales. *Coac.* 256.

NOTAE ALIAE MORBI FVTVRI.

ABSCESSVS ad AVRES.

In bile redundantibus, magna spiratio, cum febre acuta, & praecordiorum contensione. *Coac.* 126. 290.

In anhelatoribus, & suspiriosis, febris postea acuta, cum praecordiorum contensione perfrigeratis, magnum circa aures tumorem expectare oportet. *Coac.* 107.

CONVVLSIONIS.

In pueris acuta febris, cum alvi suppressione, & per-

vigilio, calces velut iactare, ac colorem mutare,
& ruborem contrahere, convulsionem minatur.
Coac. 109.

INSANIAE.

In acuta febre aures obtusae, vehementem insaniam
portendunt. *Coac.* 195.

AD THERAPIAM.

Vbi peracutus est morbus, statim extremos habet labo-
res, & extreme tenuissimo victu uti necesse est. Vt
vero non, sed plenius cibare licet, tantum a tenui
recedendum, quantum morbus remissior extremis fue-
rit. *Aph.* I. 7.

Cum morbus in vigore fuerit, tunc vel tenuissimo vi-
ctu uti necesse est. *Aph.* I. 8.

CONF. FEBRIS in genere, MORBUS ACUTVS.

FEBRIS ARDENS.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Aetas virilis. *Aph.* III. 30.

Tempus aestivum. *Aph.* III. 21. VIII. 8.

NOTAE COMITANTES

Quibus diu tussis siccae, paulum irritantes, in febris-
bus ardentibus, non admodum siticulosi sunt. *Aph.*
IV. 54.

AD PROGNOSIN.

VARIAE NOTAE.

De febre ardente laborantibus, dies 14. aut allevando,
aut perimendo decernunt. *Coac.* 137.

Febres ardentes, quae recurrere solent, 4. diebus de
se significationem exhibent, deinde exsulant. Sin mi-
nus, diē septimō, & undecimō. *Coac.* 136.

In febribus ardentibus tremores delitio solvuntur.
Coac. 132. *Aph.* VI. 26.

NOTAE SALVTIS.

Febrem ardentem succedens rigor solvit. *Coac.* 135.
Aph. IV. 58.

NOTAE PERICVLI.

Alvus in febre ardente affatim prorumpens. *Coac.* 129.
Oculorum perversio, & distortio, cum aliqua summi corporis refrigeratione, & egestionibus aquae similibus, & crebris; praecipue si alto quodam stupore detineantur. *Praedict.* I. 81.

Sanguinis ex naribus fluxus, in febre ardente 4. die obveniens, malo est, nisi aliud quidpiam bene ceciderit. Quod si die 5. contingat, minus adfert periculi. *Coac.* 133.

NOTAE LETHALES.

Ex febre ardente, nisi qui circa aurem sit abscessus suppuret, non admodum liberantur. *Coac.* 138. 207.

Febris ardens ex laborioso ventris dolore, perniciem minatur. *Coac.* 130.

Quibus in febre ardente, tumores cum somnolentia, & torpore obveniunt, eos lateris dolor accedens, cum levi partis alicuius sideratione, necat. *Coac.* 50.

NOTAE MENTIS EMOTIONIS FUTURAE.

In febre ardente laborantibus, si aurium sonitus, cum visus hebetudine, & ad nares gravitate accedant, nisi sanguis ex naribus profluat, furiosa & vehemens mentis emotio metuenda est. *Coac.* 131. *Praedict.* I. 18.

AD THERAPIAM.

Ad Causum, aliamque febrem, aqua coelestis per se sola exhibita, prodest. *De Morb.* III.

FEBRIS DIARIA. EPHEMERA.

In Bubonibus febres omnes malae, praeter ephemerass. *Aph.* IV. 55.

FEBRIS LIPYRIA.

Febres lipyriae, non nisi per choleram effusa bile, solvantur. *Coac.* 129.

FEBRIS CONTINVA TERTIANA.

Febres quae proxime ad tertianarum naturam accedunt, cum incontinenti iactatione, malignae sunt. *Coac.* 33.

Febres, quaecunque non intermittentes tertia die vehementiores fiunt, magis periculosae. *Aph.* IV. 43. VII. 62. *Coac.* 116.

Febres ad tertianarum naturam accedentes, vagae & errantes, ubi in dies pares transferint, molestiam exhibent. *Coac.* 37.

FEBRIS CONTINVA LENTA.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Aetas adoleſcentiae. *Aph.* III. 27.

Constitutio coeli pluvioſa. *Aph.* III. 15.

NOTAE COMITANTES.

Sudores, qui non fiunt diebus indicatoriis. *Aph.* IV. 36.

Quibus febricitantibus, in urinis ſubſidentiae fiunt craſſiori farinae ſimiles, longam infirmitatem ſignificant. *Aph.* VII. 31.

AD PROGNOSIN.

Quibus febres longae, his tubercula ad articulos, aut dolores fiunt. *Aph.* IV. 44.

AD THERAPIAM

Lac dare convenit tabidis, non admodum valde febricitantibus, & in febribus longis, & languidis, ſi nullo ſignum repugnet, & praeter rationem quidem extenuatis. *Aph.* V. 64.

FEBRIS INTERMITTENS.

AD PROGNOSIN.

Febres quocunque modo intermittant, quod ſine periculo ſint, ſignificat. *Aphor.* IV. 43. VII. 62. *Coac.* 117.

Intermittentes febres aliquando malignae evadunt, & in morbos acutos tranſeunt. *Epid.* VII.

Qui

Qui per febres intermittentes, inaequaliter incallescunt, alvum habent flatibus distentam, pauca transmittentem, iis post iudicationem lumborum dolore suborto, alvi prorumpunt. Qui autem ad manus contactum exardescunt, torpore, siti, ac corporis incontinenti iactatione vexantur, ii alvo intercepta gravati exsolvuntur. Interdum vero etiam praerubra in pedibus ambusta eadem denunciant. *Coac.* 158.

FEBRIS INTERMITTENS TERTIANA.

AD DIAGNOSIN.

Aestas ipsi obnoxia. *Aph.* III. 21.

AD PROGNOSIN.

Tertiana exquisita in septem ad summum circuitibus indicatur. *Aph.* IV. 59.

Tertiana exacta quinto, aut septimo, aut ad summum nono circuitu terminatur. *Coac.* 148.

Qui in febribus tertianis ingravescent dolores, tertianarum naturam assumunt, & sanguinis grumos per secessum egerunt. *Coac.* 123.

AD THERAPIAM.

Si tertiana febris detineat, siquidem post tres paroxysmos quartus corripit, purgans per inferiora dato; si autem purgante non egere videatur, Pentaphylli radices acetabuli quantitate in aqua tritas potui dato. Si vero sic non sedetur, ubi multa calida laverit, Trifolium & Silphii succum, cum vino, pari aqua admixta, propinato, reclinatumque stragulis contegito, donec fudet. *De Morb.* II. XXXVIII. 2. ad 7.

FEBRIS INTERMITTENS QVARTANA.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Tempus aestivum, & autumnale. *Aph.* III. 21. 22.

Quae febres intermittunt, incertoque ac vago ordine

prehendunt, eae, autumno praecipue, in quartanam fere transeunt, idque in his fere maxime, qui trigessimum annum superarunt. *Coac.* 143.

AD PROGNOSIN.

Februm omnium tutissima, placidissima, & longissima est quartana, quae & ab aliis magnis morbis liberat. *Epid. I. III.* 17.

A quartanis correpti, a convulsione non admodum corripuntur. Si vero prius corripiantur, & postea quartana supervenerit, liberantur. *Aph. V.* 70.

Quartanae aestivae plerunque sunt breves: autumnales vero longe, & maxime quae prope hiemem incidunt. *Aph. II.* 25.

Hibernae quartanae fere in morbos acutos transeunt. *Coac.* 159.

Quibus, in febribus quartanis existentibus, sanguis ex naribus fluxerit, malum. *Aph. VIII.* 3.

AD THERAPIAM.

Si quartana apprehenderit, siquidem impurgatus fuerit, primum caput purgato, & interpositis 3. aut 4. diebus, pharmacum sursum purgans dato, in ipsa apprehensione. Et interpositis diebus, rursus aliud deorsum purgans dato, in ipsa apprehensione. Si vero ex his non sedetur, rursus interpositis diebus, multa calida lavato, & pharmaca, quae scripta sunt, dato. Potibus autem, & sorbitionibus, & reliqua diacta utendum est, velut in tertiana. *De Affect. XIX.*

FEBRIS INTERMITTENS VAGA.

AD DIAGNOSIN.

Tempus autumnale obnoxium. *Aph. III.* 22.

AD THERAPIAM.

Febres inconstantes finire oportet, donec consistent. *De Viis. vent.*

FISTVLAE.

Ex fistulis maxime molestiam adferunt, quae in cartilaginosis, aut carne vacuis locis fieri solent, cavae sunt, & longius excurrunt, assidueque sanie manant, & in quarum osculo caruncula inest, Facilius autem curantur, quae in mollibus, & carnosus locis, & non nervosis oriuntur, *Coac.* 511.

FLATVS.

AD DIAGNOSIN.

Isterici non admodum flatulenti sunt. *Aph. V.* 72.

Flatus cum strepitu prodiens, aegrum aliquo dolore vexari, aut delirare indicat, nisi aeger sua sponte hoc modo flatum emiserit. *Praenot.* 68. *Coac.* 495.

AD PROGNOSIN.

Flatum sine sonitu, ac crepitu exire, optimum. *Praenot.* 68. *Coac.* 495.

Praestat tamen cum strepitu prodire, quam isthic revolvitur. *Praenot.* 68. *Coac.* 495.

In febribus, alvo a flatibus distenta, flatum non erumpere, malum. *Coac.* 44.

Quibus ructus adsunt, flatus, ventris sonitus, cum inastatione, iis alvus exturbatur. *Coac.* 142.

FLOCCOS LEGERE, vid. GESTVS.

FLVOR ALBVS, vid. VTERI FLVOR.

FLVXVS MENSTRVVS, vid. MENSTRVA.

FLVXIONES.

AD DIAGNOSIN.

Fluxiones fiunt, & perfrigerata carne, & excalefacta, & pertumefacta. *De Loc. in hom.* XV. 3.

Fluxiones ex capite septem sunt: per aures, per oculos, per nares, per palatum in fauces, in stomachum, per vasa in medullam spinalem, atque in sanguinem. *De Glandul.* VIII. *Loc. in hom.* XVIII.

Cum aestate, vel autumnō, ex capite calida, & nitro-
sa fluxio deciderit, mordet, exulcerat, spiritu im-
plet, & orthopnoeam parit. *De Viſt. acut.*

AD PROGNOSIN.

Mulieri fluxione laboranti, ad nares, aut os, fluxio-
nem transire, bonum *De Morb. I. VI. 12.*

In naturis ad tabem prompte comparatis, si cum febre
fluxiones ad gingivas, & dentes compareant, malum
denunciant. *Coac. 441.*

A fluxione retro ad vertebrae, & in carnes, hydrops.
De Loc. XVIII. 9.

A fluxione in medullam, tabes occulta. *Ibid. 8.*

In gravidis sanguinosae ad fauces fluxiones, malum de-
nunciat. *Coac. 537.*

Praegnantibus fluxiones, cum serpentibus oris ulceri-
bus, malo sunt. *Coac. 539.*

AD THERAPIAM.

Fluxioni ex capite vomitus conducit. *De Loc. XLVII. 2.*

FOEMINA. MULIER.

Mulier ambidextra non fit. *Aph. VII. 43.*

Mulier non laborat podagra, nisi menses ipsi defece-
rint. *Aph. VI. 29.*

CONF. CONCEPTIO. STERILITAS.

FOETVS.

AD DIAGNOSIN.

Foetus, mares quidem in dextris, foeminae vero in
sinistris magis. *Aph. V. 48.*

Mulier praegnans, siquidem marem gestat, bene colo-
rata est, si vero foeminam, male colorata. *Aph. V. 42.*

Cum extremae foetus partes evolutae sunt, tunc etiam
movetur; tempus autem ad hoc, masculo tres men-
ses, foeminae quatuor. *De Nat. puer. XX.*

Quo tempore foetus movetur, mammae etiam attol-
luntur, & papillae turgescunt, nec tamen lac pro-
dit. *Ibid.*

Mulieri in utero gerenti, si multum lactis ex mammis fluxerit, infirmum foetum significat. Si vero solidae fuerint mammae, saniozem foetum significat. *Aph. V. 52.*

Si mulieri in utero gerenti purgationes prodeant, foetum sanum esse impossibile. *Aph. V. 60.*

Foetus corruptionem debilitas, & febris vehemens, & cibi fastidium comitatur. *De Morb. Mul. I. XXXVII. 6.*

AD PROGNOSIN.

Quae perditurae sunt foetus, his mammae graciles sunt.

Si vero rursus durae fiant, dolor erit, aut in mammis, aut in coxis, aut in oculis, aut in genibus, & non perdunt. *Aph. V. 53.*

Impossibile est vitalem esse puerum, octavo mense natum. *De partu sept. & oct.*

Ex septimestribus quidam inter multos supersunt. *De part. septim.*

GEMELLI.

Praegnantibus molestiam exhibent, qui circa tenue intestinum contingunt tumores, quales circa extremas osculi uteri oras, cum erectae cervicis spirationis difficultate, eveniunt. Quin etiam fortassis huiusmodi tumores, gemellorum partum praenunciant, aut forte convulsiones indicant. *Coac. 539.*

CONF. ABORTVS, CONCEPTVS, GRAVIDITAS, MAMMAE.

FOMENTA.

Solvunt oculorum dolores. *Aph. VI. 31.*

Fomenta calida dolorem leniunt. *De Flat. XIV. 4. 5.*

Fomentorum optimum est aqua calida, in utro, vel vesica, aut spongia mollis & magna, ex aqua calida expressa. *De Vict. acut.*

FRACTVRA, vid. OSSA, CRANIVM,

FRIGIDVM.

EIVS VSVS.

In his autem frigido uti oportet, unde sanguis erumpit, aut erupturus est, non super ipsa, sed circa haec, unde influit. Et quaecunque inflammationes, aut flammei ardores, ad rubrum & sanguineum colorem vergentes novo sanguine, super ipsos: nam inveteratos nigrefacit: erysipelas etiam non exulceratum iuvat, quoniam exulceratum laedit. *Aph. V. 23.*

Tumores in articulis, & dolores absque ulcere, & podagricos, & convulsiones, horum plurima, frigida multa affusa & levat, & attenuat, & dolorem solvit. Torpor enim modicus doloris solvendi vim habet. *Aph. V. 25.*

Est vero, ubi in tetano sine ulcere, iuveni bene carnosus, aestate media, frigidae multae affusio, caloris revocationem facit. Calor autem haec solvit. *Aph. V. 21.*

EIVS NOXA.

Frigidum, inimicum ossibus, dentibus, nervis, cerebro, spinali medullae: calidum vero, utile. *Aph. V. 18.*

Frigida, velut nix, glacies, pectori inimica, tusses movent, sanguinis eruptiones, ac catarrhos inducunt. *Aph. V. 24.*

Frigidum autem, convulsiones, tetanos, nigrores, & rigores febriles affert. *Aph. V. 17.*

Ulceribus frigidum quidem mordax, cutem obdurat, dolorem non suppurantem facit, nigrores, rigores febriles, convulsiones, & tetanos. *Aph. V. 20.*

FRIGVS CORPORIS.

AD DIAGNOSIN.

Qua corporis parte inest calor, aut frigus, ibi morbus est. *Aph. IV. 39.*

AD PROGNOSIN.

NOTAE PERICVLI.

In morbis acutis, extremarum partium frigus, malum. *Aph. VII. 1.*

A do-

A dolore vehementi partium circa ventrem, extremarum frigus, malum. *Aph. VII* 26.

Caput, manus, & pedes frigere, ventra & lateribus calentibus, malum. *Praenot.* 46. *Coac.* 492.

NOTAE LETHALES.

Totius corporis perfrigeratio, cum rigiditate. *Praedict.* I. 77. *Coac.* 3.

Frigus cum sudore, in omni superflua purgatione. *Coac.* 568.

Externa quidem frigida, interna vero urentia, cum siti, in febribus non intermittentibus. *Aph. IV.* 48. *Coac.* 115.

Aures frigidae, pellucidae, contractae. *Aph. VIII.* 14. Labia livida, aut etiam resoluta, & inversa, & frigida. *Aph. VIII.* 13.

Testis dexter frigidus, & convulsus. *Aph. VIII.* 11.

Ungues nigri, & digiti manuum ac pedum frigidi, contracti, vel remissi. *Aph. VIII.* 12.

NOTAE CONVULSIONIS FUTURAE.

Posteriorum partium frigus convulsionem provocat. Ac omnino posteriorum partium refrigeratio, convulsionem minatur. *Coac.* 7. *Praedict.* I. 67.

PERFRIGERATIO.

AD PROGNOSIN.

NOTAE PERICULI.

Qui post sanguinis ex naribus eruptionem, ex tenuibus sudoribus perfrigescent, male habent. *Coac.* 40. 342.

Qui in diebus indicatoriis, cum angore, & incontinenti corporis iactatione, absque sudore perfrigerantur, atque omnino qui sine sudore perfrigerantur, citra indicationem, male habent. *Coac.* 38. *Praedict.* I. 61.

Qui ex sudoribus perfrigerantur, ac celeriter recalescent, male habere iudicantur. *Coac.* 52.

In humecta alvo, perfrigeratio cum sudore, vitiosa. *Coac.* 647.

Ex

Ex rigore perfrigerationes, quae ad calorem non revo-
cantur, malae sunt. *Prædict. I. 65.*

Ex sanguinis eruptionibus, vehementes diebus indi-
catoris obvenientes perfrigerationes, pessimae. *Coac. 326.*

Corporis iactationes, & incontinentiae, cum perfrige-
ratione, pessimae. *Coac. 2.*

Vrinarum ex perfrigeratione interceptiones, pessimae.
Coac. 5.

NOTAE LETHALES.

Somni, quales sopore oppressis, & totius corporis per-
frigerationes, perniciem ostendant. *Coac. 181.*

Qui ex rigore perfrigeratione detinentur, cum capi-
tis, ac cervicis dolore, vocis defectione, ac tenui
sudore, ii, ubi vires resumpserint, ac sese velut
recollegerint, moriuntur. *Coac. 1.*

Quibus adsunt superiorum partium tenues sudores cum
perfrigerationibus, nec sine febre, ii corporis in-
continentia, & phrenitide vexati, praeceps pericu-
lum denunciant. *Coac. 69.*

NOTAE CONVULSIONIS FUTURAE.

Ex perfrigeratione metus, ac animi abiectio, praeter
occasionem, in convulsionem tendit. *Coac. 4.*

Cervicis, ac dorsi perfrigerationes, convulsiones por-
tendere videntur, ac multo magis, quae totum cor-
pus pervadunt, in quibus missiones membranularum
speciem praeseferunt. *Coac. 83.*

AD THERAPIAM.

In corporis perfrigeratione, cum torporis sensu, san-
guinis detractio, mala est. *Coac. 343.*

FRONS.

Frontis dolores in aegris palpantibus, & more investi-
gantium sensum contrectantibus, aut dolore affectis,
si increscunt, molestiam exhibent. *Coac. 267.*

Vultus bene coloratus, tetricus, ac superciliosus, in
mor-

morbo acuto, malo est. Insuper frons contracta, phrenitidem denunciat. *Coac.* 213.

FVROR vid. *MANIA*.

GANGRAENA.

Quaecunque corrupta torpescunt, evulsa vena ulcerato, ac sanato. *Epid.* II. V. 36.

GEMELLI, vid. *FOETVS*.

GENA.

Eius pars tenuis dissecta, neque argetur, neque coalescit. *Aph.* VI. 19. *Coac.* 504.

GENITALIA.

Eorum putredo aestate accidit. *Aph.* III. 21.

Quibus, in tumorem sublato ventre, pudendum rubor occupavit, muliebribus purgamentis albis, humidis, subito procedentibus, diuturnis febribus intereunt. *Coac.* 530.

GENVVM DOLOR.

Genuum, & Coxendicum dolor tempestivus, &c. febres solvit. *Coac.* 152.

In gravidis, si mammae e gracilibus rursus durae fiant, dolor in genibus, &c. superveniens, metu abortus liberat. *Aph.* V. 53.

In febre convulsio, manuumque ac pedum dolores, malignum quiddam praenunciant. *Coac.* 30.

GENVVM GRAVITAS.

Non febricitantibus si fiat tormen; & Genuum gravitas, & lumborum dolor, deorsum purgante opus esse indicat. *Aph.* IV. 20.

GESTVS.

In febribus acutis, aut peripneumoniis, aut phrenitide, aut capitis doloribus, quae ante faciem feruntur,

GIB. **GIN.**
tur, frustra venari, & festucas colligere, aut flo-
cos e vestibis evellere, & ex pariete paleas carpere,
malum & lethale. *Praenot.* 17.

GIBBOSITAS.

AD DIAGNOSIN.

Interdum a phrenitide nascitur, *Epid. V. XXII. 4. VII. XXXVII. 1.*

AD PROGNOSIN.

Spirandi difficultatem parit. *De Artic. XXXVII. 6.*

Pulmonum tubercula dura, & cruda. *Ibid.* 11.

Gibbositas supra diaphragma, pectus acutum reddit,
cum spiritu difficili, & stridula faucium asperitate.
De Artic. XXXVII. 5.

Gibbositas infra diaphragma, nonnullis morbos re-
num & vesicae, vel etiam abscessus creat. *De Artic. XXXVIII. 1.*

Gibbosi vix ultra 60. annos vivunt. *Vest. XXXI. 8.*

Qui gibbi ex asthmate, aut tussi sunt ante pubertatem,
pereunt. *Aph. VI. 46.*

GINGIVAE.

AD DIAGNOSIN.

Quibus lienes magni, iis gingivae vitiantur, & os gra-
veolet. *Praedict. II. 163.*

Pueris ad dentitionem accedentibus, gingivarum pru-
ritus, molestus. *Aph. III. 25.*

AD PROGNOSIN.

Moderatus capitis dolor, cum inexhausta siti, aut su-
dore febri non solvente, gingivarum abscessus, aut
parotides denunciat, nisi alvus erumpat. *Coac.* 173.

Dentis fideratio abscessum ad gingivas enatum solvit.
Coac. 236.

In naturis ad tabem prompte comparatis, si cum febre
fluxiones ad gingivas, & dentes compareant, malum
denunciant. *Coac.* 441.

San-

GLAN. GRA. 111

Sanguis ex gingivis cum humecta alvo profluens, par-
niciem minatur. *Coac.* 241, 643.

AD THERAPIAM.

Gingivarum tumor, ac dolor, venaesectione & aluminae
aegyptio sedatur, in principio. *Epid. V. XXVII. 1.*
VII. XXXV. n. 203.

GLANDVLAE.

Glandulae non admodum aegrotant, sed cum reliqua
corpore patiuntur. Cum autem proprio laborant
morbo, tubercula nascuntur, & strumae, & febris
corpus afficit, *De Gland.*

In febribus ex Glandularum tumoribus dolores, morbi
diuturnitatem praenunciant. *Coac.* 73.

GRAVEDO.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Tempus vernale, & hiemale. *Aph. III. 20. 23.*

Aestas sicca & aquilonia, dein autumnus pluviosus, &
austrinus. *Aph. III. 13.*

Autumnus aquilonius, & siccus. *Aph. III. 14.*

Frigus. *De Vet. med. XXXI. 18.*

AD PROGNOSIN.

Quibus dolores capitis & frontis contingunt, tum ex
ingentibus ventis, tum ex frigore, post vehementem
aestum, eos gravedines potissimum quidem omnino li-
berant. *Praedict. II. 148.*

Raucedines, & gravedines, in valde senibus non co-
quantur. *Aph. II. 40.*

In omnibus pulmonis morbis, gravedines & sternuta-
tiones, tum praeire, tum subsequi, malum. *Prae-
dict. 93. Coac. 399.*

GRA-

GRAVIDITAS. IMPRAEGNATIO.

AD DIAGNOSIN.

NOTAE COMITANTES.

Quae in utero gerunt, harum os uteri clausum est.

Aph. V. 51.

Si mulieri purgationes non prodeant, neque horrore, neque febre superveniente, cibi autem fastidia ipsi accidant, hanc in utero gerere putato. *Aph. V. 61.*

Mulierem si velis cognoscere, an praegnans sit, ubi dormitura est, (incoenatae) aquam mulsam bibendam dato. Et siquidem tormen habeat circa ventrem, praegnans est; si vero minus, praegnans non est, *Aph. V. 41.*

Oculi cavi, album eorum livescens, cibi fastidium, ventriculi morsus, & salivatio frequens. *De Superfoet.*

AD PROGNOSIN.

VARIAE NOTAE.

Quibus praegnantibus tabi opportunis, faciei rubor exoritur, hunc stillationes e naribus avertunt. *Coac. 524.*

Quae puellae erectae cervicis spiratione vexantur, iis uterum gerentibus mammae pus colligunt. Muliebria purgamenta circa initia apparere, malum. *Coac. 549.*

NOTAE PERICULI.

In utero gestantibus, capitis dolores, qui cum sopore, gravitate, & convulsione fiunt, ut plurimum malo sunt. *Coac. 517. 534. Praedict. I. 103.*

Vterum gerentibus praecordiorum dolor, malum denunciat. His etiam alvi euntes, & rigore subinde corripiti, malo est. Ventris dolor, si limosa expurget, in huiusmodi levius malum indicat. Quae ex his faciles partus habent, eae postea vehementer anguntur. *Coac. 523.*

Praegnantibus fluxiones cum serpentibus oris ulceribus, malo sunt. Hae convulsionibus, exsolutionibus, postea perfrigerationibus tentatae, celeriter calefiunt. Quae etiam praegnantibus molestiam exhibent, qui circa te-

nue intestinum contingunt tumores, quales circa extremas uteri osculi oras, cum erectae cervicis spirationis difficultate, eveniunt. Quin etiam fortassis huiusmodi tumores gemellorum partum praenunciant, aut forte convulsiones, tumores huiusmodi indicant.

Coac. 539 529.

Quae ante partionem in modum cholerae morbi affliguntur, faciles quidem partus edunt. Febre autem tentatae, maligne habent, tum vero praecipue, si quid fauces vexer, aut in febre maligni aliquid appareat. *Coac. 535.*

In uterum gerentibus, sanguinosae ad fauces fluxiones, malum denunciant. *Coac. 537.*

NOTAE LETHALES.

Si mulieri praegnantis erysipelas in utero fiat, lethale. *Aph. V. 43.*

Mulierem in utero gerentem, ab acuto aliquo morbo corripit, lethale. *Aph. V. 30.*

Praegnantibus sanguinosa, post partum molestias ex albis mordacibus denunciant. Purgationes huiusmodi duritiem adferunt. In his singultus malo est, & uterorum procidentia, quae & una interficit. *Coac. 526.*

AD THERAPIAM.

Praegnantes purgandae, si materia turgeat, quadrimestres, & usque ad septimum mensem: hae vero minus. Iuniores autem, & seniores foetus, caute vitare oportet. *Aph. IV. 1. V. 29.*

Si praegnans intumescat, urticae semen quamplurimum, cum melle, & vino odorato, aqua temperato, bis in die in potu exhibendum. *De Morb. Mul.*

GRAVITAS CORPORIS.

Gravitas, quae totum corpus, vel manus, ac pedes premit, vitiosa est. Quod si cum gravitate, digiti quoque ac ungues lividi fiant, in propinquo mors est. *Coac. 493.*

GVTVR.

Ex praefecto spiritus attrahi non potest, sed per praefectam partem exhalat. *De Princip. XIX. 29.*

HABITVS CORPORIS.

CRASSVS.

In exercitantibus, boni habitus ad summum progressi, periculosi, si in extremo fuerint. *Aph. I. 31.*

Qui natura sunt valde crassi, magis subito moriuntur, quam graciles. *Aph. II. 44.*

Quae praeter naturam crassae existentes, non concipiunt in utero, his omentum os uteri comprimit, & priusquam attenuentur, praegnantem non fiunt. *Aph. V. 46.*

In omnibus morbis, quae partes ad umbilicum & imum ventrem sunt, crassitudinem habere, melius est. *Aph. II. 35.*

GRACILIS.

Quae praeter naturam tenues existentes in utero gerunt, abortiunt, priusquam crassescant. *Aph. V. 44.*

Pallidis, gracilibus, & crebra oris salivatione laborantibus, in somnis sudores boni sunt. *Coac. 271.*

In omnibus morbis, quae partes ad umbilicum, & imum ventrem sunt, tenues & eliquaras habere, malum. Periculosum vero illud est, etiam ad infernas purgationes. *Aph. II. 35.*

Graciles, & facile vomentes, sursum purgandi, vitantes hiemem. *Aph. IV. 6.*

HAEMOPTYSIS.

AD DIAGNOSIN.

Aetas iuvenilis ipsi obnoxia. *Aph. III. 29.*

Qui sanguineum spumofum expuunt, his ex pulmone talis reiectio fit. *Aph. V. 13.*

Qui spumantem sanguinem evomunt, partibus infra septum nequaquam dolentibus, iis ex pulmone fertur. *Coac. 433.*

AD

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Sanguinem spuitione reicientibus, sine febre esse conducit, ac tussi, & dolore leviter conflictari, spumumque ad dies 14. tenuari. *Coac.* 427.

Reiectio sanguinis parcius, a minoris venae pulmonalis ruptione. *Coac.* 433.

Quaecunque mammarum dolore ex febribus vexantur, eas sanguinis concreti spuitio non foeculenta, dolore liberat. *Coac.* 553.

DETERIORIS NOTAE

Intense febricitare, ac tussire, aut dolere, sanguinemque recentem semper spueri, minime conducibile. *Coac.* 427.

Quibus insignis in pulmone venae ruptio fit, copiosus sanguis vomitione reicitur, periculumque imminet. *Coac.* 433.

Qui spumantem sanguinem spuitione reiciunt, cum praecordiorum dextrorum dolore, iis ex iecinore prodit, & plerumque pereunt. *Coac.* 408. 450.

A sanguinis spuco, puris sputum, malum. *Aph.* VII. 15.

Sanguis farsum quidem, qualiscunque sit, malum. Deorsum vero, bonum, niger subtus secedens. *Aph.* IV. 25.

HAEMORRHAGIA IN GENERE.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Tempus vernale. *Aph.* III. 20.

Calidum. *Aph.* V. 16.

Frigidum. *Aph.* V. 24.

NOTAE ANTECEDENTES.

Variae. *Praedict.* I. 132. & seqq.

Capitis dolor, cum alto stupore, & oculis prae rubris. *Coac.* 166.

Cervicis dolor, & oculi prae rubri. *Praedict.* I. 137.

Praecordia tumida, dura, ac dolentia, cum febre, cum dolore capitis, & oculorum hebetudine, idque circa 35. ætatis annum; in senioribus vero non item. *Coac.* 280.

Quos febris detinet, cum faciei rubore, & capitis vehementi dolore, in iis, si venae pulsent, sanguinis fluxus plerumque expectandus est. *Ibid.* 142.

Venae temporum in febribus pulsantes, & facies bene habita, absque praecordiorum molitie. *Ibid.* 128.

Lumborum dolores sanguinis profluvium excitant. *Ibid.* 306.

Ex lumborum dolore, liberales sunt, & largae sanguinis fluxiones. *Ibid.* 307.

Quibus lumborum dolor in caput recurrit, & manus torpore affectae, ac oris ventriculi dolorem sentiunt, aut aurium sonitus, ii liberaliter sanguinem profundunt. *Coac.* 308. *Praedict.* I 139.

Quibus in morbis subita fit mentis percussio, cum inquieti corporis iactatione, iis sanguinis eruptionem fore spes est. *Coac.* 184.

Palpitationes circa ventrem, cum praecordiorum con-
tensione oblonga, & intumescence, vel etiam hor-
ris sensu. *Praedict.* I. 144.

Insomnia, cum subita corporis iactatione, & inquietu-
dine, praesertim si non antea quid profluxerit. *Praedict.* I. 136.

Quibus ubi inhorruerint, iudicatorii simul sudores con-
tingunt, postridie vero, si horror repetierit, & te-
mere pervigilent, absque concoctione, iis forte san-
guinem erupturum, sperare oportet. *Coac.* 24.

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Spinae perversiorem, & spirandi difficultatem, sangui-
nis fluxus liberat. *Coac.* 311.

Quibus capitis, & cervicis dolor, & totius corporis
impotentia, cum tremore adest, ab iis sanguinis eru-
ptio

ptio liberat. Quin etiam ista tempore dissolvuntur.
Praedict. I. 152.

Liberalium ab initio sanguinis eruptionum cursum, rigor sistit. *Praedict. I. 150.*

NOTAE PERICULI.

A sanguinis fluxu delirium, aut etiam convulsio, malum. *Aph. VII. 9.*

Sanguine multo effuso, convulsio, aut singultus superveniens, malum. *Aph. V. 3. Coac. 338.*

A forti pulsu in ulceribus, sanguinis eruptio, (malum.) *Aph. VII. 21.*

Sanguinis eruptiones vehementes, cum totius corporis perfrigerationibus indicatoriis, pessimae sunt. *Praedict. I. 134. Coac. 326.*

A sanguinis eruptione, nigrorum per alvum egestio, malo est. Quin & praerubrae, ac aeruginosae deiectiones, damno sunt. *Coac. 330. 333. Praedict. I. 127.*

In praecipitibus malis, quae post paucam sanguinis eruptionem, surditas obvenit, malum denunciat. In his sanguinis egestio perniciem adfert, surditatem tamen discutit. *Praedict. I. 129. Aut nigrorum per alvum refusionem. Coac. 331.*

NOTAE LETHALES.

Quibus (cum deiectionibus nigris, vel praerubris, vel aeruginosis,) sanguinis eruptiones die 4. contingunt, tandem sopore, & convulsione confictati moriuntur, praegressis nigris deiectionibus, & ventre in tumorem sublato. *Coac. 330. Praedict. I. 127.*

Qui ex vulnere subinde rigentes, sanguinem profundunt, ii maligne habent, ac inter loquendum deropente moriuntur. *Coac. 328.*

Humefcente alvo, sanguis ex gingivis effluens, lethalis. *Coac. 648.*

NOTAE ALIAE MORBI FUTURI.

ALVI MALE AFFECTAE.

Quibus sanguinis fluxus diu perseveravit, in his tempo-

ris processu, alvus male habet, nisi urinae concoctionem praefereant. *Praedict. I. 133. Coac. 332.*

Quibus per febres sanguinis copia undecunque eruperit, in refectionibus, his alvi humectantur. *Aph. IV.*

27. *Coac. 153. 335.*

Quibus die 5. liberales sanguinis profusiones contingunt, & 6. novo oborto rigore corripuntur, 7. perfrigerationibus tentati celeriter recalescunt, iis alvi male afficiuntur. *Coac. 329.*

MORBI COMITIALIS.

Qui statis temporibus sanguinem fundunt, si siticulosi sint, neque sanguinem profuderint, comitiali morbo pereunt. *Coac. 345.*

PHRENTIDIS.

Qui in febribus ad tactum nullum ardoris sensum praefecerunt, phreantici fiunt, idque magis, si sanguis fluxerit. *Coac. 228.*

AD THERAPIAM.

Frigido uti oportet, unde sanguis erumpit, aut erupturus est: non super ipsa, sed circa haec, unde influit. *Aph. V. 23.*

Quae perfrigerata sunt, excalescete oportet, praeterquam quae sanguinem profundunt, aut sunt profutura. *Aph. V. 19.*

Quibus copiosi sanguinis facta est egestio, his lac dare, malum. *Aph. V. 64.*

Haemorrhagiam sistunt, animi deliquium, partis situs, venae interceptio, linamentum contortum, appositio, deligatio. *Epid. VI.*

HAEMORRHAGIA ALVI, vid. ALVI DEIECTIO SANGVINEA.

HAEMORRHAGIA NARIVM.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Aetas adolescentiae. *Aph. III. 27.*

Quae

Quae caput concutiant, & aurium sonitum excitant.
Praedict. I. 143.

NOTAE ANTECEDENTES.

Aurium sonitus, cum visus hebetudine, & ad nares gravitatis sensu, mentis excessum, ac sanguinis ex naribus profluvium praesagiunt. *Coac. 194.*

In febre acuta, continens capitis dolor, sine gravibus aliis signis, si 20. dies superat, aut sanguinis ex naribus, aut puris effluxum, aut abscessus ad inferiores corporis partes, denunciat. *Coac. 160.*

Qui capite gravati, ad synciput dolorem sentiunt, pervigilio torquentur, iis sanguinis eruptionem fore spes est, tum vero praecipue, si aliquis contensionis sensus ad cervicem pertingat. *Coac. 168. Praedict. I. 135.*

Qui surditate, cum capitis gravitate, ac praecordiorum contensione vexantur, si oculorum acies perturbatur, in iis sanguinis e naribus fluxum sperare oportet. *Coac. 195.*

Qui statim sine ratione perturbantur, pervigilio torquentur, nigra & compacta ex alvo demittunt, interdum sanguinem e naribus profundunt. *Coac. 110.*

Quibus ex rigore febris, cum lassitudinis sensu adest, in his muliebrium profluvium expectare oportet. Quod si cervicis dolor prehenderit, sanguinis e naribus eruptionem fore spes est. *Coac. 355.*

AD PROGNOSIN.

NOTAE SALVTARES.

Quibus spes est abscessum fore ad articulos, eos abscessu liberat urina multa, crassa, & alba, &c. si vero etiam ex naribus sanguis eruperit, brevi admodum solvit. *Aph. IV. 74.*

Morbi acuti, effluente ex naribus sanguine, die iudicatorio, absoluntur, &c. *Coac. 150.*

Caput laboranti, & circumcirca dolenti, pus, aut aqua, aut sanguis effluens per nares, aut per os, aut per aures, solvit morbum. *Aph. VI. 10.*

Sanguis ex naribus effluens , solvere potest auris intensum dolorem , cum febre acuta , &c. *Coac.* 189.

Praecordia non mollia , & facies bene habita , non nisi liberali sanguinis ex naribus profluvio , aut convulsione , aut cexendicum dolore , solutionem accipiunt . *Ibid.* 296.

Tenebricosas vertigines circa initia , sanguinis ex naribus fluxio solvit. *Ibid.* 341.

Quibus in febres aures obsurduerint , his sanguis e naribus effluens , aut alvus exturbata , morbum solvit. *Aph.* IV. 60. *Coac.* 210.

Qui in febre continua defecti iacent , & oculis conniventibus nictantur , hi evadunt quidem , si post haemorrhagiam narium , ac vomitum , ad loquelam , & ad seipsos redeant . *Coac.* 77.

Qui statim sine ratione perturbantur , pervigiles sunt , sanguinem e naribus stillantes , sexto die noctu allevantur , postridie vero laborantes , tenui sudore correpti , & in somnum delati delirant , iis larga narium haemorrhagia morbum solvit. *Coac.* 87.

Febricitare incipientibus , sanguinis stillationes , cum sternutatione accedentes , & quod in urina desidet album , 4. die visum , septimo solutionem affore denunciant. *Coac.* 149.

Mulieri , menstruis deficientibus , e naribus sanguinem fluere , bonum. *Aph.* V. 33.

NOTAE PERICVLI.

Perpusillae sanguinis e naribus stillae , damno sunt. *Coac.* 57.

Sanguinis e naribus stillationes , quae 11. die contingunt , molestiam adferunt , tum vero praesertim , si bis sanguis stillarit , aut rursus nares stillare coeperint. *Coac.* 337.

Sanguinis ex parte adversa profluvium , malum est , velut si in lienis tumore , ex dextra nare effluat . Et circa praecordia idem spectari oportere , existimandum est. *Coac.* 337. *Praedict.* I. 125.

San-

Sanguinis ex naribus fluxus, in febre ardente, 4. die obveniens, malo est, nisi aliud quippiam bene ceciderit. Quod si die 5. contingat, minus adfert periculi. *Coac.* 133.

Lassitudine laborantes cum horrore, iudicii modo leviter exsudantes, celeriter ad calorem revocati, male habent: tum vero praesertim, si ista insuper sanguinem e naribus stillarent, &c. *Coac.* 36.

Qui post sanguinis ex naribus eruptionem, ex tenuibus sudoribus perfrigescunt, male habent. *Coac.* 40. 342. *Praedict.* I. 126.

NOTAE LETHALES.

Diuturnis in morbis, parvae apparentes sanguinis ex naribus fluxiones, perniciem ostentant. *Coac.* 340.

Parvi in longis morbis aurium tumores, si subinde sanguis e naribus profluat, & tenebriosa vertigo excitetur, exitio sunt. *Coac.* 105.

NOTAE CONVULSIONIS FUTURAE.

Largae sanguinis ex naribus eruptiones, per vim suppressae, interdum convulsiones accersunt, unde liberat venaesectio. *Coac.* 336.

HAEMORRHAGIA VULNERVM, vid. VVLNVS.

HAEMORRHOIDES.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Aetas virilis. *Apb.* III. 30.

Muliebrium purgamentorum retentio. *Coac.* 522.

Sputorum retentiones in tabescentibus. *Coac.* 437.

NOTAE ANTECEDENTES.

Lumborum dolores. *Coac.* 306. 621.

Dolentibus lumbis, si oris ventriculi dolor accesserit, futurae per haemorrhoidas vacuationis signum est, aut etiam eam praecessisse significat. *Coac.* 312. *Praedict.* I. 130.

AD

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Infantibus, si varices, aut haemorrhoides supervenerint, infaniae solutio fit. *Aph. VI. 21.*

Melancholicis, & nephriticis, haemorrhoides supervenientes, bonum. *Aph. VI. 11.*

Melancholicis, & phreniticis supervenientes. *De Indication. 64.*

In fideratis succedentes haemorrhoides, utiles, &c. *Coac. 478.*

Sanguis niger subrus secedens, bonum, &c. *Aphor. IV. 25.*

Qui habent haemorrhoidas, nec pleuritide, nec peripneumonia, nec ulcere depascente, nec furunculis, nec pustulis nigris corripuntur, forte nec etiam lepra, nec vitiliginibus nigris. *De Humor. 74.*

DETERIORIS NOTAE.

Ex venis in ano sanguinem fundere solitis aliquantum apparentibus, tenebricosae vertigines obortae, parvam ac sensim factam partium resolutionem indicat, ex quo liberat venaesectio. Et quicquid huiusmodi apparere solet, mali aliquid denunciat. *Coac. 346.*

AD THERAPIAM.

Haemorrhoidas curanti diuturnas, nisi una servata fuerit, periculum est, ne hydrops superveniat, aut tabes. *Aph. VI. 12.*

HEPAR.

Hepati inflammato singultus supervenit. *Aph. V. 58.*

Ab hepatis inflammatione singultus, malum. *Aph. VII. 17.*

In ictericis hepar durum fieri, malum. *Aph. VI. 42.*

Quibus hepar aqua repletum ad omentum eruperit, his venter aqua impletur, & moriuntur. *Aph. VII. 55.*

Cui perfectum est hepar, lethale, &c. *Aph. VI. 15.*

Qui ad hepar suppuratum uruntur, (aut secantur) si quidem purum effluat pus, & album, superstites evadunt:

HEP. HER. HOM. HOR. 223

dunt; ipsis enim pus est in tunica. Si vero effluat velut amurca, pereunt. *Aph. VII. 45. Coac. 451.*

HEPATIS DOLOR.

Quibus hepar circumcirca dolet, his febris superveniens dolorem solvit. *Aph. VII. 52. Coac. 449.*

Quibus hepar dolet, cum oris ventriculi dolore, sopore; rigore, ii, alvo exturbata, cum corporis extenuatione, ciborum fastidio, multis tenuibus sudoribus dissolunt, & purulenta per alvum demittunt. *Coac. 448.*

HEPATICI.

Hepatico colliquatio cum raucedine, malum portendit, idque praecipue, si cum quadam tussi contingat. *Coac. 447.*

Hepaticis sputum multum cruentum, sive intus subputridum, sive sincere biliosum fuerit, statim perniciem denotat. *Coac. 446.*

HERPES.

Herpetes ex his, quae depascendo serpunt, minimum habent periculi; at secundum abditos caneros difficilius tolluntur. *Praedict. II. 76.*

Calidum herpetibus exedentibus confert, &c. *Aph. V. 22.*

HOMO.

Totus homo ex nativitate morbus est. *Epist. ad Damag. II. 279.*

HORROR. HORRIPILATIO.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Anni tempus aquilonium. *Aph. III. 5.*

AD PROGNOSIN.

DETERIORIS NOTAE.

A sudore horror, non bonum. *Aph. VII. 4.*

Cre-

Crebri ex dorso horrores, subinde locum commutantes, graves sunt, & difficiles. Laboriosam quippe urinae suppressionem minantur. His tenuiter exsudare pessimum. *Coac.* 9.

Qui subinde inhorrescunt, ex capite laborantes, tenuiter exsudantes, ii maligne habent. *Coac.* 12.

Qui subinde inhorrescunt, saepe tenui sudore corripuntur, difficili morbo laborant. *Coac.* 13.

LETHALIS.

Horror, cum lumborum doloribus ad os ventriculi recursantibus, cum febre, tenuium & aquosorum vomitione, delirio, vocis defectione, tandem nigrorum vomitione. *Coac.* 316.

ALIVM MORBVM PORTENDENS.

ALVI FLUXVM.

Qui subinde inhorrescunt, ac incontinenti corporis iactatione, cum lassitudinis sensu, & lumborum dolore conflictantur, iis alvi effunduntur. *Coac.* 19.

CONVULSIONES.

Membranosae mictiones, & quae cum horrore subsidunt. *Coac.* 584.

HAEMORRHAGIAM.

Post horrorem iudiciorii sudores, postridie horror praeter rationem recurrens, absque pervigilio, & concoctione. *Coac.* 24.

Post horroris sensum insomnia, cum subita corporis iactatione, & inquietudine. *Coac.* 111.

MVLIEBRES PVRGATIONES.

Horror frequens, cum lassitudine, & capitis gravitate. *Coac.* 541.

SVPPVRATIONEM.

Qui per sanitatem crebro inhorrescunt, ii ex sanguinis fluxu purulenti evadunt. *Coac.* 16.

Qui subinde horrore corripuntur, ad suppurationem deveniunt. Quin etiam febris talem ad suppurationem ducit. *Coac.* 422.

TABEM.

Vbi horror in malis subinde incidit, cum difficultate spirandi, tabes denunciatur. *Coac.* 17.

AD THERAPIAM.

Horrorem, vinum par pari aqua potum, solvit. *Aph.* VII. 56.

CONF. FRIGVS. RIGOR.

HVMERI DOLOR.

Humerorum dolores, qui ad manus tendunt, torporesque & dolores exhibent, abscessus certe non consequuntur, at bilis atrae vomitione sanantur. *Praedict.* II. 172.

Eos autem, qui in humeris perdurant, & ad dorsum pertingunt, puris, aut atrae bilis vomitione effugiunt. *Praedict.* II. 173.

In facile spirantibus, & extenuatis, vomitio nigrae bilis, in difficulter spirantibus autem, si in faciem color subruber, aut niger, antea non visus, subvehitur, puris exputio magis speranda. *Praedict.* II. 174.

HYDROA, vid. SVDAMINA.

HYDROPS.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Autumnus. *Aph.* III. 22.

Dysenteria longa in lienosis. *Aph.* VI. 43.

Haemorrhagiae nimiae. *Epid.* VI. IV. 29.

Haemorrhoides diuturnae curatae, nisi una servata fuerit. *Aph.* VI. 12.

Leucophlegmatiae hydrops supervenit. *Aph.* VII. 74.

Spirationes, quae non nisi erecta cervice ducuntur, hydropem siccum faciunt. *Coac.* 424.

Febris ardens. *Epid.* VII. XIII. 9.

Morbus acutus. *Praenot.* 42. *Coac.* 452.

NOTAE ANTECEDENTES.

Quibus tormina, & circa umbilicum dolores, & lumborum dolor, qui neque purgante, neque aliter solvitur, in hydropem siccum firmatur. *Aph. IV. 11. Coac. 304.*

Viscosis alvus perturbata, exigua reddens, geniturae similia, & mucosa, doloremque ad imum ventrem inferentia, urinae quoque non facile prodeuntes, ad hydropem tendunt, ex huiusmodi casibus. *Coac. 455.*

NOTAE COMITANTES.

Hydrops oritur fere ex laterum inanitate, & lumbis, partimque ex iecore. *Praenot. 43. Coac. 452.*

Vbi a laterum inanitate ortum contraxit, pedum tumor, & alvi diuturnus fluxus consequitur, neque ventrem emollit, neque lumborum, aut ilium tumorem solvit. *Coac. 452. Praenot. 44.*

Quibus e iecore proficiscitur, ii prompte etiam tussi vexantur, pedes intumescunt, & alvus nonnisi dura, & aegre reddit, tumoresque modo dextra, modo sinistra parte ventris oriuntur, ac rursus desinunt. *Coac. 452. Praenot. 45.*

Quibus ex aliqua aegritudine hydrops circumvenit, iis alvi resiccatae caprinis stercorebus similia deliciunt, cum mucosa eliquatione, neque laudabili urina. Praecordiorum autem distentiones, ventris dolores, ac tumores, & circa laterum inanitates, ac spinarum musculorum dolores incidunt. Febres quoque, sitis, & tussis siccae comitantur, & ad motiones spirandi molestia, & crurum gravitas. Cibos etiam averfantur, paucisque sumptis expleantur. *Coac. 481.*

AD PROGNOSIN.

NOTAE SALVTARES.

Viscera valida, vires vegetae, facile concoquere, bene spirare, sine dolore esse, totum corpus aequaliter calere, neque extremis partibus colliquefactum esse, neque tussim, neque sitim adesse, neque linguam inarescere, cibos suaviter assumere, ac ubi quis abunde
come.

comederit, nihil affigi; ventrem medicamentis ce-
 leriter moveri, alias mollia & figurata excernere; uri-
 nam pro ingestorum ratione mutari; defatigationem
 facile sustinere, nec lassitudinem sentire. *Praedict. II. 39.*
 Ab hydrope detento, si aqua secundum venas in alvum
 fluxerit, solutio fit. *Aph. VI. 14. Coac. 461.*
 Aquae inter cutem initio, aquosum alvi profluvium, abs-
 que cruditate exortum, morbum solvit. *Coac. 457.*
 Ab insania dysenteria, aut hydrops, aut mentis emo-
 tio, bonum. *Aph. VII. 5.*

NOTAE PERICULI.

Hydropi hiems magis infesta. *Aph. VIII. 8.*
 Hydropicis tussis superveniens, malum. *Aph. VI. 35.*
VII. 47.
 Hydropicis ulcera in corpore orta, non facile sanan-
 tur. *Aph. VI. 8.*
 Vbi hydrops siccus de se significationem praebet, tor-
 mina ad tenue intestinum incumbencia, malum de-
 nunciant. *Coac. 458.*
 In hydrope sicco, urina stillatim effluens, malum de-
 nunciat. Mala quoque est, quae exiguae habet sedi-
 menta. *Coac. 453.*

NOTAE LETHALES.

Notae salutaribus oppositae. *Praedict. II. 40.*
 Aqua inter cutem, quae ex acuto morbo coepit, mo-
 lestiam ac perniciem affert. *Coac. 452. Praenot. 42.*
 Hydrops ex longa dysenteria ortus, in lienosis. *Aph.*
VI. 43.
 Quibus hepar aqua repletum ad omentum eruperit, his
 venter aqua impletur, & moriuntur. *Aph. VII. 55.*
 Aqua inter cutem quae curationi cessit, ubi recurrit,
 spem tollit. *Coac. 460.*
 Ex aqua inter cutem, morbus comitialis perniciem ad-
 fert. *Coac. 459. 454.*
 Aqua inter cutem laboranti, cum febre, urina pauca,
 & conturbata, perniciem denotat. *Coac. 456.*
 Qui suppurati, aut hydropici uruntur, aut secantur,

hi pure aut aqua acervatim effluente, omnino moriuntur. *Aph. VI. 27.*

AD THERAPIAM.

Hydropicum, si a principio acceperis, priusquam aqua superexcresecat, pharmaca bibenda dato, a quibus aqua, aut pituita purgatur; bilem vero ne moveto. Cibos autem, & potus, & labores, ac deambulationes constituito, a quibus gracilis ac siccus evadat, & carnes quam robustissimae fiant. *De Affect. XXIII. 12. ad 15.*

Si a pharmacis, & alia victus ratione, aeger utilitatem percipiat, & venter ipsius evacuetur, bene est. Sin minus, sectione facta aquam emittito. Secatur autem vel iuxta umbilicum, vel retro iuxta lumbos. Effugiunt autem & hinc pauci. *Ibid. XXIII. 24. ad 27.*

HYDROPS PECTORIS, ET PVLMONIS.

AD DIAGNOSIN.

Si hydrops in pulmone fiat, febris & tussis tenet, & acervatim respirat, & pedes tument, & ungues contrahuntur omnes, & patitur talia, qualia is qui suppuratus fit, sed debilius, ac diuturnius. *De Morb. II. LIX. 1. ad 7.*

Fit etiam, si tubercula in pulmone fuerint enata, & aqua repleta, & in pectus rupta. *De Int. Affect. XXV. 9.*

AD PROGNOSIN.

Si post sectionem adhibitam, linamento pus adhaeserit quinta die, plerumque evadit. Sin minus, ubi aquam exhausteris, sitis corripit, & tussis, & moritur. *De Morb. II. LIX. 27. 28.*

AD THERAPIAM.

Hydrope pulmonis affectum, si extra intumuerit, inter costas lectum curare oportet. *De Morb. II. LIX. 19. 20.*

Si non intumuerit, multa calida lotum, velut suppurationes collocato, & qua parte strepitum perceperis, ea seca-

secato, quam potes infimo loco, quo effluxio facilis contingat. Postquam secueris, linamentum ex lino crudo indito, ita ut crassum & acutum linamentum facias, & sanguinem paucissimum emittas. *Ibid.* 21. ad 26.

HYDROPS VTERI.

Si aqua intercus in uteris nascatur, menses pauciores & pravi sunt, & ante tempus deficiunt, & imus venter intumescit, & mammae solidae, molles fiunt, & lac malum, & putat se in ventre habere. *De Morb. Mul. I. LXXXV. 1. ad 4.*

HYEMS, vid. ANNI TEMPVS.

HYPERCATHARSIS. SUPERPVRGATIO.

AD PROGNOSIN.

In omni superflua purgatione, frigus cum sudore exitiale. Et inter haec, qui subinde vomunt, & siticulosi sunt, male habent. Qui vero anxietate laborant, cum lumborum dolore, iis alvus humectantur. *Coac.* 568.

Purgationi immodicae convulsio, aut singultus superveniens, malum. *Aph. V. 4. VII 41.*

Convulsio ex elleboro, lethale. *Aph. V. 1. Coac.* 567.

AD THERAPIAM

Quum quis a medicamenti potu superaegrotarit, & inferne, ac superne ab ipso secesserit, vinum sorbeat, primum quidem dilutum, deinde meracum frequenter, & sanabitur. *De Loc. in hom. XLV. 1. 2.*

HYPOCHONDRIA. PRAECORDIA.

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Praecordia, sine ullo doloris sensu, aequaliter mollia esse oportet. *Coac.* 279.

DETERIORIS NOTAE.

Praecordia inflammatione tentata, aut inaequaliter affecta,

ta, aut dolore vexata, non contemnendae aegritudinis notas praefecerunt. *Coac.* 279. 280.

Praecordiorum pulsus cum turbatione mentem emovet, idque praecipue, si oculi frequenter moveantur. *Coac.* 282.

Dextrum hypochondrium durum, in febre, cui morbus regius supervenit. *Aph.* IV. 64.

HYPOCHONDRIORVM SEV PRAECORDIORVM DOLOR.

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Quibus ad hypochondrium dolores sunt, absque inflammatione, his febris superveniens solvit dolorem. *Aph.* VI. 40.

Quos derepente, absque febre, praecordiorum, aut oris ventriculi dolor, aut crurum, & inferiorum partium, affligit, alvusque intumescit, venaesectio, aut alvi fluxus solutionem adfert. *Coac.* 294.

Qui praecordiorum doloribus, oris ventriculi, iecoris, ac earum, quae sunt circa umbilicum, partium, conficiantur, cruenta alvi detectione liberantur. *Coac.* 295.

DETERIORIS NOTAE.

Oris ventriculi dolor, ac praecordiorum pulsus, cum febre, in qua totus corporis habitus perfrigeratur, malum denunciant; idque praesertim, si cum tenuibus sudoribus contingunt. *Coac.* 283.

Ingruentes ad praecordia dolores, cum alias pravi sunt, tum vero, si alvos profundant. Deteriores autem, si parvo tempore fiant. Quin & inde suborta ad aures tubercula, aliaeque suppurationes, malignitatem praefecerunt. *Coac.* 284.

Quibus praecordia dextra dolent, aut ex virore pallescunt, aut abscessus ad aures cum dolore excitantur, in his paulo post effusa alvus periculum denunciat. *Coac.* 578.

Praecordiorum dolores in febre, aegro fari nequeunte,
si abs.

HYP.

131

si absque sudore solvantur, malum indicant. His ad coxendices dolores incumbunt. *Coac.* 297. *Praedict.* I. 90.

Quae ad praecordia, aut pulmonem, dolores faciunt, si in pus vertuntur, malum denotant. *Coac.* 216.

Vterum gerentibus praecordiorum dolor, malum denunciat, &c. *Coac.* 523.

Praecordiorum dolor, cum rigore, & alvi perturbatione, in puerperiis, cum lochiorum subsistentia. *Coac.* 516.

LETHALIS.

In praecordiis ex longo intervallo affictis, & graveolente alvo, subnatum ad aures tuberculum, mortem adfert. *Coac.* 292.

Dolores praecordiorum, oris ventriculi, iecoris, ac partium circa umbilicum, nisi cruenta alvi deiectione solvantur. *Coac.* 295.

Dolores in febre ad praecordia affilientes, sine sudore soluti, maligni sunt. In his dolores ad coxendices, cum ardente febre, atque alvus affatim erumpens, perniciem ostentant. *Coac.* 299.

Praecordii dolor citra iudicationem, cum impotentia, & torpore obveniens, in angina. *Coac.* 374.

Circum praecordia labores, in aegris una cum febre cibum fastidientibus, &c. *Coac.* 317.

ALIVM MORBVM PORTENDENS.

PAROTIDES, ac forte CONVULSIONEM.

Praecordiorum dolor, cum sopore, corporis inquietudine, frequenti & pauca sputatione. *Coac.* 185.

PHRENITIDEM.

An praecordiorum dolor, cum insomnia, sopore ab initio, &c? *Coac.* 179.

SANGVINIS ERUPTIONEM.

Ex praecordiorum doloribus, alvus aliquantum viscida paulatim transmittens, stercoracea pauca effundit, ac fortassis sanguinem profundit. *Coac.* 293.

HYPOCHONDRIORVM TENSIO.

AD PROGNOSIN.

DETERIORIS NOTAE.

Praecordia intro tracta, & tensa. *Coac.* 51.Praecordiorum distensio, cum tenui & crebro sudore; vel etiam doloribus in humeri caput, ac claviculas affixis, in febre non intermittente. *Coac.* 32.

LETHALIS.

Praecordiorum contentio, cum febre acuta, plurimis graveolentibus deiectionibus, & ex longo intervallo abortis ad aures tuberculis. *Coac.* 201.

ALIVM MORBVM PORTENDENS.

ABSCESSVM ad AVRES.

Praecordiorum contentio, cum febre acuta, & magna spiratione, in bile redundantibus. *Coac.* 126.

PAROTIDES.

Praecordiorum contentio, cum febre acuta, & perfrigeratione, in anhelatoribus, & suspiriosis. *Coac.* 107.Praecordiorum contentio, cum sopore, & incontinenti corporis iactatione, & capitis dolore. *Coac.* 289.

HAEMORRHAGIAM NARIVM.

Praecordiorum contentio, cum surditate, & capitis gravitate, si oculorum acies perturbatur. *Coac.* 195.

PHRENITIDEM.

Praecordia revulsa, in praecipiti morbo, cum capitis dolore, nisi sanguis ex naribus profluat. *Coac.* 119.

HYPOCHONDRIORVM TVMOR.

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Praecordiorum dolores, & tumores, recentes quidem, & sine inflammatione, murmur solvit circa praecordia exortum, idque potissimum, si cum stercore, urina, & flatu prodierit. Alioqui ubi ipsum per se
trans-

transmissum fuerit, iuvat; idque magis, si ad inferiores sedes descenderit. *Praenot.* 69.

Praecordiorum molles, & doloris expertes tumores, longiore spatio finiuntur, nec ita grave periculum afferunt. *Coac.* 281. *Praenot.* 35.

Quibus hypochondria elevata sunt, murmurantia, dolore lumborum superveniente, his alvi humectantur: nisi flatus eruperint, aut urinae copia prodierit. In febribus autem haec. *Aph.* IV. 73.

DETERIORIS NOTAE.

Tumor in praecordiis durus, & dolens, pessimus quidem, ubi tota praecordia occupavit. Sin vero altera parte sit, minore cum periculo sinistra. *Praenot.* 32. Praecordia sublata, subsistente alvo, malum denunciant, praecipue vero in his, qui ex longo intervallo contabescunt, & quibus alvi disfluunt. *Coac.* 287. 442.

LETHALIS.

Praecordiorum tumores duri, ac dolentes, circa principia quidem mortem brevi affore, indicant. *Praenot.* 33. *Coac.* 280.

Quibus praecordia inflammatione tentantur, & pus colligunt, iis sub mortem nigra deliciuntur. *Coac.* 288. ALIVM MORBVM PORTENDENS,

PAROTIDES.

Ex praecordiorum tumore, spiratio magna, & febris acuta, in biliosis. *Coac.* 290.

SVPPVRATIONEM.

Praecordiorum tumor durus, ac dolens, si intra 20. dies non subsidat, neque febris quiescat. *Praenot.* 33. *Coac.* 280.

Tumores praecordiorum molles, & doloris expertes, digitisque cedentes, si intra 60. dies neque febris cesset, neque tumor subsidat. *Praenot.* 35. *Coac.* 281.

AD THERAPIAM.

Quibus hypochondria elevata sunt, murmurantia, iis lac dare, malum. *Aph.* V. 64.

HYSTERICA AFFECTIO.

AD DIAGNOSIN.

Plurimas uteri affectiones flatus faciunt. Signum sunt ructus, & strepitus circa ventrem, & lumborum tumores, & dolores circa renes, ac coxas, *Epid. VII. XXXIV. 12.*

AD PROGNOSIN.

Mulieri ab uterina passione vexatae, aut difficulter parienti, sternutatio superveniens, bonum. *Aph. V. 35.* In uteri strangulatu, non antea expertae convulsiones, faciles sunt. *Coac. 349 554. Praedict. I. 119.*

AD THERAPIAM.

Ad affectiones uteri confert, aromatum p. 1. farinae p. 2. in vino odorato albo coquere, & linteolo illita, cataplasmatibus modo imponere, qua parte ventris dolores ab utero affligunt. *Epid. VII. XXXIV. 13.*

Si cor strangulatur, ab utero reprimitur, & spiritus habet, & anhelatio: viticis & poeboniae semen in vino bibere oportet; aut abrotanum, & panaces, & ammoniacum; aut rutam; aut somnificium papaveris succum. *De Morb. Mul. II. LXXX. 1. ad 6.*

IACTATIO. INCONTINENTIA.

AD PROGNOSIN.

NOTAE PERICULI.

Corporis iactationes, & incontinentiae, cum perfrigeratione, pessimae. *Coac. 2.*

Qui in gravibus malis tenuiter exsudent, & quadam corporis incontinentia iactantur, male habent. *Coac.*

53.

Qui per febres intermittentes, ad manus contactum exardescunt, torpore, siti, ac corporis incontinenti iactatione vexantur, ii alvo intercepta gravati exsolvantur. Interdum vero etiam praerubra in pedibus ambusta, eadem denunciant. *Coac. 153.*

Corporis aestuatione, & inquieta iactatione confictati, citra

citra vomitum ingravescentes, male habent; atque etiam qui vellicantur citra vomitum. *Coac.* 557.

NOTAE LETHALES.

In praecipitibus malis, tenues circa caput maxime sudores oboriri, & corporis incontinentia quadam iactari, malum indicat; tum vero praecipue perniciēs intenditur, si ista cum urinis nigris contigerint, & spiritus magnus, & concitatus adfuerit. *Coac.* 49.

NOTAE ALIUS MORBI FUTURI.

CONVULSIONIS.

In praecipitibus malis, corporis motio, iactatio, ac turbulentus somnus, nonnullis convulsionem portendit. *Coac.* 82.

HAEMORRHAGIAE NARIVM.

Qui insomnia vexantur, cum subita corporis iactatione, & inquietudine, iis sanguinem e naribus erupturum sperare oportet, idque praesertim, si quid antea profluxerit. Animadvertendum vero, num in modice perfrigeratis, id post horroris sensum contingat. *Coac.* 111.

SECESSVS NIGRI.

Considerandum est, in aestuabundis, & corporis iactatione citra vomitum, & lumborum dolore confectis aegris, si audacter desipuerint, num nigra per secessum proditura sint? *Praedict.* I. 85.

ICTERVS. MORBVS REGIVS.

AD DIAGNOSIN.

NOTAE ANTECEDENTES.

Spumans, & bile obdustum alvi recrementum, vitio est. Quin & inde morbus regius contrahitur. *Coac.* 606.

Frequentes, & ex parvis intervallis desidendi labores, aliquantulum glutinosa excernentes, cum paucis stercoreis, praecordiorum & lateris dolore, morbum regium praenunciant. *Coac.* 621.

Qui lumborum, & lateris dolore, absque ulla occasione tentantur; ii in morbum regium incidunt. *Coac.* 325.

NOTAE COMITANTES.

Isterici non admodum flatulenti sunt. *Aph.* V. 72.

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Quibus in febre die 7. aut 9. aut 11. aut 14. morbus regius supervenit, bonum est: nisi dextrum hypochondrium durum sit. *Aph.* IV. 64. *Coac.* 121.

DETERIORIS NOTAE.

In istericis hepar durum fieri, malum. *Aph.* VI. 42.

Isterus in febre, cum dextro hypochondrio duro. *Aph.* IV. 64. *Coac.* 121.

Quibus in febre morbus regius supervenit ante septem diem, malum est; (nisi confluxus humorum per alvum fiant.) *Aph.* IV. 62. *Coac.* 121.

Morbus regius, cum surditate, urinis prae rubris, non subsidentibus, & sublimamentis, ac mentis emotione. *Praedict.* I. 32. *Coac.* 198.

Ex morbo regio fatuitas, & stupiditas, malo est. *Praedict.* I. 32. *Coac.* 198.

In morbo regio affectis, nec admodum sentientibus, quibus singultus adest, iis alvus effunditur, forte vero etiam supprimitur; atque hi cum virore pallescunt. *Coac.* 490.

Alvi recrementum candicans, stercorosum, in morbo regio molestiam exhibet; ac liquidum etiam, ubi confederit, ruborem adeptum. *Coac.* 613.

LETHALIS.

Lassitudine laborantes cum horrore, iudicii modo leviter exsudantes, celeriter ad calorem revocati, male habent; tum vero praesertim, si ista insuper sanguinem e naribus stillarent. Circa haec aurigine admodum foedati, & largius colorati, moriuntur, iisque album alvi recrementum prodit. *Coac.* 36.

Qui

Qui vehementer effiant, & reflexis sunt palpebris, ac per somnum leviter suspiciunt, aurigine admodum foedati, & largius colorati moriuntur. In his album alvi recrementum praecedat. *Coac. 64.*

AD THERAPIAM.

Morbum regium sic curare oportet: Extrinsecus quidem corpus molliendum est balneis calidis; alvus vero, & vesica humectanda, & urinam cientia danda. Si vero fortis fuerit, purgato capite, pharmacum quoddam potandum dato, quod bilem deorsum purgat. Postea vero urinam cientibus utendum est. *De Affect. XXXIII*

IEIVNIVM, vid. FAMES.

IGNORANTIA.

In rigore familiares non agnoscere, & eorum, quae gesta sunt, oblivisci, malum indicat. *Praedict. I. 64. Coac. 6.*

ILEVS. VOLVVLVS.

AD DIAGNOSIN.

Tempus autumnale ipsi obnoxium. *Aph. III. 22.*

Volvulus cum apprehenderit, venter durus fit, & nihil fecernit, & dolor inferne omnem alvum tenet, & febris, & sitis. Aliquando vero prae dolore, aeger etiam bilem vomit. *De Affect. XXII. 1. 5.*

AD PROGNOSIN.

PERICVLOSVS.

Ab ileo vomitus, aut singultus, aut convulsio, aut delirium, malum. *Aph. VII. 10.*

In tenuioris intestini morbo laborantibus, vomitio, & surditas, malo sunt. *Coac. 470.*

LETHALIS.

Quibus ex urinae stillicidio volvulus supervenit, in 7. diebus pereunt, nisi febre superveniente, urina abunde fluxerit. *Aph. VI. 44. Coac. 475.*

AD

AD THERAPIAM.

Humectare oportet intrinsecus, & extrinsecus; & multa calida lavare; & bibenda dare, quae alvum movent, & urinam subducunt; & clysterem adhibere, si admittat. Si vero non admiserit clysterem, fistulam ad utriculi extremitatem alligato, & insufflando multum flatum immittito. Et ubi intestinum & venter elevata fuerint a flatu, exenta fistula, statim infusum per clysterem immittito. Et si susceperit, feces emittet, & sanus evadet. Si vero sic non susceperit infusum, moritur maxime 7. die. *De Affect. XXII. 5. ad 13.*

IMBECILLITAS.

Febricitantium corpus magis quam pro ratione colliguesieri, malum est, & infirmitatem indicat. *Aph. II. 28.*

Qui temere, ac praeter rationem nulla existente vasorum inanitione, impotentes fiunt, ii male habent. *Coat. 54. Praedict. I. 40.*

IMPETIGO.

AD DIAGNOSIN.

Tempus vernale ipsi obnoxium. *Aph. III. 20.*

Ex pituita nascitur. *De Affect.*

AD THERAPIAM.

Ad impetiginem & lepram confert aqua calcis ita temperata, ut non exulceret. *Epid. II.*

IMPOTENTIA GENERANDI, *vid. CONCEPTIO.*
INEDIA, *vid. FAMES.*

INFLAMMATIO.

Febrim comitem habet. *De Flat. VII. 2.*

Inflammationem, aut dolorem partium principalium, indicat spiratio frequens, & parva. *Coac. 260.*

Qui sanguinem vomuat, cum febre multa, dolore ad
mam-

IN.

INT.

139

mammam, thoracem, & dorsum, &c. ad summum
diebus 14. inflammationem concipiunt. *Coac.* 426.

INGVEN.

AD DIAGNOSIN.

Cum inflammatione inguinum, abscessus & febris. *De
Flat.* VII. 4.

Vlcera serpentia supra inguina, ad laterum inanita-
tem, & pubem enata, alvum male affectam signifi-
cant. *Coac.* 628.

A retenta purgatione menstrua, circa inguen tuber-
culum suppurans, in mulieribus. *De Nat. puer.*
VII. 17.

AD PROGNOSIN.

Vulnera venis crassis, in collo, & inguinibus inflicta,
lethalia. *Praedict.* II. 68.

INQUIETVDO, *vid.* *IACTATIO*.

INSANIA, *vid.* *MANIA*.

INSOMNIA.

Diurnis actionibus congrua, sanitatis signum. *De In-
somm.* III. 1. ad 6.

Diurnis actionibus adversa, turbationis in corpore si-
gnum. *De Insomm.* III. 7. ad 9.

In somnis solem & lunam, & coelum atque sidera pu-
ra, & suo motu agitata videre, bonum: sanitatem
enim indicat. *Ibid.*

Si in stagno, aut mari, aut fluminibus natare, quis
somniaet, bonum non est, cum humiditatis abundan-
tiam indicet; febricitanti vero bonum. *Ibid.*

Fluviorum transitus, hostes armati, monstra difformis,
morbum aut furorem praesagiunt. *Ibid.*

INTESTINA TENVIA.

AD PROGNOSIN.

NOTAE PERICULI.

Vbi hydrops siccus de se significationem praebet, tor-
mina

mina ad tenue intestinum incumbentia, malum denunciant. *Coac.* 458.

Quibus ex muliebribus purgamentis, dolores intensi ad superiorem ventris partem, & tenuius intestinum excitati, alvos humectant, & levem anxietatem inducunt, his ad iudicationem, in somnum propensiones fiunt, & impotentes ex capitis dolore, cum tenuibus sudoribus, & perfrigerationibus vexantur. Huiusmodi recidivae, plurimis post remissionem obortae, celeriter interimunt. *Coac.* 518.

NOTAE LETHALES.

Si ex intestinis tenuibus aliquod dissectum fuerit, non coalescit. *Aph.* VI. 24. *Coac.* 503.

Cui perfectum est aliquod ex intestinis tenuibus, lethale. *Aph.* VI. 18.

Ex laterum inanitate, ad tenue intestinum migrantes dolores, in diuturnis morbis, ex abortione, neque admodum purgata muliere, perniciem denunciant. *Coac.* 515.

Lumborum ac tenuioris intestini diuturni dolores, & circum praecordia labores, in aegris una cum febre cibum fastidientibus, eos dolor intensus ad caput progressus, non sine convulsionis specie, celeriter interficit. *Coac.* 317.

NOTAE HYDROPIIS FUTURI.

In biliosis perturbata alvus, pauca crebro reddens, & cum paucis mucosis distentionem facientia, aborto circa tenue intestinum dolore, nec facile prodeunte urina, ex his casibus in aquam intercutem tendit. *Coac.* 644.

INTESTINVM RECTVM.

Hinc inflammationi urinae stillicidium supervenit. *Aph.* V. 58.

IRA.

Ira praeceps cor & pulmones in se contrahit, & ad caput calorem, & humorem trahit. Animi autem tranquillitas cor relaxat. *Epid. VI.*

Anhelantes clamore, & iracundia abstinere oportet. *Ibid.*
ISCHIADICVS DOLOR, vid. COXA.

ISCHVRIA. VRINAE RETENTIO.

AD DIAGNOSIN.

NOTAE ANTECEDENTES.

Crebri ex dorso horrores, subinde locum commutantes, graves sunt, & difficiles. Laboriosam quippe urinae suppressionem minantur. His tenuiter exsudare, pessimum. *Coac. 8. 46.*

AD PROGNOSIN.

MALA.

Vesica intercepta, maximeque cum capitis dolore, convulsionem quandam minatur. *Coac. 588. Praedict. I. 120.*

Derepente obortus renum dolor, cum urinae suppressione, calculorum, & urinae crassae mictionem indicat. *Coac. 589.*

Vrina intercepta, & ad imum ventrem pondus, ut plurimum futurum urinae stillicidium denunciat: si minus, alium aliquem morbum ex consuetudine affligentem. *Coac. 591.*

LETHALIS.

In biliosis urina intercepta, mortem brevi affore significat. *Coac. 592.*

IVVENTVS, vid. AETAS.

LABIA.

Contractum labrum biliosae alvi perruptionem denunciat. *Coac. 240.*

Si labrum pervertatur, aut corrugetur, aut livescat, aut pallescat, cum alio aliquo signo, mortem in propinquo esse, sciendum est. *Praenot. 6.*

Le-

Lethale quoque, labra resoluta, pendentia, frigida,
& exalbida esse. *Praenot. 7.*

Cum labra exulcerantur, tunc fere desinunt febres.
Epid. VI.

LABOR, *vid. MOTVS.*

L A C.

EIVS VSVS.

Lac omne quidem nutrit, verumtamen ovillum alvum
sistit, caprillum vero magis alvum laxat; vaccinum
minus; equinum, & asinum alvum magis movet.
De Diet. II.

Lac dare convenit tabidis, non admodum febricitanti-
bus, & in febribus longis, & languidis, nullo ex
contrariis signis praesente; & praeter rationem exte-
nuatis. *Aph. V. 64.*

EIVS NOXA.

Lac dare capite dolentibus, malum. Malum vero etiam
febricitantibus, & quibus hypochondria elevata sunt,
murmurantia, & fisticulosis. Malum autem, & qui-
bus deiectiones biliosae, & qui in acutis sunt fe-
bribus; & quibus copiosum sanguinis facta est egestio.
Aph. V. 64.

LAC MAMMARVM.

AD DIAGNOSIN.

Si mulier, quae nec praegnans est, nec peperit, lac
habeat, ei menstrua defecerunt. *Aph. V. 39.*

Mulieri in utero gerenti, si multum lactis ex mammis
fluxerit, infirmum foetum significat, &c. *Aph. V. 52.*

Mulieribus, quae denso corpore sunt, tardius lac gi-
gnitur: iis vero, quae rariore sunt habitu, citius.
De Nat. puer.

Quae parca menstrua habent, ut plurimum sine lacte
sunt. *De Nat. puer. XL. 19.*

AD THERAPIAM.

Si lac mulieri deficiat, porrum & brassicam comedat,
& hor-

& hordeum decorticatum, una cum butyro coctum,
& refrigeratum bibat. *De Morb. Mul.*

LASSITUDO.

AD DIAGNOSIN.

Spontaneae lassitudines morbos denunciant. *Aph. II. 5.*

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Lassitudo cum sopore, & surditate, dein alvo erumpente, & ad iudicationem rubra demittente. *Coac. 182.*

Lassitudo in febribus, cum urina multa, & crassa, & alba, die 4. reddita. *Aph. IV. 74.*

DETERIORIS NOTAE.

Lassitudine confecti aegri, singultuosi, & alto stupore detenti, male habere significantur. *Coac. 45.*

Lassitudine laborantes, cum horrore, iudicii modo leviter exsudantes, celeriter ad calorem revocati, male habent, &c. *Coac. 36.*

Delassati aegri, caligine obducti, pervigiles, & sopore detenti, cum tenui sudore recalescentes, male habent. *Coac. 35.*

Lassitudinis sensus, cum lingua praeter rationem molli reddita, ac nauseabunda, cum sudore frigido, alvo liquida, & nigra vomitione. *Coac. 232.*

NOTAE ALIUS MORBI FUTURI.

MVLIEBRIS PROFLVVII.

Ex rigore febris, cum lassitudinis sensu. *Coac. 555.*

ALVI FLVXVS.

Lassitudinis sensus, cum horrore frequenti, incontinenti corporis iactatione, & lumborum dolore. *Coac. 19.*

ABSCESSVS ad ARTICVLOS, & MAXILLAS.

Febres lassatoriae. *Aph. IV. 31.*

HAEMORRHAGIAE NARIVM.

Ex rigore febris, cum lassitudinis sensu, si cervicis dolor prehenderit. *Coac. 555.*

INSANIAE.

An lassitudo, cum dolore capitis, siti, pervigilio, loquela obscura, impotentia ad motum, & humescens alvo? *Coac.* 175.

AD THERAPIAM.

In omni corporis motu, quando dolere coeperit, interquiescere statim lassitudinem curat. *Aph.* II. 48.

LATERIS DOLOR.**AD DIAGNOSIN.****CAUSAE ANTECEDENTES.**

Tempus hiemale. *Aph.* III. 23.

Constitutio aquilonia. *Aph.* III. 5. 17.

Tumores ulcerum in antica parte, repente evanescentes. *Aph.* V. 65.

AD PROGNOSIN.**NOTAE PERICULI.**

In dolore lateris, sanguinis e naribus stillatio, mala est. *Coac.* 405.

NOTAE LETHALES.

Cum febre lateris dolor accedens, alvi deiectiones aquoso-biliofae, dein cibi fastidium, sudores, facies bene colorata, alvus humescens, & oris ventriculi dolor. *Coac.* 67.

Quibus in febre ardente, tumores cum somnolentia, & torpore obveniunt, eos lateris dolor accedens, cum levi partis alicuius sideratione necat. *Coac.* 60.

Dolor in pectore fixus, cum torpore, suborta febre malum indicat, iique celeriter mortem appetunt. *Coac.* 315.

NOTAE ALIUS MORBI FUTURI.**ICTERI.**

Lumborum & lateris dolor, absque ulla occasione. *Coac.* 325.

PHRE.

PHRENITIDIS.

Lateris dolor citra inflammationem, cum turbulentis, tenuibus, moderatis. *Coac.* 411.

Dolor lateris acutus, cum surditate, & febre, post alba a partu prodeuntia, dein subsistentia. *Coac.* 525.

TABIS.

Intestinatorum levitates, cum spirandi difficultate, & pectoris morfu, ad tabem tendunt, *Coac.* 469.

AD THERAPIAM.

Ad dolorem lateris dissolvendum, idonea sunt calefactoria. *De Vict. acut.* XI. 1. 2.

LEGVMINA.

Omnia flatuosa sunt, & cruda, & cocta, & fricta, & macerata, & viridia. *De Vict. acut.* LIX. 8.

LEPRA.

Tempus vernale ipsi obnoxium. *Aph.* III. 20.

LETHARGVS.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Aetas virilis. *Aph.* III. 30.

Tempus hiemale. *Aph.* III. 23.

NOTAE COMITANTES.

Qui lethargo, aut veterino conflantur, ex manibus tremunt, somnolenti sunt, male colorati, tumidi, pulsus habent tardos, & lentos, ac oculorum genas inferiores sublatas, sudores superveniunt, alvique subtumescunt, impotentes sunt, ac biliosa effundunt. Quod si resiccatae fuerint, urinae alvique recrementa clam prodeunt, urinae quales in veterino genere redduntur, neque potum, neque aliud quidquam postulant. Mentis vero compotes facti, de cervicis

dolore conqueruntur, ac incertos sonitus per aures impetu ferri sentiunt. *Coac.* 139.

Tussis oboritur, & salivam spuit multam, ac liquidam, & nugas garrit, & ubi nugari desierit, dormit: & recrementum male olens egerit. *De Morb. II. LXIII. 1. ad 6.*

AD PROGNOSIN.

Qui ex lethargo evadunt, magna ex parte pus intro colligunt. *Coac.* 140.

In 7. diebus moritur, si vero hos effugerit, sanus evadit. *De Morb. II. LXIII. 12.*

AD THERAPIAM.

Huic aquam demacerata in ipsa farina crassa bibendam dato, & vinum album vinosum bibendum, & ptisanæ succum sorbendum. Verum huic mali punici succum admisceto; & viâosum album insuper bibat, & ne lavet. *De Morb. II. LXIII. 7. ad 11.*

LEVCOPHLEGMATATA. PITVITA ALBA.

AD DIAGNOSIN.

NOTAE COMITANTES.

Intumescit totum corpus albo tumore, & venter ad contactum crassus est, & pedes ac femora tument, tibiae item, ac scrotum, ac acervatim respirat, & facies rubicunda est, & os siccum, & sitis tenet, & ubi cibum accepit, spiritus frequens incumbit. Hic eadem die quandoque melius habet, quandoque peius. *De Morb. II. LXIX. 1. ad 10.*

AD PROGNOSIN.

Leucophlegmatinae hydrops supervenit. *Aph. VII. 74.*

Si a leucophlegmatia detento vehemens diarrhoea superveniat, morbum solvit. *Aph. VII. 29. Coac.* 432.

Leucophlegmatico si venter sua sponte turbatus fuerit in principio morbi, proximus sanitati est. *De Morb. II. LXIX. 11.*

Animi abiectiones cum silentio, & ab hominibus solitudines, fere eos conficiunt. *Coac.* 482.

AD THERAPIAM.

Si venter sua sponte non turbetur, medicamentum deorsum purgans dato, a quo aqua purgetur. Et calida non lavet, & sub die exponatur; & scrotum, ubi impletum fuerit, secato, &c. *De Morb. II. LXIX*
12. & *seqq.*

LICHENES, *vid.* IMPETIGO.

LIEN.

AD DIAGNOSIN

Tempus autumnale infestum. *Aph. III. 22.*

In febribus longis, parvis, vagis, tenuium urinarum mictiones, lienis affectionem denunciant. *Coac.* 594.

Caput & lien maxime sunt morbis obnoxia. *De Morb. IV. XIV*

Quibus splen deorsum vergit, pedes & manus, & genua calida sunt; nasus & aures semper frigida. *Epid. VI. II. 71.*

AD PROGNOSIN.

Lienosis dysenteria superveniens, bonum. *Aph. VI. 48.*
Coac. 466.

Qui lienosi a dysenteria corripuntur, his longa superveniente dysenteria, hydrops supervenit, aut intestinorum levitas, & pereunt. *Aph. VI. 43.*

LIENES MAGNI.

AD DIAGNOSIN.

Quibus lienes magni, iis gingivae viciantur, & os graveolet. *Praedict. II. 163.*

Quicumque splenem habent magnum, qui quidem fuerint biliosi, hi mali coloris sunt; malis ulceribus scatent, & ex ore graveolent, & tennes evadunt, & splen durus est, & semper consimili magnitudine, &

cibi non secedunt. Qui vero pituitosi sunt, haec & minus patiuntur, & splen alias maior, alias minor efficitur. *De Affect. XXI. 1. ad 11.*

Quibus lienes magni sunt, neque sanguinis eruptiones contingunt, neque os graveolet, in tibiis ii mala ulcera habent, & nigras cicatrices. *Praedict. II. 164.*

AD PROGNOSIN.

Quibus lien intumescit, iisdem & corpus contabescit. *De Loc in hom.*

In lienis tumore, sanguinem ex dextra nare effluere, malum. *Coac. 327.*

Progressu temporis aliquibus in hydropem morbus degenerat, aliquibus autem splen suppuratur, & usui sani fiunt. *De Affect. XXI. 23. 24.*

AD THERAPIAM.

Splenicis conducit, siquidem impurgati fuerint, & caput, & reliquum corpus purgare. Si vero purgatione non egeant, victus ratio constituenda est, ita ut pituitosis corpus resiccemus ac attenuemus, cibis & potibus, & vomitibus, & exercitiis plurimis, & deambulationibus. Et in vere sursum per veratrum purgentur. Biliosis autem conducit, ut per victum humectantem, alvum & vesicam subducamus, & ut de vena splenitide frequenter sanguinem mittant, & medicamentis urinam cientibus utantur, quae splenem mollire scripta sunt, & ut pro anni tempore bilem purgent. *De Affect. XXI. 12. ad 19.*

LIENTERIA. INTESTINORVM LEVITAS.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Aetas virilis. *Aph. III. 30.*

Tempus autumnale. *Aph. III. 22.*

Dysenteria. *Aph. VII. 76.*

NOTAE COMITANTES.

Qui suppressa alvo, sanguinem ex naribus fundunt, &
una

una cum sanguinis profluvio subinde rigent, iis alvus intestinorum levitate laborat, & obdurescit, aut tenues lumbrici (Ascarides dicti) infestant, aut utrumque. *Coac.* 344.

In hienteria cibi secedunt non putrefacti, liquidi, dolor autem non adest, & corpus attenuatur. *De Affect.* XXV. 1. 4.

AD PROGNOSIN.

In diuturnis intestinorum levitatibus ructus acidus superveniens, qui prius non fuit, signum bonum. *Aph.* VI. 1.

Longis intestinorum levitatibus laborantes, una cum saevissimis ulceribus, intestinorum cruciatu, & dolore, iis solutis intumescunt. His insuper exortus rigor, malo est. *Coac.* 468.

Intestinorum levitates, cum spirandi difficultate, & pectoris morfu, ad tabem tendunt. *Coac.* 469.

AD THERAPIAM.

Quibus alvi sunt hientericæ, eos hieme sursum purgare, malum est. *Aph.* IV. 12.

Hientericum per eadem curato, velut a dysenteria deventos. *De Affect.* XXV. 5.

LINGUA.

AD DIAGNOSIN.

Lingua tremula, instabilem mentem, & a sede constantiae deturbatam, significat. *Coac.* 233. *Praediect.* I. 20.

Si lingua ex improvviso impotens fiat, aut aliqua corporis pars siderata, melancholicum hoc ipsum fit. *Aph.* VII. 40.

Linguae pallidae ex bile, rubrae ex sanguine, nigrae ex atra bile, valde resiccatae ex succensa fuligine, & utero, albae vero ex pituita. *Epid.* VI.

In pulmonis inflammationibus, si lingua tota alba fiat, ac aspera, ambae pulmonis partes inflammatione ve-

xantur; quibus vero dimidiata, lingua, qua parte id apparet, inflammatio affligit. *Coac.* 400.

AD PROGNOSIN.

NOTAE IUDICATIONIS.

Linguae bifulcum, velut saliva alba obductum, febris remissionem indicat, eo quidem, quod agnatum est, crasso existente, eodem die: si vero tenuius fuerit, postridie; perendie quoque, si adhuc tenuius fuerit. Eadem etiam significatio est, si haec circa summam linguam contingant, minus tamen firma. *Coac.* 230.

Quibus in morbo laterali, lingua circa initia biliosa est, hi intra 7. diem iudicantur: quibus vero 3. vel 4. die, circa nonum. *Coac.* 383.

Lingua admodum nigrescens, 14. die iudicationem promittit. *Coac.* 229.

Lingua in principio nigrescens, citius morbum finit, quam posterius nigrescens. *De Morb. III. XVI* 15. 16.

NOTAE PERICULI.

Periculi plena est lingua nigra, & ex virore pallescens. *Coac.* 229.

Linguae resolutio, ac torpor, cum gravi surditate, & manuum tremore. *Coac.* 197.

Lingua tremula, cum narium rubore, & alvo humecta, si reliqua, quae sunt circa pulmonem, nullam iudicationis significationem praeferant, malo est, ac celeres perniciosas purgationes denunciat. *Coac.* 231.

NOTAE LETHALES.

Lingua citra initia quidem horrida, in eodem vero colore perseverans, procedente vero tempore ubi exasperatur, livescit, finitur, mortem denunciat. *Coac.* 229.

Linguae tremulae quibusdam etiam alvum humectam nonnumquam reddunt. In his autem si nigricent, etiam mortem denunciant, &c. *Coac.* 233.

NO-

NOTAE ALIUS MORBI FUTURI.

ALVI FLUXVS.

Lingua tremula nonnullis prorupturae alvi significacionem praebet. *Coac.* 645.

MENTIS EMOTIONIS.

Linguae revulsio, cum desipientia, voce stridula, & tremore. *Coac.* 99.

PHRENITIDIS.

Linguae densae, & peraridae, phrenitidem portendunt. *Coac.* 434. *Praedict.* I. 3.

VOMITVS NIGRI.

Lingua praeter rationem mollis reddita, ac nauseabunda, cum sudore frigido, ab alvo liquida. *Coac.* 232.

LIPOTHYMIA. ANIMI DEFECTIO. DELIQUIVM.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Calidum. *Aph.* V. 16.

Tumoris intus ruptio. *Aph.* VII. 8.

AD PROGNOSIN.

Si fluxui muliebri convulsio, & animi deliquium superveniat, malum. *Aph.* V. 56.

Qui saepe & vehementer, absque manifesta causa, animo liquantur, ex improvise moriuntur. *Aph.* II. 41.

LIPPITVDO, *vid.* OPHTHALMIA.

LIVORES.

Si suspensae utrinque pulmonis partes *Aortae* distae, tanta inflammatione tententur, ut ad latus adhaereant, illa corporis parte resolutionem sentiunt, & ad costam livores fiunt, quos veteres *ictos*, aut *fidere percussos* vocabant. *Coac.* 400.

Ex osse aegrotante caro livida, malum. *Aph.* VII. 2.

Vbi livores in febre fiunt, prope adfore mors significatur. *Coac.* 66.

LOCHIA. PURGAMENTA MULIEBRIA.

AD PROGNOSIN.

MALA, & ex partu lethalia.

Quae ex partu, & abortu, copiosa celeriter cum impetu feruntur, si subsistant, molestiam exhibent. Huiusmodi mulieribus rigor inimicus est, & alvi perturbatio, praecipue vero, si praecordiorum dolore vexentur. *Coac. 516.*

Quibus ex muliebribus purgamentis, dolores intensi ad superiorem ventris partem, & tenuius intestinum excitati, alvos humectant, & levem anxietatem inducunt, his ad iudicationem, in somnum propensiones fiunt, & impotentes ex capitis dolore, cum tenuibus sudoribus, & perfrigerationibus vexantur. Huiusmodi recidivae, plurimis post remissionem obortae, celeriter interimunt. *Coac. 518.*

Ventris dolor a partu, in his purulenta expurgat. *Coac. 520.*

Praegnantibus sanguinolenta, post partum molestias ex albis mordacibus denunciant. Purgationes huiusmodi duritiem adferunt. In his singultus malo est, & uterorum procidentia, quae & una interficit. *Coac. 526.*

Quibus a partu alba prodeunt, & his subsistentibus succidas, cum febre, & lateris dolor acutus excitatur, eae in vehementem, & perniciosam mentis emotionem incidunt. *Coac. 525. Praedict. I. 80.*

LUMBORVM DOLOR.

AD DIAGNOSIN.

Tempus hyemale obnoxium. *Aph. III. 23.*

AD PROGNOSIN.

DETERIORIS NOTAE.

Ex recursione doloris in lumbis, oculorum perversio, aut distortio, mala est. *Coac. 314. Praedict. I. 69.*

Qui lumborum dolore confligantur, ii male habent. Num

Num his tremores sunt, & maculae rubentes, quales in tibiis, cum rigore? *Coac.* 318.

Lumborum dolor, cum aestu implacido, & anxio, malum significat. *Coac.* 323.

Lumborum dolor absque causa manifesta crebro invadens, morbi malignitatem indicat. *Coac.* 322.

Quae ex dorsi dolore initia ducunt aegritudines, difficiles. *Coac.* 309.

Intensus lumborum dolor, cum copiosiore ventris subductione, & vomitibus parvis, crebris, biliosis, finceris. *Coac.* 560.

Post lumborum dolorem, aut desipientiam, biliosae dejectiones, cum spumosa efflorescentia. *Coac.* 607.

LETHALIS.

Lumborum atque inferiorum partium dolores, quibus febris etiam accedit, si relictis inferioribus septum transversum appetant, tum vero praesertim exitio sunt, si aliquod periculosum signum accesserit. *Coac.* 108.

Lumborum ac tenuioris intestini diurni dolores, & circum praecordia labores, in aegris una cum febre cibum fastidientibus, eos dolor intensus ad caput progressus, non sine convulsionis specie, celeriter interficit. *Coac.* 317. *Praedict.* I. 100.

Lumborum dolores ad os ventriculi recursantes, cum febre, horrore, si tenuia & aquosa vomitione reiecerint, delirarint, voce defecti sint, ii post nigrorum vomitionem moriuntur. *Coac.* 316.

NOTAE ALIUS MORBI FVTVRI.

ALVI FLVXVS.

Lumborum dolor, cum horrore frequenti, & incontinenti corporis iactatione, cum lassitudinis sensu *Coac.* 19.

In praecordiorum dolore, cum aliquo murmure, succedens lumborum dolor in febribus, nisi flatus eruperit, aut urinae copia prodierit. *Coac.* 291.

FLV.

FLVXVS HAEMORRHOIDVM.

Lumborum dolores sanguinis profluvium excitant. *Coac.* 306. 307.

Dolentibus lumbis, si oris ventriculi dolor accesserit, futurae per haemorrhoidas vacuationis signum est; aut etiam eam praecessisse significat. *Coac.* 312. *Praedict. I.* 130.

Quibus lumborum dolor in caput, & manus recur-
sat, & torpore affecti, oris ventriculi dolorem sen-
tiunt, tenuibus ac serosis humoribus abundant, ii
liberaliter sanguinem profundunt. At vero his cum
mentis perturbatione alvus effunditur. *Praedict. I.*
139. *Coac.* 308.

Diurni lumborum dolores, qui cum febre, ad tertiana-
e naturam propius accedente, ingravescent, san-
guinis grumosi secessuri spem faciunt. *Coac.* 305.

SECESSVS NIGRI.

Considerandum est in lumborum dolore conflictatis, &
anxietate citra vomitum, & paulisper ferociter desi-
pientibus aegris, num nigra per secessum proditura
sint? *Coac.* 319.

CONVULSIONIS.

Lumborum, & capitis, ac oris ventriculi dolor, cum
forti excreatione, convulsionem suspectam facit.
Praedict. I. 106. *Coac.* 320.

Quae ex lumbis in cervicem & caput redundantia, le-
vis siderationis more, resolutionis sensum inducunt,
convulsionem ac mentis emotionem minantur; &c.
Coac. 313. *Praedict. I.* 118.

HYDROPIIS SICCI.

Supra umbilicum labor, ac lumborum dolor, qui re-
mediis non cedit, in hydropem siccum desinit. *Coac.*
304. *Aph. IV.* 11.

ICTERI.

Qui lumborum, & lateris dolore, absque ulla occasio-
ne tentantur, ii in morbum regium incidunt. *Coac.*
325.

PHRE-

PHRENITIDIS.

Inter initia sopor, dein capitis, lumborum, cervicis, praecordiorum dolor, & insomnia. *Coac.* 179.

SVPPVRATIONIS.

Lumborum dolores, cum febre, si relictis inferioribus septum transversum appetant, & reliquorum signorum nullum periculum ostenderit. *Coac.* 108.

Lumborum contentio ex mensium copia, quin & varie prodeuntia, glutinosa, graveolentia, strangulatum inducentia, &c. *Coac.* 324.

AD THERAPIAM.

Non febricitantibus si fiat tormen, & genuum gravitas, & lumborum dolor, deorsum purgante opus esse, indicat. *Aph.* IV 20.

In intenso lumborum dolore, & alvi subductione largiore, sumpto veratro, spumosoformis crebra vomitio prodest. *Coac.* 310.

LUMBORVM FRIGIDITAS ET GRAVITAS.

Si per sanitatem, hyemis tempore, lumborum frigiditas, & gravitas, levi ex occasione orta sit, & alvi suppressio, superiore ventre probe officio suo fungente, coxendicum, vel renum dolor, aut urinae stillatio, forte expectanda est. *Coac.* 487.

LUMBRICI TERETES ET ASCARIDES.**AD DIAGNOSIN.**

Aetas puerilis ipsis obnoxia. *Aph.* III. 26.

Qui suppressa alvo sanguinem ex naribus fundunt, & una cum sanguinis profluvio subinde trigent, iis alvus intestinorum levitate laborat, & obdurefcit, aut tenues lumbrici (Ascarides dicti) infestant, aut utrumque. *Coac.* 344.

AD PROGNOSIN.

Lumbricos rotundos cum alvi excretionem prodire, morbo

bo in indicationem tendente , expedit. *Prænot. 62.
Coac. 601. de Indicat. 5.*

Lumbricis vero tenuibus , & longis (qui Ascarides dicuntur) in capitis dolore vexatis , conſequentē ſurditate , & ſopore , tubercula ad aures excitantur. *Coac. 165.*

LUMBRICI LATI.

AD DIAGNOSIN.

Etiam in foetu uterino naſcuntur. *De Morb. IV. XXVII. 2.*

NOTAE COMITANTES.

Velut cucumeris ſemen interdum alvo redditum. *De Morb. IV. XXVII. 39.*

In ieiuno dolor ad hepar moleſtus , cum ſputo interdum multo. *Ibid. 40.*

In quibusdam vocis interceptio , cum ſputis ex ore multis , tormine ventriculi , vel etiam dolore ad dorſum. *Ibid.*

LVXATIO, vid. Oſſa.

MALIGNITAS.

AD DIAGNOSIN.

VARIAE NOTAE.

Qui ſubinde inhorreſcunt , ex capite laborantes , teniter exſudantes , ii maligne habent. *Coac. 12.*

Quaecunque feбри ex adverſo reſpondent , niſi abſceſſum faciant , malignitatem denunciant. *Coac. 145.*

Rigores cum ſopore , nonnihil periculi denunciant ; & facies incenſa cum ſudore , malignitatem in his ſignificat. *Coac. 7.*

Rigores multi , cum torpore , malignum quiddam denunciant. *Coac. 14.*

Lumborum dolor , abſque cauſa manifeſta crebro invadens , malignus. *Coac. 322.*

In febre convulſio , manuumque ac pedum dolores ,

ma-

malignum quiddam praenunciant; item femoris, genuum, surarum dolores, ac mentis caecotio, praecipue si sublime quid in urina innatet. *Coac.* 30.

MAMMAE.

AD DIAGNOSIN.

Si mulier, quae nec praegnans est, nec peperit, lac habeat, ei menstrua defecerunt. *Aph. V.* 39.

Mulieri in utero gerenti, si multum lactis ex mammis fluxerit, infirmum foetum significat. Si vero solidae fuerint mammae, saniozem foetum significat. *Aph. V.* 52.

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Mammae turgidae, & magnae, in mulieribus, probantur. *Praedict. II.* 130.

Quaecunque mammarum dolore ex febribus vexantur, eas sanguinis concreti sputio non foeculenta, dolore liberat. *Coac.* 553.

DETERIORIS NOTAE.

Mulieri in utero gerenti, si mammae ex improviseo graciles fiant, abortit. *Aph. V.* 37. 53.

Mulieri in utero gerenti, si altera mamma gracilis fiat gemellos gestanti, alterutrum abortit. Et siquidem dextra gracilis fiat, marem: si vero sinistra, feminam. *Aph. V.* 38.

Quae perditurae sunt foetus, his mammae graciles fiunt. Si vero rursus durae fiant, dolor erit, aut in mammis, aut in coxis, aut in oculis, aut in genibus, & non perdunt. *Aph. V.* 53.

Mulieribus, quibus in mammis sanguis convertitur, insaniam significat. *Aph. V.* 40.

Quae puellae erectae cervicis spiratione vexantur, his uterum ferentibus, mammae plus colligunt &c. *Coac.* 549.

CONF. ABORTVS, CONCEPTIO, FOETVS, GRAVIDITAS,

MA-

MANIA . DEMENTIA . INSANIA .

AD DIAGNOSIN .

CAUSAE ANTECEDENTES.

Tempus vernale , & autumnale . *Aph. III. 20. 22.*

Tumores ulcerum in parte antica . repente disparentes . *Aph. V. 65.*

Hamorum decubitus in morbis melancholicis . *Aph. VI. 56*

NOTAE ANTECEDENTES.

Aures obtusae in acuta febre . *Coac. 196.*

Dentium collisio aut stridor , praeter consuetudinem a teneris contractam . *Coac. 235.*

Qui capitis dolore , siti , levi pervigilio detinentur , obscure loquuntur , ad motum impotentes , humefcente alvo lassitudine vexantur ; in iis fortasse insania metuenda est . *Coac. 175. 642.*

Quibus faciei incendium , & intensus rubor solvitur , & graveolens est alvi egestio , redundans , & subrubra , in his insaniae metus est . *Coac. 624.*

Intestinorum difficultate laborantibus , aliquantulum rubrae , limosae , & copiosae deiectiones , in flammeo colore , & prae rubro perfusus , selutae , insaniam suspexam faciunt . *Coac. 465.*

Si oculi crebro moveantur , insania exspectanda est . *Praenot. 31.*

Mulieribus , quibus in mammas sanguis convertitur , insaniam significat . *Aph. V. 40.*

Vbi post vomitum anxiosum vox stridula est , oculi squalidi , & pulvere obstiti , insania portenditur , &c . *Praedict. I. 17. Coac. 551.*

Vomitus virulenti , & aeruginosi , cum capitis dolore , surditate , & insomnia , promptam insaniam significant . *Praedict. I. 10. Coac. 169.*

AD PROGNOSIN .

MELIORIS NOTAE.

Febres acutas cum mentis perturbatione , in oris ventriculi dolore , non bilioso , insania solvit . *Coac. 550.*

In-

Insania magnum morbum , invadendi consuetudine iam familiarem solvit . *De Indicat.* 68.

Insanientibus , si varices , aut haemorrhoides supervenerint , insaniae solutio fit . *Aph.* VI. 21.

Ab insania dysenteria , aut hydrops , aut mentis emotio , bonum . *Aph.* VII. 5.

Ex insania , in raucedinem cum tussi fit secessio . *Coac.* 484.

Qui insania corripuntur , aut per se à morbis liberantur , iis dolor ad pedes , aut pectus subiens , aut vehemens tussis oborta , insaniam solvit , &c. *De Indic.* 65.

DETERIORIS NOTAE.

Vehementes mentis amotiones silentes , absque quiete , oculis quoquoersum intuentes , spiritum efflantes , perniciem minantur , diurnas vero faciunt partium resolutiones . Quin etiam vehementer insaniunt hoc modo affecti . Quibus autem cum ventris perturbatione huiusmodi affectus ingravescent , iis nigra per alvum ad indicationem prodeunt . *Coac.* 486.

LETHALIS.

Dentium collisio , aut stridor , praeter consuetudinem a teneris contractam , insaniam , aut mortem denunciat . Quod si iam deliranti istud accadat , prorsus exitiale est . Quin & dentes resiccari , perniciem denotat . *Coac.* 235.

In vehementi & furiosa mentis emotione , accedentes tremores , exitio sunt . *Coac.* 93.

Insania vehemens , cum vocis defectione , post vomitum , &c. *Coac.* 561.

Qui in rabiem actus fuerit intrepide , & non agnoscit , neque audit , neque intelligit , iam moribundus est . *Aph.* VIII. 16.

AMAVROSIN PORTENDENS.

Insanientibus accedens convulsio , oculorum aciem re-
tundit . *Coac.* 485.

Si infania solvatur , absque dolore ad pedes , vel ad pectus , aut tussi vehementi , caecitas sequitur. *De Indicat.* 65.

CONVULSIONES.

Quae sensum ferores sunt mentis emotiones , in ferinas evadunt , & convulsiones portendunt. *Coac.* 155. 85. *Predict.* I 26.

CONF. DELIRIVM. PHRENITIS.

MANVS.

AD DIAGNOSIN.

Ex manibus tremunt lethargici , &c. *Coac.* 139.

AD PROGNOSIN.

In febre , manuum ac pedum dolores , malignum quidam praenunciant. *Coac.* 30.

Manuum ac pedum tumores , cum rubore , perniciem denunciant. *Coac.* 63.

MANVVM LATIO, vid. GESTVS.

MAXILLAE.

AD DIAGNOSIN.

Lassatis per febres , ad articulos , & circa maxillas maxime , abscessus fiunt. *Aph.* IV. 31.

Maxilla raro excidit , luxatur tamen plerumque hiando. *De Artic.*

AD PROGNOSIN.

In vehementibus circa maxillas doloribus , periculum est , ut os fluctuet. *Coac.* 239.

Cervix dura cum dolore , & maxillarum connexio , ac iugularium venarum palpitatio vehemens , cum tendinum distensione , perniciem minantur. *Coac.* 251.

In nervorum distentionibus , & iis , quae in posteriorem partem fiunt , dissolutae maxillae mortem adferunt. *Coac.* 361.

ME.

MEDICAMENTA.

Ad extremos morbos, extrema remedia exquirite optima. *Aph. I. 5.*

In morbis levibus non oportet medicamenta valida adhibere. *Loc. in bom. LV. 7.*

Medicamentorum vehementium pleraque stomachum exulcerant. *De Superfoet. XVII. 11.*

Quae medicamenta non sanant, ea ferrum sanat. Quae ferrum non sanat, ea ignis sanat. Quae vero ignis non sanat, insanabilia existimare oportet. *Apher. VIII. 6.*

MEDICINA.

Est additio & subtractio: subtractio quidem superfluum, additio vero deficientium. *De Flat. III.*

MEDICI.

Nomine quidem multi, reipsa vero perpauci. *In Leg.* In Medico esse debet pecuniae contemptus, pudor, modestia in vestitu, iudicium, lenitas, urbanitas, mundities, recta elocutio, superstitionis averratio, & praestantia summa. *De decenti hab.*

Nihil temere affirmandum, nihil contemnendum. *Epid. VI. II. 46.*

MEDULLA SPINALIS.

Vbi resiccatur, dolor caput occupat, cervicem, lumbos, musculosque lumbares, & crurum articulos, ita ut flectere nequeat, alvus sistitur, & urina non nisi aegre redditur. *De Intr. Affect. XIV. 1. ad 7.*

Eius laesionem sequitur impotentia crurum, stupor, alvi & urinae retentio, tandem mistio, & alvi solutio involuntaria, nec longo post intervallo, mors. *Praedict. II. 92.*

Ipsi frigidum inimicum. *Aph. V. 18.*

MEL.

Calidum & siccum est, ubi sincerum assumitur; cum aqua vero humectat, & biliosis aivum movet; pituitosis autem sistit. *De Diet. II. XXIII. 19.*

MELANCHOLIA.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Tempus vernale, & autumnale. *Aph. III. 20. 22.*

Autumnus aquilonius, & siccus. *Aph. III. 14.*

NOTAE COMITANTES.

Si metus, & tristitia multo tempore perseverent, melancholicum hoc ipsum. *Aph. VI. 23.*

Si lingua ex improvviso impotens fiat, aut aliqua corporis pars siderata, melancholicum hoc ipsum fit. *Aph. VII. 40.*

Quae sensim feroces fiunt mentis emotiones, in vehementes & melancholicas evadunt. *Praedict. I. 123.*

AD PROGNOSIN.

Melancholicis, & nephriticis, haemorrhoides supervenientes, bonum. *Aph. VI. 11.*

Quibus melancholico modo mente motis, tremores accedunt, malignum hoc est. *Praedict. I. 14.*

Morbis melancholicis ad haec periculosi sunt humorum decubitus, aut corporis siderationem, aut convulsionem, aut insaniam, aut caecitatem significant. *Aph. VI. 56.*

AD THERAPIAM.

Melancholicos uberius deorsum purgabis. Eadem ratione contraria adhibens. *Aph. IV. 9.*

MENS. ANIMVS.

AD DIAGNOSIN.

Lingua tremula, mentis instabilis signum. *Praedict. I. 20. Coac. 233.*

Qui.

Quicumque aliqua corporis parte dolentes, dolorem sentire non sentiunt, his mens aegrotat. *Aph. II. 6.*

AD PROGNOSIN.

In omni morbo mente valere, & bene se habere ad ea, quae offeruntur, bonum est: contrarium vero malum. *Aph. II. 33.*

Qui perniciose habent, iis mens obtorpescit. *Coac. 488.*
CONF. DELIRIUM, MANIA, PHRENITIS.

MENSTRA.

AD DIAGNOSIN.

VARIAE NOTAE.

Optimum est, menstrua singulis mensibus, & ratis diebus, satis idonea, & aequali copia, bonique coloris, prodire. *Praedict. II. 131.*

In gravidis cessant. *Aph. V. 61.*

NOTAE ERUPTIONIS FUTURAE.

Horrore subinde tentatis, lassitudine, & capitis gravitate constitatis, muliebres purgationes erumpunt. *Coac. 541.*

Horroris & lassitudinis sensus, capitis gravitas, cum cervicis dolore, muliebres purgationes deliciunt. *Coac. 548.*

Ex rigore febris, cum lassitudinis sensu. *Coac. 555.*

Quae caput concutiant, & aurium sonitus excitant, praesertim si ad spinam ardor consequatur. *Coac. 167. Praedict. I. 143.*

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Quaedam affectiones feminis solvuntur, circa menstruorum eruptiones. *Aph. III. 28.*

Mulieri sanguinem evomenti, mensruis erumpentibus, solutio fit. *Aph. V. 32.*

In muliere mensium profluvium a febribus vindicat, si die critico contingat. *Coac. 152.*

Convulsionem muliebria, si circa initia appareant, neque febris accesserit, solvunt. *Coac.* 531.

Oculorum caligines, crebris apparentibus mensibus, solvuntur. *Coac.* 552.

DETERIORIS NOTAE.

Quae affectiones feminis non solutae fuerint, circa menstruorum eruptiones, perseverare solent. *Aph.* III. 28.

Si mulieri in utero gerenti purgationes prodeant, fetum sanum esse impossibile. *Aph.* V. 60.

Si fluxui muliebri convulsio, & animi deliquium superveniat, malum. *Aph.* V. 56.

In puellis orthopnoicis, uterum ferentibus, muliebria purgamenta circa initia apparere, malum. *Coac.* 549.

MENSTRA RETENTA.

AD DIAGNOSIN.

Si mulier, quae nec praegnans est, nec peperit, lae habeat, ei menstrua defecerunt. *Aph.* V. 39.

Quum menses fuerint occultati, dolor habebit imum ventrem, & onus quoddam incumbere videtur, & lumbos, & laterum mollitudinem mirum in modum dolet. *De Morb. Mul. I. X. 1. 3.*

AD PROGNOSIN.

Mensibus non prodeuntibus, ab utero fiunt morbi. *Aph.* V. 57.

Mulier non laborat podagra, nisi menses ipsi defecerint. *Aph.* VI. 29.

Mulieri menstruis deficientibus, e naribus sanguinem fluere, bonum. *Aph.* V. 33.

AD THERAPIAM.

Primum ventrem purgare oportet sursum ac deorsum. Deinde uti subditio medicamento, a quo sanguis purgetur, Atque ita quiescere, & potandum dare pharmacum, a quo sanguis prodeat; item crethmum in vino caedaceo. *De Morb. Mul. I. X. 5. ad 8.*

Suf-

Suffitus aromatum muliebria ducit. *Aph. V. 28.*

MENSTRVA IMMODICA.

AD PROGNOSIN.

Mensibus copiosioribus prodeuntibus, morbi contingunt. *Aph. V. 57.*

Lumborum contentio ex mensum copia suppurationem fore indicat. Quin & varie prodeuntia, glutinosa, graveolentia, strangulatum cum antea commemoratis inducentia, suppurationem denunciant. Fortassis vero & tales aliquantum delirare contingit. *Coac. 324.*

Quae ad manus contactum torpescunt, peraridae, sitis expertes, muliebria multa profundentes, pus intro colligunt. *Coac. 542.*

AD THERAPIAM.

Mulieri menstrua si velis cohibere, cucurbitam quam maximam ad mammas adpone. *Aph. V. 50.*

MENSTRVA VITIATA.

AD PROGNOSIN.

Quibus, in tumorem sublato ventre, pudendum rubor occupavit, muliebribus purgamentis albis, humidis, subito prodeuntibus, diuturnis febribus intereunt. *Coac. 530.*

AD THERAPIAM.

Mulieri menses decolores, neque secundum eadem (tempus & modum) semper prodeuntes, purgatione opus esse, significant. *Aph. V. 36.*

METVS.

Si metus & tristitia multo tempore perseverent, melancholicum hoc ipsum. *Aph. VI. 23.*

Ex perfrigeratione metus, ac animi abiectio praeter occasionem, in convulsionem tendit. *Coac. 4.*

CONF. PAVORES.

MICTIO.**AD DIAGNOSIN.**

Mictio noctu multa contingens, parvam deiectionem significat. *Aph. IV. 83.*

Qui plus mingunt, quam egerunt, pro ratione habitiores sunt. *De Dentit. II. 8.*

Qui non pro ratione mingunt, verum alvus frequenter cruda, a pueris egressit, morbofi sunt. *Ibid. 9*

Ex tremoribus, &c. somnus multus, convulsionem minatur; & frontis gravitates, ac mictio molesta est, *Coac. 348.*

AD PROGNOSIN.

Quibus incogitantibus urina decidit ad pudendum, desperati exsolvuntur. *Coac. 474.*

MICTIO CRUENTA.**AD DIAGNOSIN.**

Qui sponte sanguinem mingunt, his a renibus venae ruptionem significat. *Aph. IV. 78.*

Si quis sanguinem mingat, & grumos, & urinae stillitidum habeat, & dolor incidat ad inum ventrem, & interfemineum, partes circa vesicam laborant. *Aph. IV. 80. VII. 39.*

Si quis sanguinem, aut pus mingat, renum aut vesicae exulcerationem significat. *Aph. IV. 75.*

Si quis sanguinem, & pus mingat, & squamas, & odor gravis sit, vesicae exulcerationem significat. *Aph. IV. 81.*

AD PROGNOSIN.**NOTAE MORBI LONGIORIS.**

Urina cruenta circa initia, morbi diuturnitatem significat. *Coac. 582.*

NOTAE LETHALES.

In dorsi, ac pectoris dolore, cruentae mictionis suppressio, laboriosum exitum adfert. *Coac. 272.*

In laterum doloribus, urina cruenta, obscura, cum eo, quod subsidet, vario, & indiscreto, utplurimum in 14. diebus mortem adfert. *Coac. 381.*

Virium exsolutiones ex rigore, cum capitis dolore, perniciem denunciant. Cruentae in his urinae, male sunt. *Coac. 22. 23.*

MORBVS IN GENERE.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Anni tempora. *Aph. III. 19.*

Mutationes anni temporum, & in ipsis temporibus magnae mutationes, aut frigoris, aut caloris, & alia pro ratione eodem modo. *Aph. III. 1.*

Cibus praeter naturam copiosior. *Aph. II. 17.*

Morbi derepente non accidunt hominibus, sed paulatim collecta materia morbifica subito se produnt. *De Diet. I.*

Oriuntur tum a victus ratione, tum a spiritu, cuius inspiratione vivimus. *De Nat. hum. XVIII. 11. 12.*

NOTAE ANTECEDENTES.

Spontaneae lassitudines morbos denunciant. *Aph. II. 5.*

NOTAE PARTIS AFFECTAE.

Qua corporis parte inest calor, aut frigus, ibi morbus est. *Aph. IV. 39.*

Qua corporis parte inest sudor, ibi morbum esse indicat. *Aph. IV. 38.*

Si quid doluerit ante morbum, ibi se figit morbus. *Aph. IV. 33.*

Quibus ex morbo resurgentibus aliquid dolet, ibi abscessus sunt. *Aph. IV. 32.*

AD PROGNOSIN.

VARIAE NOTAE.

In inconstantibus temporibus, si tempestive tempestiva reddantur, constantes, & iudicatu faciles fiunt morbi: in inconstantibus autem inconstantes, & difficiles iudicatu. *Aph. III. 8.*

Urinae, & alvi excrementa, & sudores, cum apparent, vel iudicatu faciles, vel difficiles, vel breves, vel longos morbos fore indicant. *Aph. I. 12.*

Qui ex venis morbus oritur, levior est, quam qui a nervis. *De Loc. in hom.*

Quicumque morbi hieme augeantur, aestate desinere solent; quicumque vero aestate augeantur, hieme finire consueverunt, nisi certo dierum circuitu discedant; quibus autem morbi vere sunt, ad autumnum eorum discessum fore, expectare oportet; quicumque postremum autumnales morbi sunt, eorum discessum necesse est vere fieri. Quicumque vero morbus haec tempora transgressus fuerit, eum annum fore scire oportet. *De Nat. hum. XVII.*

In his, quae per vesicam, & in his, quae per alvum sunt, eggestionibus, & in his quae per carnes, & sicubi alia naturae via corpus exeat: si parum, parvus morbus sit: si multum, magnus: si admodum multum, hoc ipsum lethale. *Aph. VII. 79.*

NOTAE SECVRITATIS.

In morbis minus periclitantur, quorum naturae, & aetati, & habitui, & tempori, magis similis fuerit morbus, quam in quibus horum nulli fuerit similis. *Aph. II. 34. VIII. 1.*

Si in morbo somnus iuvat, non est lethale. *Aph. II. 1.*
Optimum est in morbo, totum corpus aequè calidum, & molle esse. *Coac. 492.*

NOTAE PERICVLI.

Caput, pedes, & manus frigidas esse, ventre & lateribus calentibus, mali morbi signum est. *Coac. 492.*

NOTAE LETHALES.

Quo in morbo somnus laborem facit, lethale. *Aph. II. 1.*
Morbis quibusvis incipientibus, si bilis atra, vel sursum, vel deorsum prodierit, lethale. *Aph. IV. 22.*

Si

Si albi quid, palpebris commissis, subtus appareat, cui id non ex alvi profluvio est, aut ex potione purgante, pravam signum, & valde lethale. *Aph. VI. 52.*

NOTAE RECIDIVAE.

Quae in morbis post crism relinquantur, recidivas facere solent. *Aph. II. 12. Coac. 582.*

AD THERAPIAM.

Duo in morbis praestanda, adiuvere, aut saltem non nocere. *Epid. I.*

Omnia secundum rationem facienti, & non secundum rationem evenientibus, non transeundum ad aliud, manente eo, quod visum est ab initio. *Aph. II. 52.*

MORBVS ACVTVS.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Aetas iuvenilis. *Aph. III. 29.*

Tempus autumnale. *Aph. III. 9.*

Quartanae hybernae. *Coac. 159.*

NOTAE COMITANTES.

Vbi peracutus est morbus, statim extremos habet labores. *Aph. I. 7.*

Quibus biliosae subsidentiae, ab initio vero tenues, acutum morbum significat. *Aph. VII. 32.*

Circa principia & fines omnia sunt debiliora. Circa vires vero vehementiora. *Aph. II. 30.*

AD PROGNOSIN.

VARIAE NOTAE.

Acuti morbi in 14. diebus iudicantur. *Aph. II. 23. Coac. 147.*

Morbi praecipites, & acuti, effluente ex naribus sanguine iudicatione absolvuntur, idque die iudicatorio; ac sudore copioso exorto, urinaque purulenta, ac vitrea affatim reddita, in qua quod subsidit, laudabile sit; aut abscessu effatu digno; & alvo mucosa, &

sanguinea deliciente, ac derepente prorumpente; vomitionibusque non pravis, sub iudicationem contingentibus. *Coac.* 150.

Acutorum morborum non omnino tutae sunt praedictiones, neque mortis, neque sanitatis. *Aph.* II. 19.

NOTAE PERICULI.

In praecipitibus malis, spumans & circumbiliosum alvicrementum, malo est. Malum quoque & exacte candicans. Adhuc vero deterius, farinae molitae instar, & stercorosum. Praeter haec sopor malo est, & cruenta alvi delectio, ac immoderata vasorum inanitio. *Coac.* 662.

Supinum iacere, manibus, cervicé, & cruribus porrectis. *Praenot.* 9. *Coac.* 497.

Pronum ad pedes de lecto delabi. *Praenot.* 10. *Coac.* 497.

Pedes nudos, neque admodum calidos habere, & manus, cervicem, & crura inaequaliter dispersa, & nuda. *Praenot.* 11. *Coac.* 497.

Aegrum residere velle, in ipso morbi impetu, pravam quidem in omnibus morbis acutis, & pulmonum inflammatione laborantibus pessimum. *Praenot.* 14. *Coac.* 497.

Noctu vigilare, interdiu dormire; praesertim post tertiam diei partem. *Coac.* 497.

Pessimum est, si somnus neque noctu, neque interdiu accedit. Id enim ob dolorem, laboremque accedit, vel delirium fore significatur. *Coac.* 497.

In morbis acutis extremarum partium frigus, malum *Aph.* VII. 1.

In acutis affectionibus, quae cum febre sunt, luctuosae respirationes, malae *Aph.* VI. 54.

In praecipitibus malis, oculi observatio, aut perfractio, malo est. *Praedict.* I. 84.

In gravi morbo, sitim temere, ac praeter rationem cessare, malum est. *Coac.* 58.

In praecipitibus malis, tenues circa caput maxime sudores

res oboriri, & corporis incontinentia quadam iacta-
ri, malum indicat. *Coac.* 49.

In praecipitibus & turbulentis morbis obveniens surdi-
tas, malo est. *Coac.* 190.

In praecipitibus morbis periculum denunciat urina bilio-
sa, neque aliquantulum rubra; & quae hordei tosti
non exacte moliti crassioribus frustulis similia habet
sedimenta; alba, & quae colore, ac sedimento va-
riat; praecipueque in iis, quae ex capite fiunt, de-
fluxionibus. *Coac.* 578.

Urinae derepente praeter rationem parum concoctae, vi-
tiosae sunt. Ac in totum, quae in morbo acuto u-
rinae praeter rationem cocta est, vitium denotat. In
his quoque malo est praerubra efflorescentia, contenta
atque aeruginosa. *Coac.* 579.

Urina alba effusa, & perspicua, item quae post potio-
nem celeriter meitur; quae ante rigorem oleosa red-
ditur; quae ex viridi pallefcit, nec in colore per-
sistit. *Coac.* 579.

NOTAE LETHALES.

Quibuscunque, ex morbis acutis, aut ex diuturnis, aut
ex vulneribus, aut aliter quocunque modo extenua-
tis, bilis atra, vel qualis sanguis niger, prodierit,
posttridie moriuntur. *Aph.* IV. 23.

Mulierem in utero gerentem, ab acuto aliquo morbo
corripi, lethale. *Aph.* V. 30.

In praecipitibus morbis murmur edentes, ac tinnientes
aures, mortem praenunciant. *Coac.* 193.

AD THERAPIAM.

RATIO VICTVS.

Vbi peracutus est morbus, statim extremos habet labo-
res, & extreme tenuissimo victu uti necesse est. Vbi
vero non, sed plenius cibare licet, tantum a tenui
recedendum, quantum morbus remissior extremis fue-
rit. *Aph.* I. 7.

Tenuis & exquisitus victus, in acutis, ubi non conve-
nit, periculosus, *Aph.* I. 4.

MIS.

MISSIO SANGVINIS.

In morbis acutis sanguinem detrahes, si vehemens fuerit morbus, & aegri aetate floreat, & viribus valeant. *De Viſſ. acut.*

PVRGATIO.

In acutis affectionibus raro, & in principiis, purgante utendum, atque hoc diligenti prius adhibita cautione faciendum. *Aph. I. 24.*

Purgandum in valde acutis, si turgeat materia, eadem die, morari enim in talibus, malum est. *Aph. IV. 51.*

MORBVS LONGVS, CHRONICVS.**AD DIAGNOSIN.****NOTAE COMITANTES.**

Abcessus in febribus, qui non solvuntur ad primas indicationes, morbi longitudinem significant. *Aph. IV. 51.*

Ex glandularum tumoribus dolores, in febribus. *Coac. 73.*
Mutationes in toto corpore, & si corpus perfrigeretur, aut rursus caleſcat; aut color alius ex alio fiat. *Aph. IV. 40. VII. 60.*

Febricitanti sudor superveniens, febre non remittente, malum; prolongatur enim morbus, & copiosorem humiditatem indicat. *Aph. IV. 56.*

Sudores frigidi, cum febre mitiore. *Aph. IV. 37. Coac. 573.*

Sudores febricitantium, si non fiant diebus criticis. *Aph. IV. 36.*

Vrina cruenta, circa initia reddita. *Coac. 582.*

Quibus febricitantibus, in urinis subsidentiae sunt crassiori farinae similes, longam infirmitatem significant. *Aph. VII. 31.*

AD PROGNOSIN.**NOTAE PERICVLI.**

In morbo diuturno appetitus prostratus, & meracae deiectiones, malum. *Aph. VII. 6.*

Ex morbo diuturno alvi defluxus, malum. *Aph. VIII. 5.*
Sur-

Surditas etiam in longis morbis, malum portendit, ac in his ad coxendices labores convehit. Coac. 190.

NOTAE LETHALES.

Quibus ex morbo diuturno, &c. extenuatis bilis atra, vel qualis sanguis niger prodierit, postridie moriuntur. Aph. IV. 23.

Diuturnis in morbis, parvae apparentes sanguinis ex naribus fluxiones, perniciem ostendant. Coac. 340.

In diuturnis morbis suppurati ad aures tumores, nisi pus admodum album, ac sine odore reddant, exitium, praecipueque mulieribus adferunt. Coac. 206.

NOTAE CONVULSIONIS FVTVRAE.

Temerarii ventris tumores in morbis longis, convulsiones adferunt. Coac. 36.

AD THERAPIAM.

Tenuis & exquisitus victus, in morbis longis, semper periculosus. Aph. I. 4.

MORBUS NIGER I.

AD DIAGNOSIN.

NOTAE COMITANTES.

Nigrum vomit veluti faecem, quandoque cruentum, quandoque velut vinum secundarium, quandoque velut Polypi atramentum, quandoque acre velut acetum, quandoque salivam & pituitam, quandoque bilem cum virore pallidam. Et ubi quidem nigrum cruentum vomuerit, cadaveris foetorem refert, & fauces & os a vomitu aduruntur, & dentes stupefcunt, & id quod vomitu reiectum est, terram elevat. Et postquam vomuit, paulo melius se habere putat. Et neque sine cibo esse, neque ampliorem cibum ferre potest. Verum ubi sine cibo manet, viscera surgunt, & salivae acidae sunt. Quum vero cibum accepit, gravitas in visceribus est, & pectus ac dorsum

velut stilis pungi videntur, & dolor tenet latera, & febris debilis est, & caput dolet, & oculis non videt, & crura gravantur, & color niger est, & consumitur. *De Morb. II. LXXI. 1. & seqq.*

AD PROGNOSIN.

Vna cum aetate aufugit etiam morbus, & cum corpore senescit. Si vero denigratus fuerit, commoritur.

Ibid. 40. 41.

AD THERAPIAM.

Pharmacum bibendum dare frequenter, & pro anni tempore, & serum, & lac. A cibis abstinere dulcibus, & oleosis, ac pinguibus, & frigidissimis, ac maxime per alvum subeuntibus uti. Caput purgare, & post medicamentorum poriones sursum purgantes, de manibus sanguinem detrahare, si non fuerit debilis. Si alvus non egerat, molle infusum per clysterem immittere, &c. *Ibid. 25. & seqq.*

MORBUS NIGER II.

AD DIAGNOSIN.

NOTAE COMITANTES.

Subfulvus & gracilis, & oculis, cum virore pallidis fit, & tenuem cutem habet, ac debilis est. Quanto autem tempus amplius progreditur, tanto morbus amplius affligit. Et vomit omni tempore velut stillementum modicum, ad duorum poculorum parvorum mensuram, & frequenter etiam cibum, ac una cum cibo bilem, & pituitam. Et post vomitum dolet totum corpus, aliquando etiam, antequam vomat. Et horrores tenues, ac febris tenet, & ad dulcia, ac oleosa maxime vomit, *De Morb. II. LXXII. 1. & seqq.*

AD PROGNOSIN.

Morbus lethalis quidem est, non autem consenscit.

Ibid. 23.

AD THERAPIAM.

Medicamentis sursum ac deorsum purgare, & lac asinum

num postea bibendum dare . Cibus uti mollissimis , ac frigidis , piscibus litoralibus , & cartilaginei generis , & betis , & cucurbitis , & carnibus tritis . Vinum bibere album , vinosum , aquosius . Labore & deambulatione uti , calida non lavare , & a sole abstinere . *De Morb. II. LXXII. 12. & seqq.*

MORS.

NOTAE simpliciter LETHALES.

Morbis quibusvis incipientibus , si bilis atra vel sursum , vel deorsum prodierit , lethale . *Aph. IV. 22.*
Tenebricosa vertigine laborans , & lucem averfans , & somno ac ardore multo detentus , desperatus . *Aph. VIII. 15.*

Qui suppurati , aut hydropici uruntur , aut secantur , hi pure aut aqua acervatim effluente , omnino moriuntur . *Aph. VI. 27.*

Aures frigidae , pellucidae , contractae , lethales sunt . *Aph. VIII. 14.*

Testis dexter frigidus , & convulsus , lethale . *Aph. VIII. 11.*

NOTAE MORTEM SVBITAM PRAESAGIENTES.

Qui saepe , & vehementer , absque manifesta causa , animo linquantur , ex improvise moriuntur . *Aph. II. 41.*

Qui natura sunt valde crassi , magis subito moriuntur , quam graciles . *Aph. II. 44.*

Oris ventriculi dolor seniori crebro adveniens , repentinam mortem denunciat . *Coac. 236.*

NOTAE MORTIS INSTANTIS.

Labia livida , aut etiam resoluta , & inversa , & frigida , lethalia . *Aph. VIII. 13.*

In febre non intermittente , si labium , aut supercilium , aut oculus , aut nasus pervertatur , si non videat , si non audiat , corpore iam debili existente , quicquid horum fiat , in propinquo mors est . *Aph. IV. 49. VII. 73. Coac. 72.*

Qui

Qui in rabiem actus furit inrepeide, & non agnoscit,
& neque audit, neque intelligit, iam moribundus est.
Aph. VIII. 16.

Merituris signa haec magis sunt manifesta, & ventres
attolluntur, atque inflantur. *Aph. VIII. 17.*

Ungues nigri, & digiti manuum, & pedum frigidi,
contracti, vel remissi, mortem in propinquo esse de-
monstrant, *Aph. VIII. 12.*

MOTVS. EXERCITATIO.

NOTAE VARIAE.

Vbi fames, non oportet laborare. *Aph. II. 16.*

In omni corporis motu, quando dolere coeperit, in-
terquiescere statim lassitudinem curat. *Aph. II. 48.*

Otium humectat, & corpus debilitat, labor vero sic-
cat, & roborat. *De Diet. II.*

Labores cibos praecedant. *Epid. VI. IV. 53.*

Exercitatio sanitatis est, velci citra saturitatem, non
refugere laborem. *Ibid. 41.*

MVLIER, vid. FOEMINA.

MVTATIO.

AD PROGNOSIN.

Frequens coloris cum calore mutatio, bono est. *Coac.*
125.

Celeres summitatum corporis in utraque extrema per-
mutationes, perniciem denunciant. Quin & sitis hu-
iusmodi (hoc est, celeriter in contraria permutata)
malo est. *Coac. 50. Praedict. I. 43.*

Vbi in toto corpore mutationes, & si perfrigeretur,
aut rursus calefiat, aut color alius ex alio fiat, mor-
bi longitudinem significat. *Aph. IV. 40. VII. 60.*

AD THERAPIAM.

Quod paulatim fit, tutum est: tum alias, tum si quis
ex altero ad alterum transeat. *Aph. II. 51.*
Mul.

Multum & derepente mutare, periculofum. *Aph. II. 51.*
In recidivis mutationes profunt. *Epid. VI. VI. 30.*

M V T V S.

NOTAE VARIAE.

Quibus cerebrum concuffum fuerit ab aliqua caufa, ne-
ceffe eft, eos ftatim mutos fieri. *Aph. VII. 58.*

AD PROGNOSIN.

Si quis ebrius ex improvifo mutus fiat, convulfus mo-
ritur, nifi febris corripuerit, aut ubi ad horam,
qua crapulae folvuntur, pervenit, locutus fuerit.
Aph. V. 5

CONF. CAPITIS DOLOR, APOPLEXIA VOCIS
DEFECTIO.

N A R E S.

AD DIAGNOSIN.

Quibus nares natura humidiores, & genitura humidior,
imperfectius fami funt: quibus vero contraria, per-
fectius. *Aph. VI. 2.*

Narium humiditates fenibus infellae. *Aph. III. 31.*

Narium rubores, alvi liquidae, & diffuentis funt in-
dicia *Coac. 215.*

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Quibus ex naribus fluxiones 7. 9. aut 14. die contin-
gunt, ut plurimum a febris vindicant. *Coac. 152.*

DETERIORIS NOTAE.

Lingua tremula, cum narium rubore, & alvo humecta,
Coac. 231.

NOTAE LETHALES.

Nafus ftillans, cum vomitionibus exiguis, biliofis, &
pervigilio. *Praedict. I. 79.*

Nafi perversio, in febre non intermittente, corpore
tam debili existente. *Aph. IV. 49. VII. 73.*

N A T U R A .

Natura omnibus subvenit . *De Alim. IV. 1.*

Morborum naturae medici . *Epid. VI. V. 1.*

Non edocta natura , & nulli magistro uia , ea , quibus opus est , facit . *Epid. VI. V. 4. De Alim. VIII. 8.*

Stimulata , & impulsæ , artis peritis , quæ faciendæ sunt , demonstrat . *De Arte XXII. 1.*

Naturarum aliae quidem ad æstatem , aliae vero ad hiemem , bene aut male sunt constitutæ . *Aph. III. 2.*

N E P H R I T I S .

AD DIAGNOSIN .

CAUSAE , & NOTAE ANTECEDENTES .

Ætas senilis . *Aph. III. 31.*

Per sanitatem , hiemis tempore , lumborum frigiditas & gravitas , & alvi suppressio , &c. *Coac. 487.*

Renum dolor forte expectandus , si per sanitatem hiemis tempore , lumborum frigiditas & gravitas , levi ex occasione orta sit , cum alvi suppressione . *Coac. 487.*

NOTAE COMITANTES .

Quibus in urinis bullae superstant , renum affectiones significant , & longam fore invaletudinem . *Aph. VII. 34.*

Quibus pingue est , & confertum , quod supernatat , his affectiones nephriticas , & acutas significat . *Aph. VII. 35.*

Derepente obortus renum dolor , cum urinae suppressione , calculorum , aut urinae crassæ missionem indicat . *Coac. 589.*

Si quis sanguinem , aut pus mingat , renum aut vesicae exulcerationem significat . *Aph. IV. 75.*

AD PROGNOSIN .

Melancholicis , & nephriticis , haemorrhoides supervenientes , bonum . *Aph. VI. 11.*

Renum & vesicae dolores , difficulter sanantur in senibus . *Aph. VI. 6.*

Qui-

Quibus nephriticis &c. dolores circa musculos spinales sunt, siquidem ad loca exteriora fiant, abscessum expecta futurum extrorsum: si vero dolores fiant magis ad inter a loca, etiam abscessum magis introrsum fore expecta. *Aph. VII. 36.*

Renibus suppuratis, urinae stillicidium supervenit. *Aph. V. 58.*

AD THERAPIAM.

Cum scammoniae succo, aut ipsa radice, fomento prius adhibito, totum corpus purgare. Postera die, duobus congiis succi ciceris albi, sale iniecto, subpurgare. Post haec potibus, & cibis, & balneis curare; & eadem, quae in urinae stillicidio, pharmaca dare. Quum dolor prefferit, multa calida lavare, & tepidatoria parti dolenti adhibere. Quum autem intumuerit, & elevatus fuerit, sub id tempus iuxta renem secare, & extracto pure, arenam per urinam cientibus sanare. *De Int. Affect. XV. 14 ad 19.*

NERVI.

AD DIAGNOSIN.

Nervorum impotentia, a calido frequenter adhibito, *Aph. V. 16.*

AD PROGNOSIN.

Nervus dilectus, neque augetur, neque coalescit. *Aph. VI. 19. VII. 28. Coac. 504.*

Nervi quicunque crassi vulnus accipiunt, ut plurimum claudos reddunt, praecipueque si obliquum vulnus fuerit, ac in musculorum capitibus, praesertim femorum. *Coac. 508.*

AD THERAPIAM.

Frigidum nervis inimicum, calidum vero utile. *Aph. V. 18.*

NERVORVM DISTENTIO, *vid. CONVULSIO.*

NERVORVM RESOLVTIO, *vid. PARALYSIS.*

NIGRORES.

A frigore oriundi. *Aph. V. 17.*

NIMIVM.

Omne multum (nimium) naturae inimicum. *Aph. II. 51.*

NYCTALOPIA.

AD DIAGNOSIN.

Nyctalopiaprehenduntur iuvenes, aut pueri, aut etiam
adolescentes. *Praedict. II. 160.*

Neque mulieres, neque virgines, quibus menses appa-
rent, hoc morbo tentantur. *Ibid.*

Qui ex diuturno lacrimarum fluxu nyctalopes fiunt,
eos interrogare oportet, num quis dolor ante istorum
iudicationem occupaverit. *Ibid.*

AD PROGNOSIN.

Nyctalopes iponte evadunt, partim quidem 40. die,
partim vero 7. mense: quibusdam etiam toto anno
perseverat. Et tempus quidem aestimari debet, &
magnitudinis morbi, & aegri aetatis ratione adhibi-
ta. *Praedict. II. 160.*

Nyctalopas iuvant. supervenientes abscessus, & ad in-
fernas partes tendentes, & qui tamen per iuventutem
non admodum contingunt. *Ibid.*

AD THERAPIAM

Medicamentum bibere deorsum purgans, & caput pur-
gare, & cervicem eius quam maxime scarificare, &
fame ad multum tempus premere. Vbi vero remi-
serit, unum aut duo. fenta, prout maxime devoca-
re potest, de hepate bubulo crudo, in melle mixto,
exhibere. *De Visu IV.*

OBLIVIO, vid. CAPITIS DOLOR, IGNORANTIA,
RIGOR.

OCCASIO celeris, *Aph. I. 1.*

OCVLI.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE NOCENTES.

Aetas senilis. *Aph. III. 31.*

Quotidianae constitutiones aquiloniae. *Aph. III. 17.*

VARIAE NOTAE.

Oculi prout validi fuerint, ita etiam corpus. *Epid. VI. IV. 48.*

Quicumque fulvi, naso acuto, oculis magnis, mali. Quicumque fulvi, simi, oculis magnis, boni. *Epid. II. V. 1. 2.*

Hydropici raves oculos habent, & calvi sunt. *Ibid. 3.*
Caput magnum, oculi parvi, balbi, iracundi sunt. *Epid. VI. VI. 1.*

Caput magnum, oculi nigri & magni, nasum crassum & simum habentes, boni. *Ibid. 5.*

Oculi ravi, magni, caput magnum, cervix tenuis, petora angusta, congrue adaptati hominis sunt. *Ib. 6.*

AD PROGNOSIN.

VARIAE NOTAE.

Oculorum claritas, ac eorum album ex nigro, aut livido clarum fieri, ad iudicationem confert. Ac quo celerius clarescunt, eo celeriore iudicationem; at tardius, tardiore significant. *Coac. 217.*

NOTAE PERICVLI.

Caligine obducti oculi, aut eorum album rubescens, aut livescens, aut nigris venis refertum, nihil probi praesefert. *Coac. 218. Praenot. 4.*

Oculus distortus, malo est. *Coac. 218.*

Oculi hebescentes, & obtusi, concreti ac caligantes, malum portendunt. *Coac. 225. Praedict. I. 46.*

Oculi rubri, a vomitu, *Aph. VII. 3.*

In febre ortus oculorum rubor, diuturnam alvi malignitatem praesefert. *Coac. 219.*

In praecipti malo rectus oculorum obtusus, &c. *Coac. 227.*

Oculi intense splendentes in convulsionibus. *Coac.* 351.
Praedict. I. 124.

Ex recurlatione doloris in lumbis, oculorum perversio, aut distortio, mala est. *Coac.* 314.

NOTAE LETHALES.

Considerare etiam oportet oculorum subtus apparentia in somnis. Si enim albi quid, palpebris commissis, subtus appareat, cui id non ex alvi profluvio est, aut ex potione purgante, pravam signum, & valde lethale. *Aph.* VI. 52. *Praenot.* 5.

Oculos lucem refugere, aut illacrymare, aut perverti, atque ex his alterum minorem esse. *Coac.* 218. *Praen.* 4.

Oculos crebro discicere, gralias ac parvas sordes ipsis adhaerescere, aut albescentem humorem concretum, & tenuem (aegida nominant) habere; aut eorum album augeri, nigrum autem imminui, aut nigrum a superiore palpebra contegi. *Coac.* 218. *Praen.* 4.

Oculorum cavitas, & vehemens oculi foras expressio, ac splendoris elisio, adeo ut pupilla extendi nequeat, & cilia retorta, ac fixi oculi, ac continenter conniventes, coloris immutatio; aut palpebras per somnum non committere. *Coac.* 218. *Praenot.* 4.

Oculi perversio, &c. in febre non intermittente, corpore iam debili existente. *Aph.* IV. 49. VII. 73. *Coac.* 72.

Cum oculorum perversione, febribus, & lassitudinis sensu detento, rigor perniciem minatur. Atque in huiusmodi casibus soporati, malum denunciant. *Coac.* 221.

Quae caput quodammodo concutiunt, cum intensa oculorum rubedine, ac manifesto delirio. *Coac.* 163.

Oculus aurigine suffusus, & caligine obductus, &c. in morbo lateris. *Coac.* 388.

NOTAE ALIUS MORBI FUTURI.

CONVULSIONIS.

Oculorum hebetatio, cum animi defectione, promptam convulsionem denunciat. *Coac.* 226.

Oculorum hebetudo, cum voce eiulabunda. *Coac.* 257.

HAE-

HAEMORRHAGIAE.

Oculi prae rubri, cum capitis dolore, & alto stupore.
Coac. 166.

Oculi prae rubri, cum cervicis dolore. *Prædict.* I. 137.

Oculorum acies perturbata, cum surditate, capitis gravitate, ac praecordiorum contensione. *Coac.* 195.

INSANIAE.

Oculi pulvere obfusi, cum voce stridula, & anxietudine ex vomitu. *Coac.* 561.

Oculorum motus frequentior, cum praecordiorum pulsus, & turbatione. *Coac.* 282.

AD THERAPIAM.

Oculis nocent lens, poma dulcia, & olera. *Epid.* VI.

Oculorum dolores meri potus, aut balneum, aut fomentum, aut venaesectio, aut purgatio solvit. *Aph.* VI. 31. VII. 46.

Oculorum caligines, crebris apparentibus mensibus, solvantur. *Coac.* 552.

OMENTUM.

Os uteri comprimit, in mulieribus praeter naturam crassius. *Aph.* V. 46.

Si omentum exciderit, necesse est putrescere. *Aph.* VI. 58. *Coac.* 502.

OPHTHALMIA. LIPPITUDO.**AD DIAGNOSIN.****CAUSAE ANTECEDENTES.**

Post hiemem siccam, & aquiloniam, ver pluviosum & austrinum. *Aph.* III. 11.

Tempus aestivum. *Aph.* III. 21.

Autumnus aquilonius, & fuscus. *Aph.* III. 14.

Siccitates. *Aph.* III. 16.

AD PROGNOSIN.

Ophthalmia laborantem ab alvi profluvio corripi, bonum, *Aph.* VI. 17. *Coac.* 229.

M 4

Lip=

Lippitudine affecto suborta febris, solutionem adfert.
Sin minus, caecitatis, aut mortis, aut etiam utriusque metus est. *Coac.* 222.

Quibus cum lippitudine capitis dolor accedit, & longo tempore perseverat, caecitatis metus impendet. *Coac.* 223.

AD THERAPIAM.

Ophthalmiam venaelectio solvit. *Epid.* VII.

Ad lippitudinem annuam, ac popularem, conducit purgatio capitis, & ventris inferni. Et si corpus habeat, sanguinis detractio ad quosdam eiusmodi dolores confert. Item cucurbitae circa venas affixae; cibus modicus panis, & aquae potus, &c. *De Visu* V. 1. & *seqq.*

OS.

Oris exulcerationes aestate accidunt. *Aph.* III. 21.

Os amarescens, cum aliis signis, sursum purgante opus esse, indicat. *Aph.* IV. 17.

Os hians, si gracile appareat, nec facile contrahi possit, cum aliis notis, in morbis acutis, mentis emotionem, indeque phrenitidem perniciosam portendit. *Coac.* 275.

OS VENTRICVLI, vid. VENTRICVLVS.

OSCITATIO.

Vino cum pari aqua poto solvitur. *Aph.* VII. 56.

OSSA.

AD PROGNOSIN.

Vbi dissectum fuerit os, aut cartilago, aut nervus, aut genae pars tenuis, aut praeputium, neque augetur, neque coalescit. *Aph.* VI. 19. VII. 28. *Coac.* 505.

Ex osse aegrotante, caro livida, malum. *Aph.* VII. 2.

Ab ossis denudatione erysipelas (malum) *Aph.* VII. 19.

A sphacelo abiceffus ossis. *Aph. VII. 77. Coac. 237.*

Ab ulceribus diuturnis. *Aph. VI. 45.*

AD THERAPIAM.

Ipsis frigidum inimicum, calidum vero utile. *Aphor. V. 18.*

OSSIVM FRACTVRA.

Quae ossa reponi non potuerunt, ea necessario abscedere sciendum est; nec non quae prorsus carne nudata sunt. *De Fractur. XXXVI.*

Ad consolidationem naso dies 10. maxillae, claviculae, & costis dies 20. cubito 30. tibiae & brachio 40. femori 50. debentur. *De Alim. X. 2. ad 6.*

OSSIVM LVXATIO.

Gracilibus magis laxantur articuli, & citius reponuntur, quam bene carnosus; minusque inflammatione tentantur humidis, & gracilibus, quam siccis & carnosus. *De Artic.*

OXYMEL.

Sputum educit, & facilem respirationem reddit. *De Diet. II.*

PALATVM.

Quibus ad palatum humor colligitur, plerumque in pus vertitur. *Coac. 238.*

Quibus ex palato os discessit, iis medius nasus subfidet. *De Alim.*

PALLIDI.

Pallidis, gracilibus, & crebra oris salivatione laborantibus, in somnis sudores, boni sunt. *Coac. 271.*

Color pallidus, aut niger, cum aliis notis corruptelae faciei, lethalis. *Coac. 212.*

PALPEBRAE.**AD PROGNOSIN.****NOTAE LETHALES.**

Livescens palpebra, cum ceteris notis faciei Hippocraticae. *Coac.* 212.

Palpebra perversa, aut corrugata, livescens aut pallescens, cum aliis signis. *Praenot.* 6.

Qui vehementer efflant, & reflexis sunt palpebris, ac per somnum leviter suspiciunt, &c. moriuntur. *Coac.* 64.

PALPITATIO.**AD PROGNOSIN.**

Quae contingunt in febre circa ventrem palpitationes, mentis emotiones adferunt. *Coac.* 298.

Quos palpitationes in totum occupant, num voce defecti intereunt? *Coac.* 347. *Praedict.* I. 30.

Quae contingunt circa ventrem palpitationes, &c. sanguinis ex naribus profluvium denunciant. *Praedict.* I. 144.

PANIS.

Panis ex tota farina siccatur, & per alvum secedit. **Purus autem magis nutrit**, minus vero secedit. *De Diatr.* II. X. 5. 6.

Panis fermentatus levis est, & secedit. **Non fermentatus secedit quidem minus**, nutrit autem magis. *Ibid.* 8. 11.

PARALYSIS.**AD DIAGNOSIN.****NOTAE ANTECEDENTES.**

Ex venis in ano sanguinem fundere solitis, aliquantum apparentibus, tenebrosae vertigines obortae. *Coac.* 346.

Vehementes mentis emotiones silentes, absque quiete,
oculis quoquoque intuentes, spiritum efflantes.
Coac. 486.

Torporis & stuporis praeter consuetudinem evenientes.
Coac. 477.

AD PROGNOSIN.

Quibus cum impotentia motus, pars affecta extenuatur,
incurabiles sunt. *Praedict.*

PARAPLEGIA, *vid.* APOPLEXIA.

PAROTIDES.

AD DIAGNOSIN.

NOTAE ANTECEDENTES.

Quae convulsionis in morem affligunt, cum alto stupe-
re. *Coac.* 352.

Quae caput quodammodo concutiunt, cum intensa ocu-
lorum rubedine, ac manifesto delirio. *Coac.* 163.

In biliosa alvo, molli, stercoracea egerente, apparen-
tes aestus, tumorem ad aures excitant. *Coac.* 626.

Alvi recrementa, quae in spumosa & sincera desinunt.
Coac. 613.

Alvus stercora nigra demittens, si sopor appareat, tu-
bercula ad aures excitat. *Praedict.* I. 166.

Capitis dolor, cum sopore, & surditate. *Praedict.* I. 168.

Eadem pathemata, cum ascaridibus. *Coac.* 165.

Moderatus capitis dolor, cum inexhausta siti, aut sudo-
re febrem non solvente, nisi alvus erumpat. *Coac.* 173.

Ex praecordiorum tumore biliosis spiratio magna, &
febris acuta, tubercula ad aures suscitant. *Coac.* 290.

Per febres assiduas pustulae toto corpore enascentes.
Coac. 114.

Praecordiorum contentio, cum sopore, & incontinenti
corporis iactatione, in capitis dolore vexato. *Coac.*
289. *Praedict.* I. 169.

Sopor cum incontinenti corporis iactatione, praecor-
diorum dolore, & parva vomitione. *Coac.* 183. *Prae-
dict.* I. 165.

Sopor, cum tumoribus circa faciem. *Coac.* 183.

Sopor, cum inquietudine corporis, praecordiorum dolore, frequenti & pauca sputatione. *Coac.* 185.

Num sopor aliquis, aut morbus regius, cum singultu, & alvo affatim prorumpente? *Praedict.* I. 154.

Surditas, cum anxietate; vel etiam sopore. *Coac.* 209. *Praedict.* I. 159.

Num urinae cum rigore resistentes, praesertim si altus sopor praegressus sit? *Praedict.* I. 155.

In pervigiliis quibusdam, quae cum angore, & anxietate fiunt, ad aures abscessus maxime obveniunt. *Praedict.* I. 157.

In spirituosus, & anhelatoribus, morbo regio laborantibus, & febre acuta, cum praecordiorum durtie, & tumore, si corporis summa perfrigerentur, magnorum circa aures abscessuum exortum, fortassis expectare oportet. *Praedict.* I. 164.

AD PROGNOSIN.

NOTAE SALVTARES.

Tussiculae, quae cum crebris oris sputationibus procedunt, tubercula ad aures emolliunt, *Coac.* 204.

Tubercula iuxta aures, in febrientibus cum dolore oborta, quibusdam febre indicatorio modo deficiente, neque sedantur, neque suppurantur. Haec biliosum alvi profluvium, aut dysenteria, aut crassarum urinarum subsidencia, solvit. *Epid.* I. II. 178. 179.

NOTAE PERICVLI.

Graves aurium abscessus, qui citra iudicationem sensim conquiescunt, & dissipantur, damno sunt. *Praedict.* I. 170.

Tubercula ad aures excitata, in leviter sideratis, malo sunt. *Coac.* 202.

Post ingruentes ad praecordia dolores, cum vel sine alvi profusione, suborta ad aures tubercula, aliaeque supurationes, malignitatem praefecerunt. *Coac.* 284.

In tumoribus ad aures, urinae celeriter ac pauco tempore

pore concoctae, damno sunt. Quin & perfrigerari
itidem malum est. *Coac.* 205.

Quibus indicationis tempore, exorta ad aures tubercu-
la, non suppurantur, his solutis, morbi reversio
pro recidivarum ratione, simili circuitu contingit.
In his ad articulos aliquid abscedere posse, speran-
dum est. *De Indicat.* 61.

NOTAE LETHALES.

In diuturnis morbis non suppurantia aurium tubercula,
mortem adferunt. *Coac.* 203.

In diuturnis morbis, suppurati ad aures tumores, nisi
pus admodum album, ac sine odore reddant, exi-
tium, praecipueque mulieribus, adferunt. *Coac.* 206.

Ex praecipitibus morbis, in febribus ardentibus maxi-
me, tubercula ad aures exoriuntur, ac nisi indica-
torie solvantur, & maturescant, aut sanguis ex nari-
bus profluxerit, aut crassum sedimentum urina acce-
perit, aegros interimunt. Prius vero huiusmodi tu-
mores subsidunt, ac conquiescunt. *Coac.* 207.

Quae cum dolore exoriuntur ad aures tubercula, per-
niciem minantur. *Coac.* 199.

Anxietate vexatis praecordiis, oborta ad aures tubercu-
la mortem adferunt. *Coac.* 392.

In praecordiis ex longo intervallo afflictis, & graveo-
lente alvo, subnatum ad aures tuberculum, mortem
adfert. *Coac.* 292. 201. *Praedict.* I. 158.

NOTAE CONVULSIONIS FUTURAE.

In tremulis, & anxietate vexatis, parvi ad aures tumo-
res excitati, convulsionem denunciant, si alvus male
affecta sit. *Coac.* 353.

Qui sopore, corporis inquietudine, praecordiorum do-
lore affliguntur, cum frequenti & pauca sputatione,
iis tubercula ad aures exoriuntur, ac fortassis so-
pore tentati ad aliquam convulsionem deveniunt.
Coac. 185.

CONF. ABSCESSVS ad AVRES.

PAROXYSMVS.

AD DIAGNOSIN.

Nox ante exacerbationem gravis: subsequens vero levior plerumque. *Aph. II. 13.*

AD PROGNOSIN.

DETERIORIS NOTAE.

Qui accessione correpti, postero die gravius habent, iis malum denunciatur. *Coac. 78.*

Quibus tertio die subsistit accessio, & quarto ingravescit, malum denunciatur. Ac metus est, ne huiusmodi accessiones phrenitim inducant. *Coac. 79.*

Quibus exacerbationes fiunt, quaecunque hora dimiserit febris, postridie eadem hora si corripuerit, difficulter iudicantur. *Aph. IV. 30.*

Qui per accessiones tussunt, & tenuiter exsudant, ii maligne habere iudicandi sunt. *Coac. 112.*

AD THERAPIAM.

In exacerbationibus cibum subtrahere oportet. Exhibere enim noxium est. Et quaecunque per circuitus exacerbantur, in exacerbationibus subtrahere oportet. *Aph. I. 11.*

His, qui per circuitus exacerbantur, nihil dare oportet, neque cogere, sed auferre de appositionibus ante indicationes. *Aph. I. 19.*

PARTVS.

AD DIAGNOSIN.

Post hiemem austrinam, pluviosam, & clementem, ver boreale, siccum, & tempestuosum, partus impotentes ac morbosos reddit. *De Aer. Aqu. & Loc. XXVI. 4. 5.*

Quae autem partum in modum cholerae morbi affliguntur, faciles quidem partus edunt, febre autem tentatae maligne habent, tum vero praecipue, si quid fauces vexet, aut in febre maligni aliquid appareat. *Coac. 535.*

Quae

Quae in partu oris ventriculi dolorem antea sensere , paulo post foetus deponunt . *Coac. 547.*

Quae praegnantēs ante partus laborarunt , subinde rigore corripī solent . *Coac. 545.*

Quibus lochia non repurgantur ante partum , eae faciliōri partu defunguntur . *De Feer. caset.*

Quae animalia minus alimenti foetui suppeditant , celerius pariunt ; quae vero plus , tardius . *De Nat. hup.*

AD PROGNOSIN .

NOTAE PERICULI .

Quae ex partionibus contingunt exsolutiones , cum torpore , molestiam quidem exhibent , & mentem emoveant , nullam tamen perniciem adferunt . Verum etiam purgamentorum muliebrium abundantiam denunciant . *Coac. 546.*

Erumpentia ante partus aquosa , mala . *Coac. 536. 537.*

Ante partus subinde rigore corripī , & citra dolorem parere , periculum indicat . *Coac. 538.*

PARTVS DIFFICILIS .

Mulierī difficulter parienti stertutatio superveniens , bonum . *Aph. V. 35.*

Pariēntium maxime laborant primiparae . *De Nat. puer. CONF. ABORTVS .*

PAVORES .

Parvis & recens natis pueris infesti . *Aph. III. 24.*

In febribus , ex somnis pavores , aut convulsionēs , malum . *Aph. IV. 67.*

PECTVS .

Frigida , velut nix , glacies , pectori inimica , tussēs movent , sanguinis eruptiones , ac catarrhos inducunt . *Aph. V. 24.*

PECTORIS DOLOR .

AD DIAGNOSIN .

CAUSAE ANTECEDENTES .

Tempus hiemale. *Aph. III. 23.*

Annus tempus aquilonium. *Aph. III. 5.*

Quotidianae constitutiones aquiloniae. *Aph. III. 17.*

Epotum veratrum. *Coac. 570.*

AD PROGNOSIN.

In dorsi ac pectoris dolore, cruentae mictionis suppressio, laboriosum exitum adfert. *Coac. 272.*

Pectoris dolor cum febre, & alvus perturbata cum torpore, nigras deiectiones praefert. *Coac. 274.*

Dolor in pectore fixus, cum torpore, suborta febre malum indicat, lique celeriter mortem oppetunt.

Coac. 315. Prædict. I. 70.

CONF. LATERIS DOLOR, PERIPNEUMONIA,
PLEVRITIS.

PEDES.

AD PROGNOSIN.

NOTAE SALVTAES.

Dolor ad pedes obortus, insaniam solvens. *De Indicaz. 65.*

Dolores pedum vehementes, ab alvi profluvio diuturno, & tussis liberantes. *Ibid. 78.*

NOTAE PERICVLI.

Pedes & manus nudare, & crura dispergere, ubi vehementis calor non subest. *Coac. 497.*

NOTAE LETHALES.

Manuum ac pedum tumores, cum rubore. *Coac. 63.*

PERFRIGERATIO, vid. FRIGVS.

PERINAEVM, vid. MICTIO.

PERIPNEUMONIA. PULMONIS INFLAMMATIO.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Aetas virilis. *Aph. III. 30.*

Tempus hiemale. *Aph. III. 23.*

Violentia, & gulositas piscium capitonum, & anguillarum. *De Int. Affect. VII. 2.*

NO.

NOTAE COMITANTES.

Febris acuta, spiratio frequens & calida, anxietas, impotentia, iactatio, dolor sub scapulas, & ad claviculam, & ad mammam, gravitas in pectore, quandoque etiam delirium. Quidam dolorem non sentiunt, donec tussire inceperint. *De Morb. III XVI. 3. ad 10.*

In pulmonis inflammationibus, si lingua tota alba fiat, ac aspera, ambae pulmonis partes inflammatione vexantur; quibus vero dimidiata lingua, qua parte id apparet, inflammatio affligit. *Coac. 400.*

Quibus ad unam claviculam dolor subit, iis una superior pulmonis ala laborat; quibus vero ad ambas claviculas dolor extenditur, ambae superiores pulmonis alae laborant; quibus ad mediam costam, media; quibus vero, ad quam partem pulmo extenditur, dolor permeat, inferna ala laborat; quibus una tota pars laborat, quae ei parti respondent, omnia accrotant. *Coac. 400.*

Si suspensae utrinque pulmonis partes, Aortae distae, tanta inflammatione tententur, ut ad latus adhaereant, illa corporis parte resolutionem sentiunt; & ad costam livores foris fiunt, quos veteres istos, aut sidere percussos vocabant. Quod si tanta non est inflammatio, ut adhaereant, dolor quidem totum occupat, neque tamen resolutionem sentiunt, neque livores habent. *Coac. 400.*

Ex pulmonis suppuratione, interdum circa ventrem dolores, ac claviculam, & cum incontinenti corporis iactatione aliquantulum stertere, sputi copiam in pulmone indicant. *Coac. 18.*

AD PROGNOSIN.

NOTAE SALVTARES.

Facile morbum sustinere, dolore defungi, sputum promte expuere, facile spirare, siti vacuum esse, reliquum corpus aequaliter incalescere, ac molle esse.

N

Ad

Ad haec somnos, sudores, urinarum educationem laudabiliter fieri. *Coac.* 393. *Praenot.* 101.

Quibus ex morbis pulmonis ad aures abscessus oboriuntur, & ad inferiores sedes suppurant, & fistula facta aperiuntur, iis secunda valetudo contingere solet. *Praenot.* 111.

In vehementibus, & periculo proximis pulmonum inflammationibus, abscessus ad crura omnes fane utiles. Optimi vero, qui sunt sputo mutationem subeunte. Si namque tumor & dolor suboritur, sputo pro flavo in pus verso, & foras prodeunte, hoc modo tum securissime aeger superstes futurus est, tum citissime citra dolorem abscessus conquiescet. *Praenot.* 114.

In omnibus pulmonis & laterum doloribus, sputum celeriter prompteque expui convenit, sputoque flavum valde permixtum apparere. *Praenot.* 86. *Coac.* 390.

In pulmonis inflammationibus, si inter initia morbi sputum excernitur flavum, non multo permixtum sanguine, salutare est, & confert admodum. *Praenot.* 95. *Coac.* 390.

Sputa omnium optima, quae dolorem sedant. *Praenot.* 98. *Coac.* 391.

Sputa mucosa, & fuliginosa, tum celeriter colorantur, tum securiora sunt. Quae vero intra 5. diem, dum coctionem accipiunt, colorantur, meliora censentur. *Coac.* 390.

Pulmonis inflammationes, quae ex morbo laterali permutationem accipiunt, iis, quae ab initio sunt, securiores sunt. *Coac.* 397.

Purulenti ex lateris morbo, aut pulmonis inflammatione, ut plurimum brevi servantur, quos febris, statim atque eruptio facta est, dimittit, & cibos appetunt, & quibus pus facile educitur, album, odoris expers, laeve, eiusdem coloris, sine pituita, ac alvus exigua, & coacta reddit. *Coac.* 402.

NOTAE PERICULI.

Notae praecedentibus bonis oppositae, *Coac.* 393. *Praen.* 102.

In .

In omnibus pulmonis morbis, gravedines & sternutationes, tum praeire, tum subsequi, malum. *Praenot.* 93. *Coac.* 399.

A pleuritide peripneumonia, malum. *Aph.* VII. 11.

A peripneumonia phrenitis, malum. *Aph.* VII. 12.

A pleuritide, aut a peripneumonia detento, alvi profluvium superveniens, malum. *Aph.* VI. 16.

Vbi residere vult aeger, malum quidem indicium in acutis morbis, sed longe pessimum in pulmonum & laterum affectibus. *Coac.* 497.

In pulmonum vitis, supra modum rubrae sanguinis stillae, malum denunciant. *Coac.* 412.

In pulmonum inflammationibus siccis, qui pauca concocta educunt, metuendi sunt. *Coac.* 416.

Omnia sputa mala sunt, quae dolorem non sedant. *Praenot.* 97. *Coac.* 391.

Sputum, si multo post dolorem, flavum, aut non commixtum reicitur, nec non sine multa tussi, vitiosum censetur. *Coac.* 390. *Praenot.* 87.

Omnino autem pravam, flavam si sincerum est, & glutinosum, & candidum, & rotundum, itemque vehementer ex virore pallescens; quodque spumofum est, & lividum, & aeruginosum. Aliquanto vero deterius, quod sic est sincerum, ut nigrum quoque videatur. *Coac.* 390. *Praenot.* 88. 89. 90. 91.

Sputum flavum, cui paulum sanguinis admixtum est, quod 7. die, vel longiore spatio tale apparet, non adeo tutum. *Coac.* 390. *Praenot.* 96.

Pravitate etiam indicant, & spumantia, & flava, & nigra, & aeruginosa, viscosaque, & quaecunque celeriter colorantur. *Coac.* 390.

Sputa viscida, sanguinolenta, cum raucitate, mala sunt. Qued si ad haec aliquid in pectore sublatum sit, malum significat. In his extenuatis, cervicis dolores perniciem denotant. *Coac.* 413.

Malum quoque, ubi nihil expurgatur, neque ipsum proicit pulmo, sed propter multitudinem fervet in gutture, *Praen.* 92.

Urina mala, quae post potionem celeriter meitur, praefertimque in lateris doloribus, & pulmonis inflammationibus. *Coac.* 579.

In pulmonum inflammationibus periculum indicat, quae initio coctionem habet, verum post 4. diem tenuis evadit. *Coac.* 580.

Si neque sputum recte excernatur, neque urina bonam subsidentiam habere videatur, periculum est, ne articulo claudicet aeger, aut ei multum negotii exhibeatur. *Praenot.* 115.

NOTAE LETHALES.

Si dispareant abcessus, & intro recurrant, sputo non prodeunte, & detinente febre, gravis morbi periculum, & delirii, & mortis, aegro imminet. *Praen.* 116.

Ex suppuratis, quos pulmonum morbi concitarunt, fere seniores moriuntur; at ex ceteris suppurationibus, iuniores potius intereunt. *Praenot.* 117.

Densa & exercitationi dedita corpora, citius ex morbo laterali, & pulmonis inflammatione intereunt, quam quae sine exercitatione degunt. *Coac.* 398.

In pulmonis inflammationibus siccis, aliquantum extenti in pectoribus rubores, perniciem denunciant. *Coac.* 417.

Sputum valde sanguinolentum, aut quod statim initio livescit, perniciem praefert. *Coac.* 390.

Ex lateris morbo, aut pulmonis inflammatione purulenti moriuntur, quos febres consequuntur, & sitis, & cibi fastidium, si pus lividum, aut ex pallido virescens, aut pituitosum, aut spumans, ac insuper si alvus est liquida. Quibus autem ex praedictis partim quaedam adsunt, partim vero absunt, hi quidem moriuntur, illi vero post longa temporum intervalla sani evadunt. *Coac.* 402.

In pulmonis inflammationibus, quibus circa initia urinae crassae sunt, deinde ante 4 diem tenues evadunt, mors impendet. *Coac.* 415.

Quibus una cum corde pulmo totus inflammatur, ita ut in latus incumbat, ii toto corpore nervorum resolu-

solutionem sentiunt, & sine sensu iacet aeger frigidus, secundo autem, aut tertio die interit. Quod si contingat, ut cor nihil tale quiddam, aut etiam minus patiat, diutius vivunt, nonnulli vero etiam servantur. *Coac.* 401.

NOTAE SUPPURATIONIS FUTURAE.

Merum locorum dolores, qui neque per sputorum purgationes, neque foecum alvi deiectionem, neque venaeiectionem, aut medicamenta purgantia, & victus rationem sedantur, eos ad suppurationem tendere sciendum est. *Praenot.* 99. *Coac.* 394.

Quicumque pulmonis inflammatione laborant, neque diebus indicatoriis repurgantur, verum cum delirio 14. dies superarunt, iis suppurationis metus impendet. *Coac.* 396.

Qui pus intro collecturi sunt, iis primum quidem sanguinosum sputum expuitur, deinde dulcius. *Coac.* 403.

Fiunt ex pulmonibus inflammatione abscessus, aliis quidem in partibus inferioribus, quos circa praecordia inflammatio fatigat; aliis vero in superioribus partibus, quibus praecordia tumoris, & doloris sunt expertia, spirandi autem difficultas pro tempore accesserit, quae deinde sine ulla evidenti occasione quiescat. *Coac.* 395. *Praenot.* 113.

NOTAE SUPPURATIONIS iam FACTAE.

Circa suppurationum initia fieri solet febris, aut rigor, & pro dolore pondus, in eo loco, qui dolore affligebatur. *Praenot.* 103.

Quae ob puris intro collectionem febres intermittunt, in his magna ex parte aegri tenuibus sudoribus fluunt. *Coac.* 419.

Ex pulmonis suppuratione, interdum circa ventrem dolores, ac claviculam, & cum incontinenti corporis iactatione aliquantulum stertere, sputi copiam in pulmone indicant. *Coac.* 18.

AD THERAPIAM.

Primum caput levius facere, quo nihil influat ad pectus. Primis diebus sorbitiones dulciores adhibere, die 4. 5. & 6. non amplius dulces, sed pingues. Si pro ratione sperare non possit, ex pharmacis sursum educentibus dare. *De Morb. III. XVII. 45. ad 50.*

In primis 4. aut 5. diebus, alvum subducere oportet, & hoc paulo amplius, quo & febres obtusiores sint, & dolores leviores. Quum autem evacuatus fuerit, & corpore debilis, infernam alvum tertio quoque die deorsum commovere: & quo corpus potens sit, & supernae regiones humoris exsortes. *Ibid. 51. ad 57.*

Oportet infernam alvum, neque valde suppressam esse, ut ne febres sint acutae: neque valde egerere, quo saliva sursum educi possit, & aeger viribus valeat. At medicamenta sursum educentia, 6. & 7. ac 9. die, &c. morbo adhuc ulterius progresso, magis exhibere. *Ibid. 58. ad 61.*

Peripneumoniae eclegma utile: galbanum & nux pinea, cum melle attico. *De Vitis. acut.*

CONF. EMPYEMA, PLEVRITIS, PVS, VOMICA.
PHLEBOTOMIA, vid. VENAESECTIO.

PHRENITIS.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE & NOTAE ANTECEDENTES.

Aetas virilis. *Aph. III. 30.*

Alba a partu prodeuntia, & his subsistentibus, surditas cum febre, & lateris dolore acuto. *Coac. 525.*

Lateris dolor cum bilioso sputo, praeter rationem evanescens. *Coac. 418.*

Accessio febrilis die 3. subsistens, & 4. ingravescens. *Coac. 79.*

In febre ardente, aurium sonitus, cum visus hebetudine, & ad nares gravitate, nisi sanguis ex naribus profluat. *Coac. 131. 194.*

In

In praecipiti morbo, capitis dolor, & praecordia revulsa, nisi sanguis ex naribus profluat. *Coac.* 119.

Dementiae, in quibus aegri sunt tremuli, aut aliquid investigantium more sensim contrectant, aut palpant. *Coac.* 76. *Praedict.* I. 34.

Excretatio frequens, siquidem etiam aliud quoddam signum adfuerit, phrenitidem portendit. *Coac.* 244. *Praedict.* I. 6.

Lingua ex resiccatione densa, & aspera. *Praedict.* I. 3. Vehementi insania detenti, tremuli, cum crebra sputatione, metus est, ne phrenitici evadant. *Coac.* 94.

Frons contracta, cum vultu bene colorato, tetrico, ac supercilioso, in morbo acuto. *Coac.* 213.

Corporis iactationes, & incontinentiae, in febre, cum perfrigeratione, & superiorum partium tenui sudore. *Praedict.* I. 27.

Fauces in morbis acutis dolentes, graciles, parvae, suffocativae, cum ore hiantes, &c. *Praedict.* I. 11.

In graviter & acute mente emotis, si febris iterum repetat cum sudore, phrenitici evadunt. *Praedict.* I. 15. *Coac.* 95.

Lateris dolore citra inflammationem affecti, cum turbulentis, tenuibus, moderatis, in phrenitidem labuntur. *Coac.* 411.

Quae sensim feroces sunt mentis emotiones, &c. *Coac.* 85. 155. 246.

Qui inter initia sopore detenti, capitis, lumborum, cervicis, praecordiorum dolore, ac insomnia conflantur, considerandi num phrenitici evadant? *Coac.* 179. *Praedict.* I. 1.

Urinae decolores, suspensa quaedam in medio nigra habentes, cum pervigilio, & perturbatione, phrenitidem denunciant. *Coac.* 582. *Praedict.* I. 4.

NOTAE COMITANTES.

Septi transversus dolor, febris, mentis emotio, intentio oculi. *De Merb. III. IX.* 3. 6.

Phrenitici parum bibunt, ex levibus strepitibus facile irritantur, tremuli sunt, aut convulsionibus tentantur. *Coac.* 96.

AD PROGNOSIN

NOTAE MELIORES.

Quae in phreniticis manifesta apparent, insomnia, probanda sunt. *Coac.* 90.

NOTAE PERICULI.

Qui supra 40. annos phrenitici fiunt, non admodum sanantur. *Aph.* VIII. 1.

In phrenitide albicans deiectio, ac torpor, malum denunciat. His succedens rigor, pessimus. *Coac.* 91. *Praedict.* I. 13.

A peripneumonia phrenitis, malum. *Aph.* VII. 12.

Alvi praerubra proluvies. *Praedict.* I. 2.

In phreniticis initio moderatum esse, sedatum, & facilem, crebro vero permutari, malum est; quin & sputatio frequens, mala est. *Praedict.* I. 12. *Coac.* 92.

Quibus adsunt superiorum partium tenues sudores, cum perfrigerationibus, nec sine febre, ii corporis incontinentia, & phrenitide vexati, praecipue periculum denunciant. *Coac.* 69.

Quibus urinae pellucidae, albae, malae. Maxime autem in phreniticis observantur. *Aph.* IV. 72.

NOTAE LETHALES.

In phreniticis narium stillatio perniciem ostendit, inque praecipue, si 4. inter initia die contingat. *Praedict.* I. 1.

Morbus acutus praegressus, in eoque fluxus graciles, ac dolentes, cum ore hiant, &c. *Coac.* 275.

In intensa phrenitide tremores, lethales. *Coac.* 97. 93. *Praedict.* I. 9.

In febribus, vehementes mentis emotiones, cum taciturnitate, in eo, qui voce defectus non est, perniciem minantur. *Coac.* 65.

NOTAE CONVULSIONIS FUTURAE.

Crebrae in phreniticis permutaciones, convulsionis denunciant, ac pravae sunt. *Coac.* 101. *Praedict.* I. 28.

VOMITVS NIGRI.

Cerebrae in phreniticis cum perfrigeratione sputationes, nigrorum vomitionem praenunciant. *Coac.* 102. *Prædict.* I. 31.

AD THERAPIAM.

Phrenitico ad dolorem danda sunt, quae in pleuritide; & tepor faciendus, ubi dolor haeret. Sed & alvus curanda, & reliqua similiter facienda sunt, excepto potu. Potu vero utendum est quocumque alio volueris, praeter vinum. Aut acetum, & mel, & aquam dato. Vinum autem non convenit mente motis, neque in hoc morbo, neque in quibusvis aliis. Conducit autem in hoc morbo, etiam caput multa calida lavare. Mollito enim corpore, sudor quoque magis sequitur, & alvus, & urina secedit. Et aeger ipse se ipso temperatior evadit. *De Affect.* X. 8. ad 16.

CONF. DELIRIVM, MANIA.

PHTHISIS. TABES.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Aetas juvenilis. *Aph.* III. 29.

Aetas ab anno 18. ad 35. *Aph.* V. 9. VIII. 7. *Coac.* 439.

Tempus autumnale. *Aph.* III. 22.

Post aestatem siccam, & aquiloniam, autumnus pluviosus, & austrinus. *Aph.* III. 13.

Siccitates. *Aph.* III. 16.

A puris sputo, tabes, & fluxus. *Aph.* VII. 16.

Haemorrhoides diuturnae curatae, nisi una servata fuerit. *Aph.* VI. 12.

Suppuratio ex pleuritide, nisi intra 40. dies, ex quo ruptio fuerit facta, repurgentur superne. *Aph.* V. 15.

A tuberculo pulmonis sputum purulentum, ultra dies 40. a ruptione facta, excurrens. *Coac.* 404.

Ruptio venarum crassarum, & ex capite destillatio. *Coac.* 438.

A (an)

A sanguinis vomitu tabes, & puris purgatio sursum.
Aph. VII. 78.

NOTAE ANTECEDENTES.

Vbi horror in malis subinde incidit, cum difficultate spirandi, tabes denunciatur. *Coac. 17.*

Intestinorum levitates, cum spirandi difficultate, & pectoris morfu, ad tabem tendunt. *Coac. 469.*

Pustularum eruptiones, velut summa cute leviter lacerata, aut vellicata, totius habitus tabem, & corruptionem denunciant. *Coac. 444.*

AD PROGNOSIN.

NOTAE PERICVLI.

Autumnus tabidis malus. *Aph. III. 10.*

In naturis ad tabem prompte comparatis, si cum febre fluxiones ad gingivas, & dentes compareant, malum denunciant. *Coac. 441.*

Tabes maxime periculosae sunt, quae ex ruptione venarum crassarum, & ex capitis destillatione contingunt. *Coac. 438.*

In tabidis pruritus sentientia corpora, ab alvi suppressione, malo sunt. *Coac. 440.*

Praecordia sublata, subsistente alvo, malum denunciant, praecipue vero in his, qui ex longo intervallo contabescunt, & quibus alvi disfluunt. *Coac. 287. 442.*

NOTAE LETHALES.

A tabe detento alvi profluvium superveniens, lethale. *Aph. V. 14. Coac. 436.*

A tabe, fluxus ex capite. **A** fluxu, alvi profluvium. **A**b alvi profluvio, inhibito purgationis sursum. **A**b inhibitione, mors. *Aph. VII. 78.*

A puris sputo, tabes, & fluxus. Postquam vero sputum retinetur, moriuntur. *Aph. VII. 16. 78.*

Quibus tabe laborantibus, capilli de capite defluunt, hi alvi fluxu superveniente, moriuntur. *Aph. V. 12. Coac. 436.*

A tabe vexatis, si sputum, quod extussunt, prunis su-

superfufum graviter oleat, & capilli de capite defluant, lethale. *Aph. V. 11. Coac. 434.*

Tabidis in aquam marinam expuentibus, fi pus fundum petit, celerem perniciem denunciat. Sit autem marina aqua in aeneo vase. *Coac. 435.*

Cum spirandi difficultate aefcentes in tabe, cruda multa educentes, exitialiter habent. *Coac. 445.*

Ex his, qui cum pernecie confumpti funt, nonnulli ante mortem fubinde rigoribus corripuntur. *Coac. 443.*

NOTAE DELIRII FVTVRI.

Sputorum retentiones in tabefcentibus, mentem ad delira verba commovent. *Coac. 437.*

AD THERAPIAM.

Lac dare convenit tabidis, non admodum febricitantibus. *Aph. V. 64.*

Dare lac afinum coctum ad fubpurgationem, aut bubulum, aut caprinum. Bibere lac bubulum crudum, tertia aquae mulfae parte admixta, per 45. dies, admixto etiam origano. Caput prius purgare, pharmaco ad nares appofito. Cibaria autem, & obfonia dare, neque pingua, neque nidorofa, neque valde acria. *De Int. Affect. XI. 25. ad 28.*

Tabidis purgationes furfum, vitandae. *Aph. IV. 8.*

PINGVES, vid. HABITVS.

PITVITA.

Cum bile morborum omnium eft caufa. *De Affect. I. 8.*

Hieme augetur. *De Nat. hum. XIV. 15.*

Quibus fpumofae egeftiones in alvi profluviis, his de capite pituita defluit. *Aph. VII. 30.*

In doloribus circa umbilicum, cum palpitatione, fub iudicationem conferta, & crebra pituita, cum dolore prodit. *Coac. 300.*

Quibus inter Septum transversum, & ventrem, pituita excluditur, & dolorem exhibet, in neutrum ventrem ha-

habens transitum, his per venas in vesicam pituita versa, morbi solutio fit. *Aph. VII. 54.*

PLEVRITIS. LATERIS DOLOR.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Aetas virilis. *Aph. III. 30.*

Tempus hiemale. *Aph. III. 23.*

Acidum ructantes non admodum pleuritici fiunt. *Aph. VI. 33.*

NOTAE COMITANTES.

Dolor lateris, febris & horror, frequens spiritus, erectae cervicis spiratio, tussis, sputum subbiliosum, velut a mali punici corio, si non ruptiones habuerit: si vero habuerit, etiam sanguineum. Est autem & sanguinea pleuritis, in qua subcruenta reiciuntur. Et est quidem biliosa, mitior, si non ruptiones aeger habeat: sin minus dolorosior, &c. *De Morb. III. XIX. 2. ad 9. De Affect. VIII. 2. ad 7.*

AD PRŒGNOSIN.

NOTAE INDICATIONIS.

Pleuritides biliosae, & sanguineae, fore 9. aut 11. die indicantur, ac maxime sanescunt. *Coac. 387. De Morb. III. XX. 5.*

Quibus in morbo laterali, lingua circa initia biliosa est, hi intra septem indicantur: quibus vero 3. ac 4. die, circa nonum. *Coac. 383.*

Quod si bulla aliquantulum livescens, in lingua appareat initio, qualis excitatur ferro candente in oleum intincto, difficilior fit solutio, & indicatio quidem ad 14. diem deducitur. Sanguinem autem plurimum expuunt. *Coac. 384.*

Sputum in morbo laterali, ubi maturescere, & expui 3. die coeperit, celeriores solutiones facit; quod si posterius, tardiores. *Coac. 385.*

In pleuriticis sputum, si statim appareat veniente morbo, abbreviat; si vero postea appareat, producit, *Aph. I 12.*

Laterum dolore affectis, urina aliquantulum rubra, levem habens subsidentiam, securam iudicationem praenunciat. Quae vero aliquantulum pallida, bene florulenta est, & albam habet subsidentiam, celerem quoque. *Coac. 386.*

NOTAE SALVTARES.

In morbo laterali affectis, dolores, & alvum emolliri, utile est, sputa colorari, nullos in pectore strepitus fieri, urinam recte procedere. *Coac. 386.*

Ceterae notae salutis, ut in PERIPNEVMONIA.

NOTAE PERICVLII.

Morbum aegre sustinerè, spirationem magnam ac densam esse, dolorem minime sedari, sputum aegre reii cere, vehementem sitim esse, corpus a febre inaequaliter detineri, alvum & latera vehementer calere, fronte, manibus, & pedibus frigidis, urinas vero, & alvi excrementa, & somnos, & sudores, minus laudabiliter fieri. *Praenot. 102. Coac. 393.*

Quibus in morbo laterali, initio quidem dolores leves sunt, 5. vero aut 6. die ingravescent, fere ad 12. perveniunt, raroque servantur, sed praecipue 7. ac 12. die periculum subeunt. Quod si bis 7. evaserint, servantur. *Coac. 387.*

Morbi laterales sicci, & in quibus nihil expuitur, gravissimi sunt. Metuendi quoque, in quibus dolores ad superiora tendunt. *Coac. 381.*

Morbi laterales graviore, qui sine divulsionibus, quam qui cum divulsionibus contingunt. *Coac. 382.*

A pleuritide peripneumonia, malum. *Aph. VII. 11.*

In dolore lateris, sanguinis e naribus stillatio, mala est. *Coac. 405.*

Qui in morbo laterali sputa reiiiciunt purulenta, aliquan-

quantulum biliosa, rotunda, aut purulenta aliquantulum cruenta, iis temporis progressu periculum creatur. *Coac.* 407.

Sputum quodcumque dolorem non tollit, malum significat; quod vero solvit, bonum. *Coac.* 391. *Praenot.* 97. 98.

Vrina, quae admodum rubra, & bene florulenta, sedimentum pallidum, laeve, ac purum habet, diuturnum, valdeque turbulentum morbum fore, & in alium transiturum, non tamen perniciosum, praenunciant. *Coac.* 586.

Alba, diluta, hordei testis non exacte moliti crassioribus frustulis simile habens sedimentum, fulvum, dolorem & periculum denunciat. *Ibid.*

Quae pallida fulvum habet sedimentum, hordei testis non exacte moliti crassioribus frustulis simile, diuturnitatem, ac periculum indicat. *Ibid.*

A pleuritide, aut peripneumonia detento, alvi profluvium superveniens, malum. *Aph.* VI. 16

Ceterae notae periculi, ut in PERIPNEUMONIA.

NOTAE LETHALES.

Densa & exercitationi dedita corpora, citius ex morbo laterali, & pulmonis inflammatione intereunt, quam quae sine exercitatione degunt. *Coac.* 398.

In extenuatis, post sputa viscida, saesuginea, cum raucitate, cervicis dolores perniciem denotant. *Coac.* 413.

Quibus cum bilioso, purulentum sputum, aut seorsum, aut simul permixtum educitur, ii ut plurimum 14. die intereunt, nisi malum, aut bonum aliquod ex his, quae prius descripta sunt, contingat. Alioqui certe pro ratione mors expectanda est, atque in his praecipue, quibus 7. die sputum huiusmodi procedere coepit. *Coac.* 392.

In morbo laterali, quibus circa initia in totum purulentae sunt sputationes, ii 3. die, aut 5. moriuntur.

Quos si superent, nec longe melius habuerint, 7. aut 9. aut 11. suppurati fiunt. *Coac.* 379.

Per-

Perniciem denunciant sputa nigra, fuliginosa, aut quibus qualia ex vino nigro fiunt. *Coac.* 407.

Quibus in morbo lateris, plurimus ex sputo strepitus in pectore sonat, & vultus demissus est, oculusque aurigine suffusus, & caligine obductus, in his mors expectanda est. *Coac.* 388.

Purulentos moderatius habentes, si sputa graveolentia consequantur, recidiva interimit. *Coac.* 406.

Quibus, si concutiuntur, pus lutulentum, & graveolens prodit, ut plurimum moriuntur. *Coac.* 409.

Quibus specillum a pure, velut ab igne, coloratur, ii fere moriuntur. *Coac.* 410.

In laterum doloribus, urina cruenta, obscura, cum eo, quod subsidet, vario & indiscreto, ut plurimum in 14. diebus mortem adfert. *Coac.* 581.

Laterum dolore affectis, in propinquo mortem esse significat, quae viridis nigrum habet sedimentum, aut furfuribus simile. *Coac.* 581.

NOTAE SUPPURATIONIS FUTURAE.

Qui pleuritici facti, non repurgantur superne in 14. diebus, his in suppurationem convertitur. *Aph.* V. 3.

Ad lateris dolorem insuper accedente strangulatu, suppurationis futurae spes est. *Coac.* 113.

Lateris dolor, cum diuturna febre, puris eductionem fore denotat. *Coac.* 421.

Qui subinde horrore corripiuntur, ad suppurationem deveniunt. Quin etiam febris talem ad suppurationem ducit. *Coac.* 422.

SUPPURATIONIS iam FACTAE.

Febris non dimittens, interdum levior, noctu gravior, sudores multi, tussis, absque sputo notabili, oculi cavi, malae rubentes, ungues adunci, digiti summi incalescentes, in pedibus tumores, ciborum inappetentia, pustulae toto corpore exortae. *Praenot.* 105. *Coac.* 402.

Suppurationis initium fore, ratione comprehendere oportet,

tet, ab eo die, quo primum aeger febricitavit, aut etiam primum rigorprehendit, & si pro dolore, sibi pondus inesse in eo loco, qui dolore affligebatur, dixerit. Ista namque circa suppurationum initia fieri solent. *Praenot. 103.*

Quibus latus in tumorem sublatum est, ac calidius existit, ubi in alterum latus incumbentibus, pondus quoddam suspensum esse videtur, iis pus una in parte collectum est. *Coac. 428. Praenot. 104.*

Quos ex lateris dolore cibi fastidia comitantur, iis os ventriculi aliquantulum dolet, & sudoribus disfluunt. Vbi autem facies ruboribus velut efflorescit, & alvus est liquidior, pus in pulmonibus collectum habent. *Coac. 423.*

Quae ob puris intro collectionem febres intermittunt, in his magna ex parte aegri tenuibus sudoribus disfluunt. *Coac. 419.*

NOTAE PHRENITIDIS FVTVRAE.

Lateris dolor cum bilioso sputo, praeter rationem evanescens, aegros in vehementem, & furiosam mentis emotionem agit. *Coac. 418.*

DEIECTIONIS SANGVINOLENTAE, & NIGRAE.

Surditas pus intro colligentibus suborta, sanguinolentam deiectionem denunciat. His sub mortem nigra egeruntur. *Coac. 420.*

AD THERAPIAM.

Ad lateris dolorem dare, quod pituitam & bilem a latere deducat; alvum curare per clysterem subducentem, ac frigefacientem; exhibere potum, & sordiditatem; potiones dare acidiores, quo sputum de latere depurgetur; quum autem pus purgari inciperit, latus calefacere conducit, & forinsecus maturare ea, quae circa latus sunt. *De Affect. VIII. 8. ad 15.*

In dolore lateris, sive ab initio, sive postea, calefactoriis resolutionem tentare, non alienum est. Ex calefactoriis vero optima est aqua calida, in utre, aut in

ve-

vesica, aut vase aeneo, aut testaceo admota. Com-
mode etiam sponsia mollis, magna, ex aqua calida
expressa apponitur. Vel hordeum, & ervum, in a-
ceto diluto dissoluta ac fervefacta, & in marsupia
coniecta; & surfur eodem modo. Siccum autem fo-
mentum praebent sal, & milium torrefactum, in la-
neis sacculis convenientissimum. *De Vi&. acut. XI.*

Si dolor ad claviculam de se significationem praebeat,
aut gravitas ad brachium, aut circa mammam, aut
supra septum transversum, venam secare prodest in
cubiti flexura internam, & non cunctari copiosum
sanguinem detrahere, donec multo rubicundior flu-
xerit, aut pro puro & rubicundo, lividus. *Ibid.*
XII.

Si sub septo transverso fuerit dolor, ad claviculam au-
tem de se significationem non praebat, alvum molli-
re oportet, &c. *Ibid.*

CONF. EMPYEMA, PERIPNEVMONIA, PVS, SPV-
TVM, VOMICA.

PODAGRA, vid. ARTHRITIS.

POLYPVS.

AD DIAGNOSIN.

Si polypus fiat in naso, ex medio cartilaginum depen-
det, veluti gurgulio; & ubi expirationem facit,
progreditur foras, & est mollis: ubi vero inspiratio-
nem facit, retrocedit: & loquitur obscure: & quum
dormit, stertit. *De Morb. II. XXXIII. 2. ad 7.*

AD THERAPIAM,

Si in nare polypus nascatur, eximitur laqueo, ex naso
ad os distractus. Aliqui etiam pharmacis erodunt.
De Affect. VI. 1. ad 4.

POTVS.

A multo potu rigor, & delirium, malum. *Aph. VII. 7.*
Paulo deterior, & potus, & cibus, iucundior autem,

210 PRAE. PRO. PRV. PVL.

eligendus potius, quam meliores quidem, sed ingratiores. *Aph. II. 38.*

Facilius est repleri potu, quam cibo. *Aph. II. 11.*

PRAECORDIA, *vid. HYPOCHONDRIA.*

PRAEGNANS, *vid. GRAVIDA.*

PRAEPUTIVM.

Difsectum, neque augetur, neque coalescit. *Aph. VI. 19.*

PROCERITAS.

Procero corpore iuventutem quidem degere, liberale est, nec deformis; inflescere vero, incommodum, & parvis deterius. *Aph. II. 54.*

PRURITVS.

AD DIAGNOSIN.

Pruritus per totum corpus aetas senilis obnoxia. *Aph. III. 31.*

Ad dentitionem accedentibus, gingivarum pruritus. *Aph. III. 25.*

AD PROGNOSIN.

In tabidis pruritus sentientia corpora, ab alvi suppressione, malo sunt. *Coac. 440.*

Quibus inferiores partes male afficiuntur, vehementibus pruribus prius obortis, iis urina fabulosa fit, & subsistit. At qui perniciose habent, iis mens obtorpescit. *Coac. 488.*

Pruritus omnibus nigrorum secessum denunciant, & grumos vomitione refusos. *Coac. 636.*

PVDENDA, *vid. GENITALIA.*

PVERI, *vid. AETAS.*

PVLMONES.

Mors subit, si in arteriam & pulmonem insignes valde plagae infliguntur, ita ut percussio pulmone, minor

nor sit , qui per os prodit spiritus , quam qui per
vulnus excidit . *Coac.* 509.

*PVLMONIS INFLAMMATIO , SVPPVRATIO ,
TVBERCVLVM , vid. PERIPNEVMONIA , PVS,
VOMICA , EMPYEMA .*

PVLSVS .

Pulsus tardi , & lenti , in lethargicis . *Coac.* 139.

*PVRGAMENTA MVLIEBRIA , vid. MENSTRA ,
LOCHIA .*

PVRGATIO SPONTANEA .

In perturbationibus alvi , & vomitibus sponte eve-
nientibus , siquidem , qualia oportet purgari , pur-
gentur , confert & facile ferunt : sin minus , contra .
Aph. I. 2.

PVRGATIO MEDICA .

INDICANTIA VARIA .

RATIONE TEMPORIS ANNI .

Quibus venae sectio , aut purgatio conducit , his vere
convenit venam secare , aut purgationem facere .
Aph. VI. 47.

Purgandum , aestate quidem , magis superiores ventres :
hieme vero inferiores . *Aph.* IV. 7.

RATIONE SVBIECTORVM .

Difficulter vomentes , & mediocriter carnosii , deorsum
purgandi , vitantes aestatem , *Aph.* IV. 7.

Melancholicos uberius deorsum purgabis . *Aph.* IV. 9.

Praegnantes purgandae , si materia turgeat , quadrime-
stres , & usque ad septimum mensem : hae vero mi-
nus . Iuniores autem , & seniores foetus , caute vita-
re oportet . *Aph.* IV. 1.

RATIONE MORBI , eiusque SYMPTOMATVM .

In acutis affectionibus raro , & in principiis , purgante
utendum ; atque hoc diligenti prius adhibita cautione
faciendum , *Aph.* I. 24.

Incipientibus morbis , si quid movendum videatur ,
move : vigentibus vero , quiescere melius est . *Aph. II. 29.*

Purgandum in valde acutis , si turgeat materia , eadem
die : morari enim in talibus , malum est . *Aph. IV. 10.*

Concocta purgare , & movere oportet , non cruda : ne-
que in principiis , nisi turgeant . Plurima vero non
turgent . *Aph. I. 22.*

Dolores infra septum transversum , qui purgatione egent ,
deorsum purgante opus esse , indicant . *Aph. IV. 18.*

Quibus egestionis , si stare permiseris , & non moveris ,
subsident veluti ramenta , his confert , alvum inferne
purgari . *Aph. VII. 67.*

Sudor multus , calidus aut frigidus , semper fluens ,
humidi redundantiam habere significat . Educere igitur
oportet , robusto quidem , superne : debili vero ,
inferne . *Aph. VII. 61.*

Mulieri menses decolores , neque secundum eadem
(tempus & modum) semper prodeuntes , purgatione
opus esse , significant . *Aph. V. 36.*

Non febricitantibus , si fiat tormen , & genuum gravi-
tas , & lumborum dolor , deorsum purgante opus
esse indicat . *Aph. IV. 20.*

CONTRAINDICANTIA .

RATIONE TEMPORIS ANNI .

Tempus aestivum . *Aph. IV. 7.*

Sub Cane , & ante Canem , difficiles sunt purgationes .
Aph. IV. 5.

RATIONES STATUS SANI .

Qui sana habent corpora , pharmacis purgati cito exsol-
vuntur ; ut & qui pravo utuntur cibo . *Aph. II. 36.*

Qui bene valent corpore , purgati sunt difficiles . *Aph. II. 37.*

Elleborus periculosus est sanas carnes habentibus ; con-
vulsionem enim inducit . *Aph. IV. 16.*

RATIONE STATUS AEGRI .

Materia morbi cruda . *Aph. I. 22.*

Mor-

Morbi vigor. *Aph. II. 29.*

Quae iudicantur, & iudicata sunt perfecte. *Aph. I. 20.*

Qui nigra vomitione refundunt, cibos averfantur, desipiunt, & pubem nonnihil dolent, cum aspectu feroci, & clausis oculis, eos medicamentis purgare, tutum non est. *Prædict. I. 71.*

Neque vero subtumidos, aut tenebricosa vertigine vexatos, aut eos, qui vel leviter moti animo deficient, aut cibos averfantur, & decolores sunt; ut nec eos, qui in febre exsoluti, aut fracti decumbunt, si sopore tententur, purgatione adgredi, tutum est. *Ibid.*

Partes ad umbilicum, & imum ventrem, tenues & eliquatas habere, periculosum est, ad infernas purgationes. *Aph. II. 35.*

Minime purgandi sunt raucedinosi, lienosi, asthmatici, & sicca tussi laborantes, icterici, stranguria affecti, & quibus alvus cruda delicit, & qui haemorrhagiam patiuntur. *De Victu acut.*

REGVLAE quaedam THERAPEVTICAE GENERALES. In purgationibus talia e corpore sunt ducenda, qualia etiam sponte prodeuntia utilia sunt: contrario autem modo prodeuntia, sistenda. *Aph. IV. 2.*

Quae ducere oportet, quo maxime vergant, eo ducenda, per loca convenientia. *Aph. I. 21.*

Vbi ad animi deliquium ducere oportet, hoc etiam faciendum, si aeger sufficiat. *Aph. I. 23.*

Corpora ubi quis purgare voluerit, facile fluentia reddere oportet. *Aph. II. 9.*

Vbi biberit quis elleborum, ad motiones quidem corporum magis ducit. Ad somnos vero, & quietem, minus. Declarat autem & navigatio, quod motus turbat corpora. *Aph. IV. 14.*

Quando vis magis ducere elleborum, moveto corpus. Quando vero cessare, somnum facito, & non moveto. *Aph. IV. 15.*

Bilioſis medicamenta cholagoga danda, pituitosis phle-

gmagoga, melancholicis melanagoga, hydropicis hydragoga. *De Affect.*

CRITERIA PVRGATIONIS BONAE.

Quae prodeunt, non copia sunt aestimanda, sed si prodeant, qualia oportet, & facile ferat. *Aph. I. 23.*

Si, qualia purgari oportet, purgentur, confert, & facile ferunt: si vero contraria, difficulter. *Aph. I. 25. IV. 3.*

CRITERIA PVRGATIONIS NOXIAE.

Si non purgentur, qualia oportet, & difficulter ferant. *Aph. I. 25. IV. 3.*

Purgationi immodicae convulsio, aut singultus superveniens, malum. *Aph. V. 4.*

Convulsio ex elleboro, lethale. *Aph. V. 1.*

A purgantis potione convulsio, lethale. *Aph. VII. 25.*

Si senioribus nimium purgatis, singultus superveniat, non bonum. *Aph. VII. 41.*

In omni superflua purgatione, frigus cum sudore, exitialis. Et inter haec, qui subinde vomunt, & siticulosi sunt, male habent. Qui vero anxietate laborant, cum lumborum dolore, iis alvus humectatur. *Coac. 568.*

Ex epoto veratro, praerubrorum, & nigrorum purgationes, vitiosae. Virium exsolutio cum talibus, mala est. *Coac. 569.*

CONF. EVACUATIO, VOMITVS.

PVS. SVPPVRATIO.

AD DIAGNOSIN.

Pus optimum est, album, aequale, & leve, & quam minimum graveolens: huic autem contrarium, pessimum. *Praenot. 41.*

Circa puris generationes, dolores & febres magis accidunt, quam ipso facto. *Aph. II. 47.*

AD PROGNOSIN.

Qui suppurati uruatur, aut secantur, siquidem purum est.

effluat pus, & album, evadunt. Si vero subcruentum, & coenosum, ac graveolens, pereunt. *Aph. VII. 44.*

Qui ad hepar suppuratum uruntur, (aut secantur) si- quidem purum effluat pus, & album, superstites e- vadunt: ipsis enim pus est in tunica. Si vero ef- fluat, velut amurca, pereunt. *Aph. VII. 45.*

Si pus ad articulum accedat, eum indurari necesse est. *Praediſt. II.*

Quibus specillum a pure, velut ab igne, coloratur, ii fere moriuntur. *Coac. 410.*

CONF. ABSCESSVS, EMPYEMA, PERIPNEV-
MONIA, PLEVRITIS, VOMICA.

PVSTVLAE.

AD DIAGNOSIN.

Pustulae ulcerosae vere nascuntur. *Aph. III. 20.*

AD PROGNOSIN.

Pustularum eruptiones, velut summa cute leviter lace- rata, aut vellicata, totius habitus tabem, & cor- ruptionem denunciant. *Coac. 444.*

Quibus ad articulos praeerubrae pustulae superficiales e- natae sunt, ac subinde rigent, iis velut ex acceptis plagis, cum dolore venter, & inguina rubescunt, & pereunt. *Coac. 489.*

Quibus falsa sputa cum tussi subsistunt, iis corpus ve- lut efflorescentibus pustulis rubescit, ante obitum vero exasperatur. *Coac. 243.*

RAVCEDO.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Tempus vernale, & hiemale. *Aph. III. 20. 23.*

Autumnus pluviosus, & austrinus, post aestatem siccam, & aquiloniam. *Aph. III. 13.*

AD PROGNOSIN.

Raucescines & gravedines in valde senibus, non coquantur. *Aph. II. 40.*

Ex infania, in raucescinem cum tussi fit secessio. *Coac. 484.*

Raucitas cum tussi, & alvo liquida, pus educit.

Coac. 414.

Hepatico colliquatio, cum raucescine, malum portendit, idque praecipue, si cum quadam tussi contingat. *Coac. 447.*

RECIDIVA.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Febricitanti, nisi in diebus imparibus dimiserit febris, reverti solet. *Aph. IV. 61.*

Febres si alio die, quam indicatorio desierint, recidivam metuere oportet. *Coac. 80.*

Quae in morbis post crism relinquantur, recidivas facere solent. *Aph. II. 12.*

NOTAE ANTECEDENTES.

Morborum reversionibus tentantur, quibus citra febrem vigiliae vehementes, aut turbulenti somni adveniunt, aut corporis robur solvitur, aut singulorum membrorum dolores adsunt, & quibus febres, non accedentibus solutionis signis, neque diebus indicatoriis quiescunt. *De Indicat. 56.*

Quod si deficiente febre, & accedente sudore, urinam fulvam, albam subsidentiam continentem reddiderint, his eodem die febris reversionem sperato. *Ibid. 57.*

At si iudicatione facta, urina rubra subsidentiam rubram continens reddita fuerit, his quoque febris reversio eodem die contingit, ex eaque pauci servantur. *Ibid. 58.*

Vrina returbida, cum sudore, morbi reversionem significat. *Coac. 582.*

Febricitanti urina densitatem habens divulsam, morbi reversionem, aut sudorem portendit. *Coac. 593.*

AD

AD PROGNOSIN.

Quibus saepius recidivae contingunt, si sextum mensem superaverint, in tabem coxariam fere incidunt. *Coac.* 144.

Crebrae, iisdem perseverantibus casibus, morborum reversiones, imminente iudicatione sanguinem profundentes, nigram vomitionem excitant. Quin etiam tremulos aegros faciunt. *Coac.* 122. 571.

Purulentos moderatius habentes, si sputa graveolentia consequantur, recidiva interimit. *Coac.* 406.

REGIO.

AD PROGNOSIN.

Regionum mutationes epilepticis pueris liberationem faciunt. *Aph.* II. 45.

AD THERAPIAM.

In ratione victus concedendum aliquid & consuetudini, & tempestati, & regioni, & aetati. *Aph.* I. 17.

Respicere oportet & regionem, & tempestatem, & aetatem, & morbos, in quibus convenit evacuatio, aut non. *Aph.* I. 2.

Regionem mutare in morbis longis, confert. *Epid.* VI.

REGIUS MORBUS, *vid.* ICTERUS.

REMEDIA, *vid.* MEDICAMENTA.

REMISSIO.

His, quae non secundum rationem levant, credere non oportet; neque timere valde, quae praeter rationem sunt prava. Multa enim horum sunt inconstantia, nec admodum permanere, neque durare solent. *Aph.* II. 27.

Quae cum malignis signis allevamentum adferunt, & quae cum bonis non remittunt, molesta sunt & difficilia. *Coac.* 48.

RENVM AFFECTIO, *vid.* NEPHRITIS.

RE.

REPLETIO.

AD PROGNOSIN.

Repletio convulsionem facit. *Aph. VI. 39.*

AD THERAPIAM.

Facilius est repleri potu, quam cibo. *Aph. II. 11.*

Repletiones ad extremum progressae, difficiles sunt. *Aph. I. 4.*

Non satietas, non fames, neque aliud quidquam bonum est, quod naturae modum excedat. *Aph. II. 4.*

Multum & derepente replere, periculosum est. *Aph. II. 51.*

A repletionem quicumque fiunt morbi, evacuatio sanat: & quicumque ab evacuatione, repletio. Et aliorum contrarietas sanat. *Aph. II. 22.*

RESOLVTIO NERVORVM, vid. PARALYSIS.

RESPIRATIO. SPIRITVS.

AD DIAGNOSIN.

Spiratio frequens & parua, aut inflammationem, aut dolorem principalium partium indicat. *Coac. 270.*

Spiratio magna, & ex longis intervallis, delirium, aut convulsionem significat. *Ibid.*

In his, qui ad septimum progressi sunt, cum coloris foedatione, inter ambulandum spiratio coacervata, & terrae appetentia, sanguinis corruptionem, ac virium exsolutionem denunciant. *Coac. 339.*

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Facilis spiratio in omnibus morbis, qui cum febre acuta infestant, & in 40. diebus iudicantur, magnum habere ad salutem momentum, existimanda est. *Coac. 260. Praenot. 21.*

DETERIORIS NOTAE.

Respirationes luctuosae, in acutis affectionibus, quae cum febre sunt. *Aph. VI. 54.*

Spiritus offendens, in febribus. *Aph. IV. 68.*

LE-

LETHALIS.

Difficultas spirandi , cum delirio , in febre non intermittente . *Aph. IV. 50.*

Spiritus frigidus . *Coac. 260.*

Spiritus febriculofus , & fuliginofus , frigido tamen minus . *Ibid.*

Spiritus magnus foras expiratus , parvus vero intro ; & parvus foras , magnus vero intro . *Ibid.*

Pessimus , ad mortemque proxime accedit , & qui protensus est , ac urgens ; & obscurus , duplicataque intro revocatio , qualis inspirationem conducantibus . *Ibid.*

Spiritus magnus , & concitatus , cum urinis nigris , &c. in acutis . *Coac. 49.*

Respiratio , velut iis qui suffocantur , conspicue elata , & visui expofita , in vocis defectione . *Coac. 252.*

Quibus spiritus retrahitur , & vox strangulabunda est , iis cervicis vertebra intro defidet , & ad exitum , velut ex convulfione quadam , respiratio ducitur . *Coac. 266.*

NOTAE ALIUS MORBI FUTURI.**ABORTVS.**

Spirationes fufpiriofae , quae foras educuntur , ac citra rationem facta colliquatio , in uterum gerentibus . *Coac. 519.*

Quae fufpiriofae fpirationes foras educuntur in febribus . *Coac. 540.*

DELIRII.

Num respiratio fuffocativa , in vocis defectione ? *Coac. 252.*

HYDROPIIS SICCI.

Spirationes , quae nonnifi erecta cervice ducuntur , hydropem ficcum faciunt . *Coac. 424.*

PAROTIDVM.

In bile redundantibus , magna fpiratio cum febre acuta , & praecordiorum contentione . *Coac. 126. 290.*

TABIS.

Vbi horror in malis fubinde incidit , cum difficultate fpirandi , *Coac. 17.*

In

Intestinorum levitates , cum spirandi difficultate , & pectoris morfu . *Coac.* 469.

RESPONSIO .

Ab homine moderato , ferox & audax responsum , malum portendit . *Praedict.* I. 44.

RIGOR .

AD DIAGNOSIN .

CAUSAE ANTECEDENTES .

Frigidum . *Aph.* V. 17. 20.

Sanguinis eruptio . *Praedict.* I. 151.

Epotum veratrum . *Coac.* 570.

Quae praegnantēs ante partus laborarunt , subinde rigore corripī solent . *Coac.* 545.

NOTAE ANTECEDENTES .

Horroris & lassitudinis sensus , capitis gravitas , cum cervicis dolore , muliebres purgationes deiciunt .

Quod si quid huiusmodi circa iudicationem , cum tussicula contingat , subinde rigorem adfert . *Coac.* 548.

Vrinae tenues , nubeculam quandam in medio assumentes , rigorem denunciant . *Coac.* 532.

NOTAE COMITANTES .

Quibus rigor adest , iis urina restitat . *Coac.* 29.

Rigores incipiunt , mulieribus quidem ex lumbis magis , & per dorsum ad caput . Viris autem postica magis parte , quam antica corporis , velut ex cubitis , & femoribus . *Aph.* V. 69.

AD PROGNOSIN .

MELIORIS NOTAE .

A febre ardente detento , rigore superveniente , solutio fit . *Aph.* IV. 58. *Coac.* 135.

Quibus in febribus quotidie rigores sunt , quotidie febres solvuntur . *Aph.* IV. 63.

In febre cum sudore, &c. subinde obortus rigor, denominari non debet. *Coac.* 253.

Quae ex rigore fiunt vocis defectiones, tremore solvuntur; atque eos, qui subinde novo rigore corripiuntur, succedentes tremores iudicant. *Coac.* 27.

Liberalium ab initio sanguinis eruptionum cursum, rigor sistit. *Praedict.* I. 150.

DETERIORIS NOTAE.

Continentes in praecipitibus malis rigores, malo sunt. *Coac.* 21.

Qui rigores ex dorso proficiscuntur, graviores sunt, & molestiores. Vbi vero quis 17. die rigore correptus, 24. die insuper riguerit, difficulter habet. *Coac.* 11.

Quibus per febres 6. die rigores fiunt, difficulter iudicantur. *Aph.* IV. 29. *Coac.* 15.

Rigores ubi sanguinis eruptioni succedunt, diuturni sunt. *Praedict.* I. 151.

Quibus 5. die liberales sanguinis profusiones contingunt, & 6. die novo oborto rigore corripiuntur, 7. perfrigerationibus tentati, celeriter recalescunt, iis alvi male afficiuntur. *Coac.* 329.

Subabsurdus est, qui cum iudicatione rigor fit. *Coac.* 321.

In rigore familiares non agnoscere, malum. Malum quoque, eorum, quae gesta sunt, oblivisci. *Coac.* 6.

Rigores, velut in iis febribus, quae propius ad tertianarum naturam accedunt, si in medio ingravescunt, febre nullum ordinem servante, maligni valde sunt. *Coac.* 26.

Rigores cum sopore, nonnihil periculi denunciant. *Coac.* 7.

A multo potu rigor, & delirium, malum. *Aph.* VII. 7.

Rigores multi, cum torpore, malignum quiddam denunciant. *Coac.* 14.

Quibus ex posteriore parte ossibus fractis, capitis dolor inest, vehemens & crassa e naribus fluxio, malo est. Si, dolore antea ad oculum suborto, rigore corripiuntur. *Coac.* 188.

Ante

Ante partus subinde rigore corripitur, & citra dolorem parere, periculum indicat. *Coac.* 538.

Puerperis, si purgamenta subsistant, rigor inimicus est. *Coac.* 516.

Rigor in phrenitide, post albicantem deiectionem, ac torporem, pessimus. *Coac.* 91.

LETHALIS.

Si rigor incidat feбри non intermittenti, debili iam existenti aegro, lethale. *Aph.* IV. 46. *Coac.* 9.

Quae in convulsione vexatis, cum rigore, & febre ingravescunt, perniciem denunciant. *Coac.* 26.

Qui ex rigore perfrigent, cum capitis ac cervicis dolore, vocis defectione, ac tenui sudore, ubi vires resumpserint, ac sese velut recollerint, moriuntur. *Coac.* 1.

Qui crebro tenuiter exsudant, ac subinde rigent, ii perniciose habent, & tandem sub mortem suppurati, & alvum conturbatam habere deprehenduntur. *Coac.* 10.

Rigor cum posteriorum partium distensione, mortem adfert. *Coac.* 23.

Virium exsolutiones ex rigore, cum capitis dolore, perniciem denunciant. Cruentae in his urinae, malo sunt. *Coac.* 22. 28.

Ex rigore vox intercepta, perniciem denunciat. *Coac.* 39.

Febribus & lassitudinis sensu detento, cum oculorum perversione, rigor perniciem minatur. Atque in huiusmodi casibus soporati, malum denunciant. *Praedict.* I. 89. *Coac.* 221.

Vocis defectiones rigore subinde correptis, lethales, fereque ii capitis dolore conflictari solent. *Coac.* 255.

Ex his, qui cum perniciē consumpti sunt, nonnulli ante mortem subinde rigoribus corripiuntur. *Coac.* 443.

CONVULSIONEM PORTENDENS.

Qui subinde rigore prehendantur, & sub noctem, aliquanto

quanto gravius habent, pervigiles, in somnis nugantes ac delirantes, interdum se lotio perfundentes, ii in convulsionem tendunt. *Coac.* 20. *Praedict.* I. 101.

Urinae, quae cum rigore restitarunt, malum & convulsionem praenunciant, tum vero praecipue, si antea alto sopore aeger detentus fuerit. In his autem abscessus ad aures sperare oportet. *Coac.* 25.

AD THERAPIAM.

Calidum rigores mitigat. *Aph.* V. 22.

CONF. FEBRIS, FRIGVS, HORROR.

RVBOR.

AD DIAGNOSIN.

Narium rubores, alvi liquidae, & diffuentis sunt indicia, *Coac.* 215.

AD PROGNOSIN.

Quibus praegnantibus, tabi opportunis, faciei rubor exoritur, hunc stillationes e naribus avertunt. *Coac.* 524.

In febribus, ex praegresso dolore rubores ad aures subnascentes, ignis sacri in facie spem faciunt. Quin & convulsionem, cum vocis privatione, & virium exsolutione, ad haec consequi par est. *Coac.* 200.

Alvus perturbata, cum frequenti desidendi labore, maxillas intendit, rubores etiam faciei solvit. *Coac.* 616.

RVCTVS.

AD DIAGNOSIN.

Acidum ructantes non admodum pleuritici fiunt. *Aph.* VI. 33.

AD PROGNOSIN.

In diuturnis intestinorum levitatibus, ructus acidus superveniens, qui prius non fuit, signum bonum. *Aph.* VI. 1.

Qui-

Quibus ructus adsunt, flatus, ventris sonitus, cum inflatione, iis alvus exturbatur. *Coac.* 142.

SALIVA.

Quos stomachi fastidia vexant, cum oris ventriculi morfu, & crebra sputatione, iis vomitio adfutura est. *Coac.* 142.

Qui vomituri sunt, iis antea os crebra salivatione impletur. *Coac.* 565.

Pallidis, gracilibus, & crebra oris salivatione laborantibus, in somnis sudores, boni sunt. *Coac.* 271.

SANGVIS.

Si in ventrem sanguis effusus fuerit praeter naturam, necesse est suppurari. *Aph.* VI. 20.

CONF ALVI DEIECTIO SANGVINEA, HAEMORRHAGIA, HAEMOPTYSIS, MICTVS CRVENTVS, VOMITVS CRVENTVS.

SATIETAS.

Non satietas, non fames, neque aliud quidquam bonum est, quod naturae modum excedat. *Aph.* II. 4.

SATYRIASMVS.

Aetas puerorum ipsi obnoxia. *Aph.* III. 26.

SECESSVS, *vid.* ALVI DEIECTIO.

SECVNDINAE.

Vt secundae excident, sternutatorio indito, nares & os apprehendere oportet. *Aph.* V. 49.

SEDES.

AD DIAGNOSIN.

Sedes autem procidit, viris quidem, quibus ora venarum sanguinem fundunt, (haemorrhoidas vocant) & alvi fluxus corripit; pueris quoque calculosis; & in diu.

diuturnis ac sinceris intestinorum difficultatibus; senibus vero, quibus mucosae quaedam concretiones affixae sunt. *Praedit. II. 129.*

AD PROGNOSIN.

Quae circa sedem cum dolore suppurant, alvum con-
turbant. *Coac. 630*

In longis periculis, sedis dolor mortem adfert. *Coac. 711.*

Dolor capitis, cum sedis ac pudendorum dolore, tor-
porem ac impotentiam adfert, vocemque exsolvit,
neque ista molestiam exhibent. Verum ex his somno-
lenti, ac singultuosi nono mense evadunt, & voce
libera reddita in integrum restituantur. *Coac. 164.*

AD THERAPIAM.

Sedi calidum amicum, frigidum vero inimicum. *Aph.
V. 22.*

SEMEN.

Quibus nares natura humidiores, & genitura humidior,
imperfectius sani sunt: quibus vero contraria, per-
fectius. *Aph. VI. 2.*

SENES, *vid. AETAS.*

SEPTVM TRANSVERSVM, *vid. DIAPHRAGMA.*

SICCITAS, *vid. ANNI TEMPESTAS.*

SIDERATIO, *vid. APOPLEXIA.*

SIGNA IN GENERE.

SALVTIS.

Qui paucissimo tempore sani futuri sunt, iis in totum
maxima signa contingunt; ii enim citra dolorem, &
periculum perseverant, noctu dormiunt, ceteraque
securitatis signa praefereunt. *De Indicat. 8.*

Qui ex morbo superfuturi sunt, facile spirant, dolore
vacant, noctu dormiunt, aliaque securitatis signa ha-
bent. *Praenot. 126.*

Aegrum facile converti oportet, & dum surgit, levem
esse. *Coac. 493.*

Optimum vero, totum corpus aequè calidum, & molle esse. *Coac.* 492.

PERICVLI.

Gravitas, quae totum corpus, vel manus ac pedes premit, vitiosa est. *Coac.* 492.

Caput, pedes, & manus frigidas esse, ventre & lateribus, calentibus, mali morbi signum est. *Coac.* 492.

Qui temere, ac praeter rationem, nulla existente vaforum inanitione, impotentes fiunt, si male habent. *Coac.* 54.

MORTIS.

His, qui brevi perituri sunt, maxima signa per initia contingunt. Nam & difficilem habent spirationem, neque noctu dormiunt, & periculi plena signa ostentant. *De Indicaz.* 52.

Perituri difficultate spirandi vexantur, delirant, vigiliant, ceteraque pessima signa habent. *Praenot.* 127.

Quae perniciem minantur, ea si absque ulla significatione alleviant, mortis periculum denunciant. *Praedict.* I. 52.

SINGVLTVS.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Repletio, aut evacuatio. *Aph.* VI. 39.

Hepati inflammato singultus supervenit. *Aph.* V. 58.

NOTAE ANTECEDENTES.

Variae. *Coac.* 164.

Num concitatus & magnus spiritus, aut geniturae similis excretio prodiens, in sopore coarctatis? &c. *Coac.* 166.

Venae temporum pulsantes in febribus, & facies bene habita, absque praecordiorum mollitie. *Coac.* 128.

AD PROGNOSIN.

NOTAE SALVTARES.

A singultu detento sternutationes supervenientes, solvunt singultum. *Aph.* VI. 13.

NO

NOTAE PERICULI.

Ab hepatis inflammatione singultus, malum. *Aph. VII.*
17.

A sanguine multo effuso. *Aph. V. 3.*

A purgatione immodica. *Aph. V. 4. VII. 41.*

A vomitu. *Aph. VII. 3.*

A morbo regio. *Coac. 490.*

Singultus cum lassitudine, & alto stupore. *Coac. 45.*

Vocis defectiones, cum singultu, pessimae. *Praedict. I. 230.*

NOTAE LETHALES.

Desipientia cum difficultate spirandi, & singultu, mortem adfert. *Coac. 49.*

Singultus, & uterorum procidentia, post molestias ex albis mordacibus, post partum. *Coac. 526.*

SITIS.

AD DIAGNOSIN.

Quibus diu tussis siccae, paulum irritantes, in febribus ardentibus, non admodum siticulosi sunt. *Aph. IV. 54.*

Qui in purgantium potionibus non sitiunt, dum purgantur, non cessant, priusquam sitiverint. *Aph. IV. 19.*

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Quibus bibendi appetentiae noctu, iis valde sitientibus, si obdormierint, bonum. *Aph. V. 27.*

Siti vacare, in morbis pulmonum. *Coac. 393.*

DETERIORIS NOTAE.

In praecipitibus malis, si sitis temere, ac praeter rationem cesset, malo est. *Praedict. I. 57.*

Vehementem sitim esse, in morbis pulmonum. *Praedict. 102.*

LETHALIS.

Sitis, cum externis frigidis, internis vero urentibus, in febribus non intermittentibus. *Aph. IV. 48. VII. 72.*

AD THERAPIAM.

Lac dare siticulosus, malum. *Aph. V. 64.*

Quoscunque sitis corripuerit, his & cibi, & labores detrahendi sunt, & vinum bibant aquosum, & quam frigidissimum. *De Sal. Diet. XIII. 1.*

SOMNIA, *vid. INSOMNIA.*

SOMNVS.

AD DIAGNOSIN.

Somni hieme longissimi. *Aph. F. 15.*

Qui (in dentitione) saepe cruenta, ac cruda per alvum egerunt, plurimi in febre somniculosi sunt, *De Dentit. II. 12.*

Sugentes, qui multum lactis adsumunt, utplurimum somniculosi sunt. *De Dentit. III. 13.*

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Somnus iuvans. *Aph. II. 1.*

Vbi somnus delirium sedat, bonum. *Aph. II. 2.*

Ex capitis dolore, interdum somnus liberat. *Coac. 172.*

Noctu dormiendum, interdiu vigilandum, contra vero, malum. *Coac. 497. Praenot. 53. 54.*

Minimum offendit, si quis matutino tempore ad tertiam diei partem dormiat. *Coac. 497. Praenot. 54.*

Quibus vehemens mentis emotio, ex metu, cum perfrigeratione contingit, febres cum sudoribus, & somni sermonem omnino intercipientes, haec solvunt. *Coac. 483.*

Profundi somni, neque turbulenti, iudicii firmitatem denunciant. *Coac. 151.*

Somnus confert in convulsione. *Coac. 358.*

DETERIORIS NOTAE.

Somnus, vigilia, utraque modum excedentia, malum. *Aph. II. 3. VII. 71.*

Qui post tertiam diei partem somnus accedit, malus. *Coac. 497. Praenot. 55.*

Pessimum est, si somnus neque noctu, neque interdiu,

accedit. Id enim ob dolorem, laboremque accidit, vel delirium fore significatur. *Coac.* 497. *Praenot.* 56.
 Somni turbulenti, non sine corporis offensione, instabiles sunt, & infirmi. *Coac.* 151.
 In praecipiti malo, somnus turbulentus, (una cum aliis signis) nihil boni denunciat. *Coac.* 227.

LETHALIS.

Quo in morbo somnus laborem facit, lethale: si vero somnus iuvet, non est lethale. *Aph.* II. 1.
 Et tenebrosa vertigine laborans, & lucem averfans, & somno ac ardore multo detentus, desperatus. *Aph.* VIII. 15.

CONVULSIONEM PRAESAGIENS.

In praecipitibus malis, corporis motio, iactatio, ac turbulentus somnus, nonnullis convulsionem portendit. *Coac.* 82.

Turbulenta, & valde confidentes e somno exsurrectiones, convulsionem minantur, praesertim vero, si cum sudore contingant. *Praedict.* I. 112.

Somnus multus (una cum aliis signis) convulsionem minatur, & frontis gravitates, ac mistio molesta est. *Coac.* 348.

SOPOR.

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Sopore, lassitudine, ac surditate tentatos, alvus erumpens, & ad indicationem rubra demittens, iuvat. *Coac.* 182.

Alvus perturbata, saesuginosa demittens, una cum febre, non admodum sopore & torpore oppressos, consequitur. *Coac.* 641.

DETERIORIS NOTAE.

Sopor profundus & altus, omnino damnandus est. *Coac.* 178. *Praedict.* I. 63.

Ex praecordiorum dolore abortae febres, malignae sunt.

In his profundus ac altus sopor, pessimus. *Coac.* 31.

In sopore affectis aegris, spumantibus prodeuntibus dejectionibus, febris acuta ingravescit. *Praedict.* l. 93.

Rigores cum sopore, nonnihil periculi denunciant.

Coac. 7.

Delassati aegri, caligine obducti, pervigiles, & sopore detenti, cum tenui sudore recalescentes, male habent. *Coac.* 35.

Quibus sopore conflictatis, fatuitate & alto stupore (quem *catochon* vocant) detentis, praecordia variant, ac venter in tumorem praeter naturam sublatus est, cum ciborum fastidio, ac alvi interceptione, tenui circa caput & thoracem abortivo sudore. *Coac.* 186.

LETHALIS.

Somni, quales sopore oppressis, & totius corporis perfrigerationes, perniciem ostentant. *Coac.* 181.

Qui inter initia sopore detenti, capitis, lumborum, cervicis, praecordiorum dolore, ac insomnia conflictantur, considerandi, num phrenitici evadant. In his narium stillatio perniciem ostendit, tum vero vel maxime, si 4. die, aut inter initia contingat. Alvi quoque praerubra proluvies, malo est. *Coac.* 179.

Qui sopore oppressi circa initia, tenuiter exsudantes, concoctas urinas emittunt, cum magna corporis aestuatione, citra iudicationem vero perfrigescunt, & rursus ex brevibus intervallis peruruntur, torpore, sopore, aut convulsione tenaci, perniciose affecti sunt. *Coac.* 180.

SOPOR ALIVM MORBVM PORTENDENS.

CONVULSIONEM.

Desipientiae cum sopore, convulsiones minantur. *Coac.* 34.

Capitis dolor, cum sopore, & gravitatis sensu, quodammodo convulsionem accersit. *Coac.* 174.

Urinae, quae cum rigore resistunt, malum, & convulsionem praenunciant, tum vero praecipue, si antea alto

sopore aeger detentus fuerit. In his autem abscessus ad aures sperare oportet. *Coac. 25. Praedict. I. 155.*

Qui sopore, corporis inquietudine, praecordiorum dolore affliguntur, cum frequenti & pauca sputatione, iis tubercula ad aures exoriuntur; ac fortassis sopore tentati, ad aliquam convulsionem deveniunt. *Coac. 185.*

PAROTIDES.

Qui sopore detinentur, cum corporis incontinenti iactatione, praecordiorum dolore, & vomitione, in iis tuberculorum ad aures exortum sperare oportet. *Praedict. I. 165. Coac. 183.*

Sopor, cum surditate, capitis dolore, & ascaridibus. *Coac. 165.*

Iis, qui sopore detinentur, tumores ad aures sperare oportet. *Coac. 209.*

TABEM.

Crebrae, & quae cum sopore quodam consistunt vocis defectiones, tabem denunciant. *Coac. 259.*

VOMITVM NIGRVM.

In his, qui variè morbum trahunt, & mente moventur, si subinde sopor incidat, praenuncia expectandam esse nigram vomitionem. *Coac. 103.*

SPASMVS, vid. CONVULSIO.

SPINALIS MEDVLLA, vid. MEDVLLA.

SPIRITVS, vid. RESPIRATIO.

SPIRANDI DIFFICVLITAS, vid. ASTHMA.

SPLEN, vid. LIEN.

SPVMA ORIS.

Ex iis, qui strangulantur, & resolvuntur, nondum autem sunt mortui, non se recolligunt, quibus spuma circa os fuerit. *Aph. II. 43.*

SPVTATIO.

AD PROGNOSIN.

Tussiculae, quae cum crebris oris sputationibus praecedunt, tubercula ad aures emollunt. *Coac. 204.*

Sputatio crebra, vomitionis instantis signum. *Coac.* 566. 142.

Crebra sputatio, cum vehementi insania, & tremore, phrenitidem portendit. *Coac.* 94.

Crebrae in phreniticis, cum perfrigeratione, sputationes, nigrorum vomitionem praenunciant. *Coac.* 102.

CONF. SALIVA, SOPOR, PHRENITIS.

SPVTVM.

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Cum convulsionibus, & sudore febrienti, defluentia sputa minime mala sunt. *Coac.* 350.

Ex capitis dolore liberat pus e naribus effluens, aut sputa crassa, & inodora. *Coac.* 172.

In omnibus laterum, & pulmonum morbis, sputum prompte, ac cito excreari necesse est, flavumque sputo permixtum esse. *Coac.* 390. *Praenot.* 86. *Aph.* I. 12.

Sputum flavum, cui paulum sanguinis admixtum est, initio salutem pollicetur. *Coac.* 390. *Praenot.* 95.

Sputa mucosa & fuliginosa, tum celeriter colorantur, tum securiora sunt. Quae vero intra 5. diem, dum coctionem accipiunt, colorantur, meliora sunt. *Ibid.*

Omnium, quae excreantur, optima, quae dolorem sedant. *Praenot.* 98. *Coac.* 391.

DETERIORIS NOTAE.

In pulmonis & laterum doloribus, si multo post doloris initium, quod flavum est, aut fulvum, aut multam tussim exhibeat, neque valde permixtum expuatur, deterius est. *Praenot.* 87. *Coac.* 390.

Sputum flavum, cui paulum sanguinis admixtum est, quod 7. die, aut longiore spatio tale apparet, non adeo tutum. *Coac.* 390. *Praenot.* 96.

Omnino praevalum est sputum flavum, si sincerum est, & glutinosum, & candidum, & rotundum, itemque vehementer ex virore pallescens, quodque spumosum est,

est, & lividum, & aeruginosum. Aliquanto vero deterius, quod sic est sincerum, ut nigrum quoque videatur. *Coac.* 390. *Praenot.* 88. 89. 90. 91.

Pravitate etiam indicant & spumantia, & flava, & nigra, & aeruginosa, viscosaque, & quaecunque celeriter colorantur. *Coac.* 390.

Omnia sputa mala sunt, quae dolorem non sedant. *Praenot.* 97. *Coac.* 391.

Sputa viscida, saluginosa, cum raucitate, mala sunt. *Coac.* 413.

In angina laborantibus, subarida sputa, gracilescentibus faucibus, malum praenunciant. *Coac.* 369.

Sputa ex angina viscida, crassa, exalbida, vi educta, malum denunciant, omnisque eiusmodi maturatio mala est. *Coac.* 377.

Excreationes in febribus non intermittentibus, lividae & cruentae, & graveolentes, & biliosae, omnes malae sunt. At probe secedentes bonae. Et eadem ratio est quoad alvi egestionem, & quoad urinas. Si vero nihil ex conducentibus excernatur per haec loca, malum. *Aph.* IV. 47. VII. 69. *Coac.* 242.

Quibus salsa sputa cum tussi subsistunt, iis corpus velut efflorescentibus pustulis rubescit, ante obitum vero exasperatur. *Coac.* 243.

LETHALE.

In morbis laterum, & pulmonum, sputum admodum sanguinolentum, aut quod statim initio livescit, perniciem praefert. *Coac.* 390.

Perniciem denunciant sputa nigra, fuliginosa, aut quibus qualia ex vino nigro fiunt. *Coac.* 407.

In morbo laterali, quibus circa initia in totum purulentae sunt sputationes, ii 3. aut 5. die moriuntur.

Quos si superent, nec longe melius habuerint, 7. aut 9. aut 11. die suppurati fiunt. *Coac.* 379.

Quibus cum bilioso purulentum sputum, aut seorsum, aut simul permixtum educitur, ii ut plurimum 14. die intereunt, nisi malum, aut bonum aliquod, ex his

his quae prius descripta sunt, contingat. Alioquin certe pro ratione mors expectanda est, atque in his praecipue, quibus 7. die sputum huiusmodi procedere coepit. *Coac.* 392.

Hepaticis sputum multum cruentum, sive intus subputridum, sive sincere biliosum fuerit, statim perniciem denotat. *Coac.* 446.

Sputa ex angina subarida, crebra, per tussim, & cum lateris dolore educta, perniciem minantur. *Coac.* 378.

Sputum prunis superfusum graviter olens in tabidis, *Aph.* V. 11. *Coac.* 434.

Sputum retentum in tabidis. *Aph.* VII. 16. 78.

Pus fundum petens, tabidis in aquam marinam expuentibus. *Coac.* 435.

CONF. EMPYEMA, PERIPNEUMONIA, PLEVRITIS, PVS, VOMICA.

SPVTVM SANGVINIS, vid. HAEMOPTYSIS.

STERILITAS.

A corporis raritate, vel densitate, frigidityte vel caliditate, in maribus. *Aph.* V. 63.

Ab utero frigido ac denso, vel praeumido, vel sicco magis & adurente, in feminis. *Aph.* V. 62.

CONF. CONCEPTIO.

STERNUTATIO.

AD DIAGNOSIN.

Sternutatio fit ex capite, percalefacto cerebro, aut perhumectato, quod est in capite, vacuo. Aer enim qui intus est, supra modum, (i. e. vi) effunditur. Strepit autem, quia per angustum ipsi est transitus. *Aph.* VII. 51.

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

A singultu detento sternutationes supervenientes, solvunt singultum. *Aph.* VI. 13.

Mu-

Mulieri ab uterina passione vexatae, aut difficulter parienti, sternutatio superveniens, bonum. *Aphor. V. 35.*

In aliis maxime lethalibus morbis, (praeterquam pulmonum) sternutamenta utilitate non carent. *Praenot. 94. Coac. 399.*

Febricitate incipientibus, sanguinis stillationes cum sternutatione accedentes, & quod in urina desidet album, 4 die visum, 7. solutionem adfore denunciant. *Coac. 149.*

DETERIORIS NOTAE.

In morbis pulmonis, gravedines & sternutamenta, tum praecedere, tum vero succedere, malo est. *Coac. 399. Praenot. 93.*

STRANGVLATIO.

AD PROGNOSIN.

Ad lateris dolorem insuper accedente strangulatu, supurationis futurae spes est. *Coac. 113.*

Ex iis, qui strangulantur, & resolvuntur, nondum autem sunt mortui, non se recolligunt, quibus spuma circa os fuerit. *Aph. II. 43.*

Si a febre detento, tumore in faucibus non existente, suffocatio ex improvise superveniat, lethale. *Aph. IV. 34. Coac. 277.*

In praecipitibus malis strangulatus, gracilescitibus faucibus, perniciem minatur. *Coac. 61.*

STRANGVRIA.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Aetas senilis. *Aph. III. 31.*

Aetas puerilis. *Aph. III. 26.*

Tempus autumnale. *Aph. III. 22.*

Siccitates. *Aph. III. 16.*

Inflammatiō intestini recti, & uteri, & renum suppuration, *Aph. V. 58.*

PAR-

136 STRANG. STRV. STVP. SVD.

PARTES circa VESICAM laborare indicat.

Stranguria, cum mictu cruento, & dolore ad hypogastrium, & perinaeum. *Aph. IV. 80.*

AD PROGNOSIN.

Quibus ex urinae stillicidio volvulus supervenit, in 7. diebus pereunt, nisi febre superveniente urina abunde fluxerit. *Aph. VI. 44.*

Hic morbus senioribus diuturnior, iunioribus autem brevior fit; neutris vero letalis. *De Affect. XXIX. 10.*

AD THERAPIAM.

Urinae stillicidium, & urinae difficultatem, vini potus, & venaesectio solvit. Secundae vero internae (venae.) *Aph. VII. 43.*

Conducit forinsecus quidem corpus balneis calidis molliore, intrinsecus vero humectare: alvum quidem per cibos, a quibus fluida fiat: vesicam vero per potus, a quibus urina quamplurimum diffunditur. *De Affect. XXIX. 2. ad 6.*

STRIDOR, *vid. DENTES.*

STRVMA.

Aetas puerilis ipsi obnoxia. *Aph. III. 26.*

Ab aetate annorum 42. ad annum 63. strumae non fiunt, *Coac. 512.*

STVPOR.

AD PROGNOSIN.

A plaga in caput, stupor, aut delirium, malum. *Aph. VII. 14.*

Torpores & stupores praeter consuetudinem evenientes, adfuturam siderationem denunciant. *Coac. 476.*

Manuum stupor, cum capitis doloribus, & aliis signis, siderationem, aut morbum comitalem, aut etiam obli-
vionem denunciat. *Coac. 161.*

SVDAMINA.

Aestate nascuntur. *Aph. III. 21.*

SVDOR.

AD DIAGNOSIN
CAUSAE ANTECEDENTES.

Sudor multus a somno, citra causam manifestam factus, corpus uberiori alimento uti significat. *Aph. IV. 41.*

Cum aestus sit veri similis, sudores in febribus multos expectare oportet. *Aph. III. 6.*

Bene colorata facies, cum sudoribus diffluentibus absque febre, vetusta stercora subesse, aut inordinatam victus rationem, praesefert. *Coac. 214.*

Quibus ex larga, & frequenti sanguinis eruptione, copiosa sit nigrorum delectio, cum alvi vero suppressione sanguinem profundunt, iis alvus dolore conflatur; una autem cum quibusdam flatibus tolerabilius ferunt. Ac forte hi copiosis, frigidis, & tenuibus sudoribus diffluunt. *Coac. 333.*

Confractae voces post medicamenti purgantis potionem, considerandae num pravae sint. Horum plerisque tennes sudores diffluunt, & alvi humectantur. *Coac. 251.*

A puris intro collectione, cum febris remissione, ut plurimum tennes sudores diffuentes. *Coac. 419.*

Ex lateris morbo, aut pulmonis inflammatione purulentos, circa cervicem & claviculam sudores occupant. *Coac. 402.*

NOTAE ANTECEDENTES.

Quos ex lateris dolore cibi fastidia comitantur, iis os ventriculi aliquantulum dolet, & sudoribus diffluunt. *Coac. 423.*

Urina, quae admodum tenuis spissa evadit, fortasse erupturum sudorem indicat: iam autem erupisse, quae spumam in se ipsam insidentem habet. *Coac. 583.*

NOTAE VARIAE.

Qua corporis parte inest sudor, ibi morbum esse indicat. *Aph. IV. 38.*

Sudor multus intemperate oboriens sano, morbum significat, aestate minorem, hieme maiorem. *De Indicac. 47.*

AD

AD PROGNOSIN.

VARIAE NOTAE.

Sudores cum apparent, vel iudicatu faciles, vel difficiles, vel breves, vel longos morbos fore, indicant. *Aph. I. 12.*

Sudor multus, frigidus aut calidus, semper fluens, frigidus quidem maiorem, calidus vero minorem morbum significat. *Aph. IV. 42.*

Qui aestum sentiunt, & praegressis deiectionibus, tenuibus sudoribus diffuunt, iis febris ingravescit. *Coac. 646.*

SVDOR SALVTARIS.

Sudores febricitantibus si inceperint, boni sunt die 3. & 5. & 7. & 9. & 11. & 14. & 17. & 21. & 27. & 31. & 34. Hi enim sudores morbos iudicant. *Aph. IV. 36.*

Sudores optimi quidem per omnes morbos acutos, qui diebus iudicatoriis contingunt, & penitus febre liberant. *Praenot. 22.*

Sudor optimus sane, qui febrem die iudicatorio tollit. Vitilis autem & qui allevat. *Coac. 572.*

Sudores boni, quicumque toto corpore oriuntur, faciuntque, ut aeger morbum facilius ferre videatur. *Praenot. 23.*

Sudores boni, qui guttatim, & cum exhalatione fiunt. *Praenot. 27.*

Sudores sensim procedentes iuvant. *Coac. 360.*

Sudores in morbis pulmonum laudabiliter fieri, bonum. *Coac. 393.*

Pallidis, gracilibus, & crebra oris salivatione laborantibus, in somnis sudores boni sunt. Nempe quidem & horum plurimos sudore levare non improbandum. Quibus si dolores ad inferiora decumbant, toleratu faciles existunt. *Coac. 271.*

DETERIORIS NOTAE.

Qui sudores non fiunt diebus criticis, laborem significant, & morbi longitudinem, & recidivas. *Aph. IV. 36.*

Sudor una cum febre, acuto morbo urgente, malus. *Coac. 574. Praedict. I. 58.*

Febriticanti sudor superueniens, febre non remittente, malum. Prolongatur enim morbus, & copiosorem humiditatem indicat. *Aph. IV. 56.*

Sudores frigidi cum mitiore febre evenientes, morbi longitudinem significant. *Aph. IV. 37. Praenot. 24.*

Sudores qui non toto corpore oriuntur, & sine euphoria. *Praenot. 23.*

Sudores, qui milii formam referunt, & circa cervicem tantum oboriuntur, pravi. *Praenot. 26.*

Malus sudor frigidus, & ubi caput duntaxat, & cervix infudat. Nam & temporis diuturnitatem, & periculum denunciat. *Coac. 572. Praenot. 24.*

In humecta alvo perfrigeratio cum sudore, vitiosa. *Coac. 647.*

A sudore horror, non bonum. *Aph. VII. 4.*

Qui subinde inhorrescunt, saepe tenui sudore corripiuntur, difficili morbo laborant. *Coac. 13.*

Qui ex sudoribus perfrigerantur, ac celeriter recalescunt, male habere iudicantur. *Coac. 52. Praedict. I. 66.*

Ex sudoribus pervigiles, & ad calorem revocati, male habere iudicantur. *Praedict. I. 68.*

Qui in febre non intermittente, tenuiter & crebro exsudant, cum praecordiorum distensione, ii ut plurimum maligne habent; atque in his dolores in humeri caput ac claviculas affixi, pravi sunt. *Coac. 32.*

In febre tenuiter exsudantes, maligne habent. *Coac. 42.*

Qui per accessiones tussunt, & tenuiter exsudant, ii maligne habere iudicandi sunt. *Coac. 112.*

Sudores tenues, cum oris ventriculi dolore, ac praecordiorum pulsu, & cum febre, in qua totus corporis habitus perfrigeratur. *Coac. 233.*

Qui post sanguinis ex naribus eruptionem, ex tenuibus sudoribus perfrigescunt, male habent. *Coac. 40.*

Quibus adsunt superiorum partium tenues sudores, cum perfrigerationibus, nec sine febre, ii corporis incontinentia, & phrenitide vexati, praeceps periculum denunciant. *Coac. 69.*

Crebri ex dorso horrores, subinde locum commutantes, graves sunt, & difficiles. Laboriosam quippe urinae suppressionem minantur. His tenuiter exsudare pessimum. *Coac.* 8. 46.

LETHALIS.

Sudores frigidi, cum acuta febre evenientes, mortem significant. *Aph.* IV. 37. *Praenot.* 24. 25. *Coac.* 573.

Desipientia, cum difficultate spirandi, & sudore, lethalis est. *Coac.* 89.

In sideratis, ex magna spirandi molestia subortus sudor, mortem adfert. In his rursus, si febris accedat, solutio contingit. *Coac.* 479.

Ex diuturno ventris affectu, vomentibus, biliosis, cibum averfantibus, copiosus sudor obortus, cum repentina virium impotentia, lethalis. *Coac.* 638.

Lethale est, in posteriorum partium distensione sudare, & corpus dissolvi. *Coac.* 361.

In praecipitibus malis, tenues circa caput maxime sudores oboriri, & corporis incontinentia quadam iactari, malum indicat; tum vero praecipue pernicies intenditur, si ista cum urinis nigris contigerint, & spiritus magnus, & concitatus adfuerit. *Coac.* 49. *Praedict.* I. 39.

Qui crebro tenuiter exsudent, ac subinde rigent, ii perniciose habent, & tandem sub mortem suppurati, & alvum conturbatum habere deprehenduntur. *Coac.* 19.

SVDOR ALIUM MORBVM PRAESAGIENS.

ABSCESSVM GINGIVARVM, vel TUBERCULA ad AVRES.

Moderatus capitis dolor, cum inexhausta siti, aut sudore febrem non solvente. *Coac.* 173.

CONVULSIONEM.

Qui per febres tenuiter exsudant, cum capitis dolore, & alvo intercepta, ad convulsiones proni sunt.

Coac. 154. 177.

HAEMORRHAGIAM.

Quibus ubi inhorruerint, indicatorii simul sudores contin-

SVD. SVFF. SVP. SVR. 241

tingunt, postridie vero, si horror repetierit, & temere pervigilent, absque concoctione, iis forte sanguinem erupturum sperare oportet. *Coac.* 24.

VOMITIONEM NIGRAM.

Lingua praeter rationem mollis reddita, ac nauseabunda, cum sudore frigido, ab alvo liquida, nigrae vomitionis significationem adfert; in his lassitudinis sensus malum denunciat. *Coac.* 232.

AD THERAPIAM.

Sudor multus a somno, in homine cibum non capiente, evacuatione indigere significat. *Aph.* IV. 41.

SVFFITVS.

Suffitus aromatum muliebria ducit. Saepius autem etiam ad alia utilis esset, nisi capitis gravitates induceret. *Aph.* V. 28.

SVFFOCATIO, vid. STRANGVLATIO.

SVPERCILIVM.

Eius perversio, in febre non intermittente, una cum aliis signis, lethalis. *Aph.* IV. 49. VII. 73.

SVPERPVRGATIO, vid. HYPERCATHARSIS.

SVPPVRATIO, vid. ABSCESSVS, EMPYEMA, PVS, VOMICA.

SVRAE.

Earum dolores in febre, maligni. *Coac.* 30.

Ad furam dolores, mentis alienationem indicant. *Praedict.* I. 36.

SVRDITAS.

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Quibus biliosae sunt egestionis, furditate superveniente
Q cef-

cessant. Et quibus surditas, biliosis supervenientibus, cessat. *Aph. IV. 28*

Quibus in febre aures obsurduerint, his sanguis e naribus effluens, aut alvus exturbata, morbum solvit. *Aph. IV. 60. Coac. 210.*

In febribus enata surditas, alvum remoratur, & sistit. *Coac. 191.*

In praecipiti malo surditas, sanguinis egestionem solvit. *Coac. 331.*

Quibus cum surditate, & torpore, paucus e naribus sanguis stillat, nonnihil molestiae exhibet, iis vomitus, & alvi perturbatio confert. *Coac. 334. 208.*

Ex nigris vomitibus oborta surditas, noxia non est. *Coac. 559.*

DETERIORIS NOTAE.

In praecipitibus & turbulentis morbis obveniens surditas, malo est. Quin & in longis morbis malum portendit; ac in his ad coxendices labores convehit. *Coac. 190. Praedict. I. 33.*

In praecipiti malo, quae post sanguinis eruptiones, & nigrorum per alvum refusiones, surditas obvenit, malum denunciat. *Coac. 331.*

Gravi surditate tentati, dum aliquidprehendunt tremuli, linguae resolutione, ac torpore affecti, male habere iudicantur. *Coac. 197.*

In tenuioris intestini morbo laborantibus, vomitio & surditas, malo sunt. *Coac. 470.*

LETHALIS.

In praecipiti malo, post sanguinis eruptiones, nigrorum deiectiones, & surditatem enatam, sanguinis egestio perniciem adfert. *Coac. 331.*

Qui capite dolent, cum levi aliqua surditate, manuum tremore, cervicis dolore, nigricantes reddentes urinas, & densas, ii, si nigra vomitione refuderint, perniciose habere suspicandi sunt. *Coac. 176.*

SVRDITAS ALIVM MORBVM PRAESAGIENS.
ALVI DEIECTIONEM SANGVINOLENTAM,
& NIGRAM.

Surditas pus intro colligentibus suborta, sanguinolentam deiectionem denunciat. His sub mortem nigra egeruntur. *Coac.* 420.

HAEMORRHAGIAM NARIVM.

Qui surditate, cum capitis gravitate, ac praecordiorum contensione vexantur, si oculorum acies perturbatur, in iis sanguinis e naribus fluxum sperare oportet. *Coac.* 195.

INSANIAM.

Vomitus virulenti, & aeruginosi, in capitis doloribus, cum surditate, & insomnia, promptam insaniam significant. *Coac.* 169.

In acuta febre, aures obtusae, vehementem insaniam portendunt. *Coac.* 196.

MENTIS EMOTIONEM.

Procedente morbo surditas, ac urina subrubra, cum nullo sedimento, sed cum sublimamentis in medio innatantibus, mentis emotionem praenunciant. *Coac.* 198.

Quibus a partu alba prodeunt, & his subsistentibus surditas cum febre, & lateris dolor acutus excitatur, eae in vehementem & perniciosam mentis emotionem incidunt. *Coac.* 525.

CONF. AUDITVS GRAVITAS, FEBRIS ACUTA.

SVSPIRIA.

Quae suspiriosae spirationes foras educuntur in febribus, abortionis periculum adferunt. *Coac.* 540.

In anhelatoribus & suspiriosis, febris postea acuta, cum praecordiorum contensione perfrigeratis, magnum circa aures tumorem expectare oportet. *Coac.* 107.

SYNCOPE, *vid.* LIPOTHYMIA.

TABES, *vid.* PHTHISIS.

TABES COXARIA.

Quibus saepius recidivae contingunt, si sextum mensem superaverint, in tabem coxariam fere incidunt.

Coac. 144.

TABES DORSALIS.

AD DIAGNOSIN.

Corripit maxime recentes sponfos, & veneri deditos.

De Morb. II. XLIX. 3.

Eius notae: Febris nulla, appetitus bonus, consumptio, superne de capite in spinam velut formicae descendentes, ubi mingitur, aut venter exoneratur, semen genitale profluens multum ac liquidum, genitura in utero non manens, pollutio in somnis, per motum anhelatio ac debilitas, capitis gravitas, & aurium sonitus, temporis progressu febres lypyriae perniciosae. *De Morb. II. XLIX. 4. ad 14.*

AD THERAPIAM.

Ab initio fomenta per totum corpus adhibere, medicamentum sursum purgans bibendum dare, postea caput purgare, deinde deorsum purgans exhibere; postea serum, aut lac asinum bibendum dare. Ceterum bubulum lac per 40. dies bibendum praebere. Ad vesperam, quam diu lac potat, alicam forbendam dare, a cibis autem abstinere. Finito lactis usu, cibis mollibus aegrum reficere, ex modico initium sumendo, & quam maxime crassum ac pinguem facere. Per annum ab ebrietatibus, & venere, & laboribus abstinere, exceptis deambulationibus, vitando tantum frigus, & solem; tepida autem lavare. *De Morb. II. XLIX. 15. ad 30.*

TEMPERAMENTVM, *vid. NATVRA.*

TEMPORA.

Tempora collapsa, cum reliquis notis faciei corruptae, lethale. *Coac.* 212. *Prænot.* 2.

Qui-

Quibus tempora secantur, iis ex adversa sectionis parte convulsio contingit. *Coac.* 498.

Ossium ad tempora effracturae, convulsiones accersere solent. *Coac.* 188.

TENESMVS.

AD DIAGNOSIN.

Vbi apprehenderit, secedit sanguis ac mutus, & dolor sit in ventre inferiore, maxime ubi ad secessum devenit. *De Affect.* XXVII. 1. 3.

AD PROGNOSIN.

Mulieri in utero gerenti, tenesmus superveniens, abortire facit. *Aph.* VII. 27.

Fit ex iisdem, a quibus & dysenteria, verum debilior, & brevis, & non lethalis. *De Affect.* XXVII. 10. 11.

AD THERAPIAM.

Conducit ventrem humectare, & pinguefacere, ac re-
pescere; & quae insunt, subducere, & calida lavare, excepto capite. Solet autem hic morbus plures cibos expetere. *De Affect.* XXVII. 4. ad 7.

TERROR, *vid.* PAVORES.

TESTICVLI.

AD PROGNOSIN.

Tusses non diuturnae, quoniam ubi testis intumuit, cessant: & testis tumor a tussi cessat, & allevatur. *Epid.* II. I. 43. 44.

Quibus tussis sicca est, his non solvitur, nisi dolor fortis ad coxas, aut ad crura, aut ad testem irruat. *Epid.* II. V 23.

Testium tumores aliquibus febrem ardentem solvunt. *De Iudicat.* 69.

Ex tussi vena secta, ad testem solutio fit. *Epid.* IV. XXXI. 10.

Testes & pudenda, ubi sursum contrahuntur, vehemens

tes dolores , & mortis periculum denunciant . *Prænot.* 52. *Coac.* 494.

Testis dexter frigidus , & convulsus , lethale . *Aphor.* VIII. 11.

TETANVS , *vid.* *CONVULSIO* .

TINNITVS , *vid.* *AVRIVM TINNITVS* .

TONSILLAE .

Aetas puerilis ipsis obnoxia , *Aph.* III. 26.

Qui tonsillas destillatione vexatas habent , his alvus amplius subducta , siccas tusses solvit . Verum pueris , si quid concocti superne prodierit , amplius solvit . *De Dentit.* III. 10. 11.

TONSILLARVM VLCERA .

AD PROGNOSIN .

MELIORIS NOTAE .

Pueris memorabilis magnitudinis , si ulcera in tonsillis sint , & deglutire possint , salutis signum est . *De Dentit.* III. 3.

In tonsillarum ulceribus , post prima tempora , pituitam per os effluere , si prius non fuit , commodum est , & tamen reducenda est . *Ibid.* 6 7.

Ulcera multo tempore in tonsillis citra augmentum mentia , ante 5. aut 6. diem periculosa non sunt . *Ibid.* 12.

DETERIORIS NOTAE .

Quibus cito in tonsillis ulcera serpentina confidunt , febribus ac tussi permanentibus , periculum est , rursus generanda esse ulcera recurrentia . *De Dentit.* III. 1.

Ulcera tonsillarum in infantibus , periculosa , *Ibid.* 2.

Quum maiores pueri , deglutire in tonsillarum ulceribus non possunt , his multam bilem revomi , aut per alvum prodire , periculosum est . *Ibid.* 4.

In ulceribus tonsillarum , si quid araneosum inest , non bonum . *Ibid.* 5.

Ulcera in tonsillis aestate facta, peiora sunt, quam aestate temporibus, citius enim proserpunt. *De Dentit.* III. 15.

Ulcera in tonsillis circa uvam proserpentia, in his, qui servantur, vocem alterant. *Ibid.* 16.

Ulcera proserpentia circa fauces graviora, & magis acuta, ut plurimum spirandi difficultatem inducunt. *Ibid.* 17.

TORMINA, *vid.* DYSENTERIA.

TORPOR.

AD DIAGNOSIN.

Dolor capitis, cum sedis ac pudendorum dolore, torporem ac impotentiam adfert, vocemque exsolvit, neque ista molestiam exhibent. Verum ex his somnolenti ac singultuosi nono mense evadunt, & voce libera reddita, in integrum restituuntur. *Coac.* 164.

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Torpor medicus doloris solvendi vim habet. *Aph. V.* 25.

DETERIORIS NOTAE.

Albicans deiectio ac torpor, vel etiam rigor succedens, in phrenitide. *Coac.* 91.

Torpor cum surditate, & paucio sanguine e naribus stillante. *Coac.* 334.

Refrigerationes & torpores, in sideratis, malum denunciant. *Coac.* 478.

Quae torporis sensu afficiuntur, praecipueque ad motiones impotentes & perfractae, circa iudicationem vexatae, anxietate laborantes, multo & tenui sudore diffluunt; in his alvus effusa malum denunciat. *Coac.* 521.

Rigores multi cum torpore, malignum quiddam denunciant. *Coac.* 14.

LETHALIS.

Torpor in contraria celeriter permutatus, perniciem demorat, *Coac.* 56.

Quibus in febre ardente, tumores cum somnolentia & torpore obveniunt, eos lateris dolor accedens, cum levi partis alicuius sideratione, necat. *Coac.* 66.

Pessima delectio liquida, in sopore & torpore detentis. *Coac.* 611.

In sopore oppressis, torpor cum aliis signis, perniciosus. *Coac.* 180.

TORPOR ALIVM MORBVM PRAESAGIENS. CONVULSIONES.

In gravibus & acutis capitis doloribus, cum torpore, & gravitatis sensu, proclives sunt convulsiones. *Coac.* 171.

EXSOLUTIONEM.

Qui per febres intermittentes, ad manus contactum exardescunt, torpore, siti, ac corporis incontinenti iactatione vexantur, ii alvo intercepta gravati exsolvantur. Interdum vero etiam praerubra in pedibus ambusta, eadem denunciant. *Coac.* 158.

NOVVM INSVLTVM IN EPILEPTICIS.

Torpor totius corporis, cum urinis praeter consuetudinem tenuibus & crudis, absque repletione. *Coac.* 599.

MENTIS ALIENATIONEM.

Vbi rigori torpor succedit, mentis alienatio significatur. *Praedict.* I. 35.

SIDERATIONEM.

Torporos & stupores praeter consuetudinem evenientes, adfuturam siderationem denunciant. *Coac.* 476.

SVPPVRATIONEM.

Quae ad manus contactum torpescunt, peraridae, sitis expertes, muliebria multa profundentes, pus intro colligunt. *Coac.* 542.

TRAN.

TRANQVILLITAS.

In morbo tranquillitas, longitudinem significat. *Præcept. XII. 8.*

TRANSPIRATIO.

Carnes attractrices, & ex ventre, & extrinsecus. Indicium est sensus ipse, quod expirabile, & inspirabile est totum corpus. *Epid. VI. VI. 1. 2.*

Qui bene transpirant, imbecilliores sunt, at salubriores, & facilius sanabiles. *De Alim. VI. 5.*

Qui male transpirant, ante morbum robustiores sunt: at morbo correpti, difficilius sanantur. *Ibid. 6.*

TREMOR.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Num dolore lumborum conflictatis tremores fiunt, & maculae rubentes, quales in tibiis, cum rigore? *Coac. 318.*

Qui lethargo, aut veterino conflictantur, ex manibus tremunt, &c. *Coac. 139.*

Crebrae, iisdem perseverantibus casibus, morborum reversiones, impendente iudicatione sanguinem profundentes, nigram vomitionem excitant. Quin etiam tremulos aegros faciunt. *Coac. 122. 571.*

Ex abortione ubi alba derepente percurrunt, si rigor aliquis corripiat, & ad femur impetus fiat, tremor molestus subit. *Coac. 543.*

AD PROGNOSIN,

MELIORIS NOTAE.

Quibus in febre ardente tremores fiunt, delirium solvit. *Aph. VI. 26.*

Quae ex rigore fiunt vocis defectiones, tremore solvuntur; atque eos, qui subinde novo rigore corripiuntur, succedentes tremores iudicant. *Coac. 27.*

DE

DETERIORIS NOTAE.

Qui subinde riguerunt, post haec sincera vomitione refuderunt, anxietate vexati, tremuli, in febre, malum portendunt. *Coac.* 39.

Qui cum aliis signis, furiosa & vehementi mentis emotione tenentur, ii, si tremuli evadunt, maligne habere iudicantur. *Coac.* 83.

Tremoribus quae convulsiones accedunt, cum sudoribus, recidivas minantur. In his iudicationem facit novus obortus rigor, qui prius ardore circa ventrem oborto provocatur. *Praedict.* I. 105.

LETHALIS.

In intensa phrenitide tremores, lethales. *Coac.* 97.

Quos vox cum febre, & absque ulla iudicatione deficit, ii tremuli intereunt. *Coac.* 247.

Qui capite dolent, cum levi aliqua surditate, manuum tremore, &c. perniciose habere suspicandi sunt. *Coac.* 176.

Vbi iam perniciēs imminet, parvi tremores, & aeruginosa vomitio, & in quibus inter potandum strepitus quidam percipitur, quique prae siccitate murmur quoddam sentiunt, & qui ob spiritum tussiculosum aegre devorant, in gravibus malis perfrigeratis, perniciose habere iudicandi sunt. *Coac.* 62.

*TREMOR ALIVM MORBVM PORTENDENS.**ABCESSVS ad ARTICVLOS.*

Quos febris detinet, si tremor absque iudicatione conquiescit, iis temporis successu abscessus cum dolore purulenti ad articulos decumbunt, & vesica dolet. *Coac.* 141.

ALVI DEIECTIONES NIGRAS.

Tremulae affectiones, cum morfu, ac capitis dolore, nigras deiectiones praedicunt. *Coac.* 636.

CALCVLORVM EXPVLSIONEM.

Tremores senioribus in febre contingentes, ubi apparent, calculi fortasse per urinas excludantur. *Coac.* 590.
CON-

TREM. TVB.

CONVULSIONEM.

In tremulis, & anxietate vexatis, parvi ad aures tumores excitari, convulsionem denunciant, si alvus male affecta sit. *Coac.* 353.

PHRENITIDEM.

Vehementi insania detenti, tremuli, cum crebra spuatione, metus est, ne phrenitici evadant. *Coac.* 94.

TVBERCVLA.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Aetas puerilis. *Aph.* III. 26.

Tempus vernale. *Aph.* III. 20.

Quibus tubercula ad articulos, aut dolores, ex febribus longis fiunt, hi pluribus utuntur cibis. *Aph.* IV. 45. VII. 64.

Quibus febres longae, his tubercula ad articulos, aut dolores fiunt. *Aph.* IV. 44. VII. 63.

Mensibus retentis, sunt quibus circa inguen velut tuberculum fit, illicque suppuratum exit. *De Nat. puer.* VII. 17.

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Tubercula extra extuberantia, & acuta, & fastigiata, & aequaliter maturescentia, & non obdura, & deorsum vergentia, & non bifida, meliora. *Epid.* VI. I. 29.

Quibus in urinaria fistula tuberculum nascitur, his, suppurato eo, & perrupto, solutio fit. *Aph.* IV. 82. VII. 57. *Coac.* 473.

DETERIORIS NOTAE.

A tumoris intus ruptione, exsolutio, vomitus, & animi deliquium fit. *Aph.* VII. 8.

AD THERAPIAM.

Vbi fauces aegrotant, aut tubercula in corpore exsurgunt, excretiones inspicere oportet; si enim biliosae

liosae fuerint, corpus una aegrotat: si vero similes
sanis fiant, tutum est corpus nutrire *Aph. II. 15.*
Quaedam tubercula conducit cataplasmati integere,
& per pharmaca in potu data diffundere: aliqua
vero impositis cataplasmati mutare. *De Affect.*
XXXIV. 3. 4.

TVBERCVLVM SVB LINGVA.

Si tuberculum sub lingua, hypoglossis appellatum,
fiat, lingua intumescit, & pars sub ipsa, ac externa
ad tactum dura est, & salivam deglutire non potest.
De Morb. II. XXXI. 1. 4.

Quum sic habuerit, spongiam aqua calida imbutam ap-
ponito, & hordeaceam farinam, vino ac oleo coac-
tam, foris ubi tumor est, imponito. Gargariset
ficuum decoctum, & ne lavet. *Ibid. 5. 8.*

TVBERCVLVM AD PALATVM.

Si tuberculum constiterit ad palatum, intumescit, &
suppuratur. *De Morb. II. XXXII. 1. 2.*

Quum sic habuerit, tuberculum inurito. Vbi vero exi-
erit pus, reliquum eluito. *Ibid. 3. 4.*

CONF. ABSCESSVS, PVS, TVMOR, VOMICA.

TVBERCVLA ad AVRES, vid. PAROTIDES.

TVMOR.

AD PROGROSIN.

VARIAE NOTAE.

Idem, haud secus quam in praecordiis, perpenditur
in tumoribus qui circa ventrem sunt, nisi quod hi
quam illi minus suppurant, nimum vero qui sub
umbilico constituuntur. Atque hi quidem in tunica
concluduntur, illi autem sursum diffunduntur. *Coac.*
281.

Quibus tumores in ulceribus apparent, non valde con-
velluntur, neque insaniunt. *Aph. V. 65.*

Laxi tumores boni, crudi vero mali. *Aph. V. 67.*

NO

NOTAE PERICULI.

Si magnis & pravis existentibus vulneribus, tumores non appareant, ingens malum. *Aph. V. 66.*

Tumores praeter rationem allevantes, pravam. *Epid. II. III. 132.*

Tumores humefcente alvo sublatis in altum, cum doloribus, malo sunt: alvo vero suppressa, dum ne quid aliud innovetur, celeriter rumpuntur, & maligniores sunt. In his vomitus pravi, & maligni. *Coac. 623.*

NOTAE LETHALES.

Ex tumoribus suppurantibus, mortem magis adferunt, quicunque intro rumpuntur. *Coac. 281.*

Manuum ac pedum tumores cum rubore, perniciem denunciant. *Coac. 63.*

NOTAE ALIUS MORBI FUTURI.

Si tumores in ulceribus derepente dispareant, quibus in postica quidem parte fuerint, convulsiones, tetani sunt: quibus vero in antica, insaniae, aut lateris dolores acuti, aut suppuratio, aut dysenteria, si rubicundi fuerint tumores. *Aph. V. 65.*

AD THERAPIAM.

Tumores in articulis, & dolores absque ulcere, & podagricos, & convulsiones, horum plurima, frigida multa affusa & levat, & attenuat, & dolorem solvit. Torpor enim modicus doloris solvendi vim habet. *Aph. V. 25.*

CONF. ABSCESSVS, ANGINA, HYDROPS, HYPOCHONDRIA.

TVRBATIO.

Si pulsus in praecordiis insit, perturbationem aut delirium indicat. *Praenot. 31.*

Quibus urinae distantes sunt, iis vehemens est in corpore turbatio. *Aph. VII. 33.*

TVRGENS MATERIA, vid. PURGATIO.

TVSSIS.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Aetas infantum recens natorum. *Aph. III. 24.*

Aetas senilis. *Aph. III. 31.*

Tempus vernale. *Aph. III. 20.*

Tempus hiemale. *Aph. III. 23.*

Autumnus pluviosus, & austrinus, post aestatem siccam, & aquiloniam. *Aph. III. 13.*

Frigida, velut nix, glacies, pectori inimica, tusses movent, sanguinis eruptiones, ac catarrhos inducunt. *Aph. V. 24.*

Quibus diu tusses siccae, paulum irritantes, in febribus ardentibus, non admodum siticulosi sunt. *Aph. IV. 54.*

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Tussiculac, quae cum crebris oris sputationibus procedunt, tubercula ad aures emolliunt. *Coac. 204.*

DETERIORIS NOTAE.

Qui per accessiones tussunt, & tenuiter exsulant, ii maligne habere iudicandi sunt. *Coac. 112.*

Hepatico colliquatio cum raucedine, malum portendit, idque praecipue, si cum quadam tussi contingat. *Coac. 447.*

In angina, quae inter potandum per tussim reliciuntur, quaeque difficulter deglutiuntur, malum portendunt. *Coac. 378.*

Raucitas, cum tussi, & alvo liquida, pus educit. *Coac. 414.*

LETHALIS.

Hydropicum si tussis habeat, desperatus est. *Aph. VII. 47. VI. 35.*

Qui gibbi, ex asthma, aut tussi, fiunt ante pubertatem, pereunt. *Aph. VI. 46.*

Spu-

Sputa ex angina subarida, crebra, per tussim, & cum lateris dolore educta, perniciem minantur. *Coac.* 378.

VARICES.

AD DIAGNOSIN.

Qui calvi sunt, his varices magni non sunt. Quibus vero dum sunt calvi, superveniunt varices, hi rursus capillati fiunt. *Aph.* VI. 34.

Varices calvorum, si non magni fuerint, furiosi sunt. *Epid.* II. V. 40.

AD PROGNOSIN.

Infanientibus si varices, aut haemorrhoides supervenerint, infaniae solutio fit. *Aph.* VI. 21.

Vocis gracilitatem solvit, varix ad sinistrum & dextrum testem: absque horum altero fieri non potest, ut solvatur. *Epid.* II. V. 4.

VENAESECTIO.

INSTITVENDI RATIO.

Si sanguinem alicui detrahare conducit, solidam alvum facere oportet, atque sic detrahare, & fame macerare, ac vinum auferre. *De Vict. acut.* LXV. 1.

Vena secanda quam longissime a locis, ubi dolores fieri solent, ac sanguis colligi. *De Ven.* XIII. 6.

EIVS VSVS.

Quibus sanguinem de venis auferre conducit, his vere venam secare oportet. *Aph.* VII. 53. VI. 47.

Solvit oculorum dolores. *Aph.* VI. 31. VII. 46.

Solvit urinae stillicidium, & difficultatem. *Aph.* VI. 36. VII. 48.

Quae ruptiones ex dorso ad cubitos descendunt, venaesectio solvit. *Aph.* VI. 22.

Postica capitis parte dolenti, recta in fronte vena secta iuvat. *Aph.* V. 68.

Venaesectio liberat a convulsionibus, a longa narium haemorrhagia, per vim suppressa ortis. *Coac.* 336.

Quos

Quos derepente, absque febre, praecordiorum, aut o-
ris ventriculi dolor, aut crurum, & inferiorum par-
tium, affligit, alvusque intumescit, venaesectio, aut
alvi fluxus solutionem adfert. *Coac.* 294.

Ex venis in ano sanguinem fundere solitis aliquantum
apparentibus, tenebricosae vertigines obortae, par-
vam ac sensim factam partium resolutionem indicant,
ex quo liberat venaesectio. *Coac.* 346.

Anginam & lippitudinem solvit venaesectio. *Epid. II.*
VI. 26.

In morbis comitialibus, aut semifyderatis, confert sta-
tim ab initio. *De Vict. acut.* XXXVIII. 1. 2.

In pleuritide, siquidem dolor ad claviculam de se si-
gnificationem praebeat, aut gravitas ad brachium,
aut circa mammam, aut supra septum transversum,
venam secare prodest in cubiti flexura internam, &
non cunctari copiosum sanguinem detrahare, donec
multo rubicundior fluxerit, aut pro puro & rubi-
cundo lividus. *De Vict. acut.* XII. 5. 8.

Confert in morbis acutis, si vehemens fuerit morbus,
& aegri aetate, & viribus valeant. *De Vict. acut.*

Si alias atque alias dolor & vertigo in caput inciderit,
prodest etiam, si sanguis a naribus fuerit detractus,
aut a vena in fronte. *De Affect. II.* 10.

EIVS NOXA.

Mulier in utero gerens, secta vena abortit: & magis,
si maior fuerit foetus. *Aph. V.* 31.

Lateris dolores in febribus leviter firmatos, & absque
ulla significatione, venaesectio laedit, sive aversum a
cibis animum, sive sublata praecordia aeger habeat.

Quin etiam in corporis perfrigeratione torpescences,
non sine febre, sanguinis detractio laedit, & cum
videantur levius habere, moriuntur. *Coac.* 491.

In pleuritide sectio venae non similiter solvit dolorem,
si non ad claviculam pertingat dolor. *De Vict. acut.*

XII. 2.

VE-

VENAE.

Vulnera fere mortem adferunt, quae magnas venas, quae sunt in collo, & inguinibus, laederunt. *Praedict. II. 68.*

Venarum iugularium palpitatio vehemens, una cum aliis signis, perniciem minatur. *Coac. 161.*

Quos febris detinet, cum faciei rubore, & capitis vehementi dolore, in iis, si venae pullent, sanguinis fluxus plerumque expectandus est. *Coac. 142.*

CONF. ANGINA; FEBRIS; CERVIX.

VENTER.

AD DIAGNOSIN.

In omnibus morbis, quae partes ad umbilicum, & imum ventrem sunt, crassitudinem habere, melius est. Valde autem tenues, & eliquatas ipsas habere, malum. Periculosum vero illud est, etiam ad infernas purgationes. *Aph. II. 35.*

Si in ventrem sanguis effusus fuerit praeter naturam, necesse est suppurari. *Aph. VI. 20.*

Alvus circumtensa, ex medici industria liquida demittens, celeriter intumescens, convulsione significationem quandam praefert. *Praedict. I. 99.*

AD PROGNOSIN.

NOTAE PERICULI.

In febribus circa ventrem aestus vehemens, & oris ventriculi dolor, malum. *Aph. IV. 65.*

Temerarii ventris tumores in morbis longis, convulsiones adferunt. *Coac. 86.*

NOTAE LETHALES.

Venter in tumorem sublatus, post alia signa praegressa. *Coac. 330.*

Ex diuturno ventris affectu, vomentibus, biliosis, cibum averfantibus, copiosus sudor abortus, cum repentina virium impotentia, lethalis. *Coac. 628.*

VENTRIS DOLOR.

AD DIAGNOSIN.

NOTAE COMITANTES.

In ventrem iacere, et qui per bonam valetudinem ita dormire minime consuevit, delirium, aut partium circa ventrem dolorem indicat. *Praenot.* 13. *Coac.* 497.

Potum aegre deglutienti, cum spiritu tussiculoso, eructatio quodammodo revulsa, intro convoluta, ventris dolorem denunciant. *Coac.* 532.

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Dolores, qui in ventre sunt, elevati quidem, leviores; non elevati vero, vehementiores. *Aph.* VI. 7.

In uterum gerentibus, ventris dolor, si limosa expurgat, levius malum indicat. *Coac.* 523.

Ventris dolor a partu, in his purulenta expurgat. *Coac.* 520.

NOTAE PERICULI.

A dolore diuturno partium circa ventrem, suppuratio, (malum.) *Aph.* VII. 22.

A dolore vehementi partium circa ventrem, extremarum frigus, malum. *Aph.* VII. 26.

Quibus tormina & circa umbilicum dolores, & lumborum dolor, qui neque purgante, neque aliter solvitur, in hydropem siccum firmatur. *Aph.* IV. 11.

NOTAE LETHALES.

Febris ardens, ex laborioso ventris dolore, perniciem minatur. *Coac.* 130.

Quibus ad articulos praerubrae pustulae superficiales enatae sunt, ac subinde rigent, iis velut ex acceptis plagis, cum dolore venter, & inguina rubescunt, & pereunt. *Coac.* 489.

VENTRICULVS.

Eius vulnus lethale. *Aph.* VI. 18.

VEN.

Ventriculo calidi, carne frigidi & tenues, hi emittentes venas habent, & iracundiores sunt. *Epid. VI. IV. 45.*

VENTRICULI ORIS DOLOR. CARDIALGIA.

AD DIAGNOSIN.

Quos ex lateris dolore, cibi fastidia comitantur, iis os ventriculi aliquantum dolet, & sudoribus diffundunt. *Coac. 423.*

Oris ventriculi dolores, cum intestinorum cruciatu, interaneorum animalia denunciant. *Coac. 285.*

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Febres acutas, cum mentis perturbatione, in oris ventriculi dolore non bilioso, insania solvit. *Coac. 550.*

Qui praecordiorum doloribus, oris ventriculi, iecoris, ac earum, quae sunt circa umbilicum, partium, consistantur, cruenta alvi deiectione liberantur; secus autem moriuntur. *Coac. 295.*

DETERIORIS NOTAE.

In febribus, circa ventrem aestus vehemens, & oris ventriculi dolor, malum. *Aph. IV. 65.*

Oris ventriculi dolor, ac praecordiorum pulsus, cum febre, in qua totus corporis habitus perfrigeratur, malum denunciant; idque praesertim, si cum tenuibus sudoribus contingunt. *Coac. 283.*

LETHALIS.

Oris ventriculi dolor aliquis, febris, lateris dolori, deiectioni aquoso-biliosae, cibi fastidio, sudoribus copiosis, cum bene colorata facie, ac humescente alvo, succedens. *Coac. 67.*

Oris ventriculi dolor seniori crebro adveniens, repentinam mortem denunciat. *Coac. 286.*

Oris ventriculi dolor, cum praecordiorum contensione, atque etiam capitis dolor, malignum quidpiam, &

suspiriosam quandam affectionem indicat. In his certe animadvertendum est, num derepente moriantur? *Prædict. I. 72.*

ALIVM MORBVM PORTENDENS. CONVULSIONEM.

Lumborum & oris ventriculi dolor, cum forti screatione, convulsionem quodammodo suspectam facit. *Coac. 320.*

HAEMORRHAGIAM.

Quibus lumborum dolor in caput recurvat, & manus torpore affectæ, ac oris ventriculi dolorem sentiunt, aut aurium tonitus, ii liberaliter sanguinem profundunt. *Coac. 308.*

HAEMORRHOIDES.

Dolentibus lumbis, si oris ventriculi dolor accesserit, futurae per haemorrhoidas vacationis signum est; aut etiam eam præcessisse significat. *Coac. 312.*

AD THERAPIAM.

Non febricitanti, appetitus deiectus, & oris ventriculi morsus, & tenebricosa vertigo, & os amarescens, fursum purgante opus esse, indicat. *Aph. IV. 17.*

Quos derepente, absque febre, præcordiorum, aut oris ventriculi dolor, aut crurum, & inferiorum partium affligit, alvusque intumescit, venaesectio, aut alvi fluxus solutionem adfert. *Coac. 294.*

VENTVS.

Venti ex mari in regiones illabentes, sicciore quodammodo sunt. *De Diet. H. VI. 2*

Qui a nive, aut glacie, aut stagnis, aut fluminibus, procedunt, omnes humectant & frigefaciunt, tum plantas, tum animantia, & sanitatem corporibus exhibent, qui non frigiditate super excellunt. *Ibid. 4. 5. 6.*

Qui ex terra accedunt, eos necesse est sicciore esse, tum a sole, tum a terra resiccatos. *Ibid. 12. 13.*

Qui

VEN. VER. VERT. 261

Qui relictis montibus, ad urbes accedunt, non solum siccant, sed etiam turbant spiritum, quem inspiramus, & corpora hominum morboſa faciunt. *Ibid.* 16. 19.

Quum non habeant venti, unde alimentum trahant, & viventibus humorem trahentes, & plantas, & animalia omnia laedunt. *Ibid.* 14. 15.

CONF. ANNI TEMPVS, & CONSTITVTIO.

VENVS.

Quibusdam ubi venere utuntur, venter inflatur: quibusdam vero in hoc ſtrepitus. *Epid. VI III* 19. 20. Poſtquam venere uti inceperint, aut hircire, ſanguis ipsis e naribus erumpit. *Ibid.* 42.

Extenuat, humeſcat, & calefacit *De Diet. in acut.*

VER, *vid. ANNI TEMPVS.*

VERMES, *vid. LUMBRICI.*

VERRVCAE PENSILES.

Aetati puerili accidunt. *Aph. III.* 26.

VERTEBRAE.

Verticuli in occipitio introrſum extruſioni aetas puerilis obnoxia eſt. *Aph. III.* 26.

Quibus ſpiratus retrahitur, & vox ſtrangulabunda eſt, iis cervicis vertebra intro deſidet, & ad exitum, velut ex convulſione quadam, reſpiratio ducitur. *Coac.* 265.

Vertebrarum intus luxatio lethalis, urinae ſuppreſſionem, & ſtuporem accerſens. *De Alim.*

VERTIGO.

AD DIAGNOSIN.

CAVSAE ANTECEDENTES.

Aetas ſenilis. *Aph. III.* 31.

R 3

Tem

Tempus hiemale. *Aph. III. 23.*

Quotidianae constitutiones austrinae. *Aph. III. 17.*

AD PROGNOsin.

MELIORIS NOTAE.

Tenebricosas vertigines, circa initia, sanguinis ex naribus fluxio solvit. *Coac. 341.*

DETERIORIS NOTAE.

Tenebricosae vertigines, si cum doloribus adfuerint, malum in insaniam erumpit, nec facile profligatur, & senes praecipue affigit. *Praedict. II. 155.*

LETHALIS.

Tenebricosa vertigine laborans, & lucem averfans, & somno ac ardore multo detentus, desperatus. *Aph. VIII. 15.*

Parvi in longis morbis aurium tumores, si subinde sanguis e naribus profluat, & tenebricosa vertigo excitetur, exitio sunt. *Coac. 105.*

Febres vertiginosae, & cum tenuis intestini morbo, & sine hoc, perniciem intentant. *Coac. 106.*

VERTIGO ALIUM MORBUM PRAESAGIENS. RESOLUTIONEM PAULATINAM.

Vertigines tenebricosae, ex haemorrhoidibus aliquantum apparentibus, abortae. *Coac. 346.*

SIDERATIONEM, EPILEPSIAM, aut OBLIVIONEM.

Tenebricosa vertigo, & vocis tarditas, manuumque stupor, &c. *Coac. 161.*

AD THERAPIAM.

Tenebricosa vertigo, una cum aliis signis, sursum purgante opus esse, indicat. *Aph. IV. 17.*

Subtumidos, aut tenebricosa vertigine vexatos, aut eos, qui vel leviter moti animo deficiunt, aut cibos averfantur, & decolores sunt, medicamentis purgare tutum non est. *Praedict. I. 71.*

VE-

VESICA LABORANS.

AD DIAGNOSIN.

Si quis sanguinem mingat, & grumos, & urinae stillicidium habeat, & dolor incidat ad imum ventrem, & inter femineum, partes circa vesicam laborant. *Aph IV 80.*

Quibus in urina crass. existente, fursuracea simul minguntur, iis vesica scabie laborat. *Aph. IV. 77.*

Quos febris detinet, si tremor absque iudicatione conquiescit, iis temporis successu abscessus cum dolore purulenti ad articulos decumbunt, & vesica dolet. *Coat 141.*

AD PROGNOSIN.

Renum & vesicae dolores difficulter sanantur in senibus. *Aph. VI 6.*

Quibus tuberculum ad vesicam adnascitur, urinae difficultatem adferens, iis quivis corporis habitus negotium faceffit, cuius quidem solutio contingit per puris eruptionem. *Coac. 473.*

Vesica dura, & graviter dolens, omnino quidem mala est. Pessima vero, si febris continua accesserit, (vesicae namque dolores interimendi vim obtinent) & alvus his nihil admodum reddit. Eos autem metu liberat, urina purulenta procedens, in qua album & leve subsidet. Quod si neque haec levata fuerint, neque vesica mollior reddatur, intra primos circuitus laborantem moriturum, expectandum est. Hoc vero pueris a 7. anno ad 15. praecipue contingere solet. *Coat. 471. Praenot. 121.*

AD THERAPIAM.

Vesicae calidum quidem amicum, & decretorium: frigidum vero inimicum, & occidens. *Aph V. 22.*

VESICAE CALCVLVS, vid. CALCVLVS.

VESICAE EXVLCERATIO.

AD DIAGNOSIN.

Si quis sanguinem, aut pus mingat, renum & vesicae

R 4

exul-

exulcerationem significat. *Aph. IV. 75.*

Si quis sanguinem, & pus mingat, & squamas, & odor gravis sit, vesicae exulcerationem significat. *Aph. IV. 81.*

VESICAE VVLNVS.

Cui perfecta est vesica, lethale. *Aph. VI. 18.*

VICIVS, vid. DIAETA.

VIGILIA AGRYPNIA. PERVIGILIVM. AD DIAGNOSIN.

CAVSÆ ANTECELENTES.

Aetas infantum recens natorum. *Aph. III. 24.*

Aetas senilis. *Aph. III. 31.*

Febris circa initia levior, ad iudicationem, cum capitis pulsatione, & urina tenui, ingravescent. *Coac. 81.*

Liquidum alvi recrementum, & brevibus intervallis cumulatam. *Coac. 609.*

AD PROGNOSIN.

Somnus, vigilia, utraque modum excedentia, malum. *Aph. II. 3.*

A vigilia convulsio, aut delirium, malum. *Aph. VII. 18.*

Faciei corruptela minus lethalis est, si ob pervigilium contingat. *Coac. 212.*

NOTAE ALIVS MORBI FVTVRI.

CONVVLSIONIS.

Pervigiles, cum aliis signis, in convulsionem tendunt. *Coac. 20.*

HAEMORRHAGIAE.

Insomnia, cum subita corporis iactatione, & inquietudine. *Coac. 111. Prædict. I. 136.*

Pervigilium, cum perturbatione, narium stillatione, levamine ad noctem diei 6. dein sudore tenui postridie, somno, delirio, urina diluta. *Coac. 87.*

Qui statim sine ratione perturbantur, pervigilio torquentur.

quentur, nigra & compacta ex alvo demittunt, interdum sanguinem e naribus profundunt. *Coac.* 110.

INSANIAE.

Pervigilium leve, cum dolore capitis, siti, obscura loquela, ad motum impotentia, humefcente alvo, & lassitudine. *Coac.* 175.

PAROTIDVM.

In angore & pervigilio vexatis, ad aures abscessus maxime obveniunt. *Coac.* 563.

AD THERAPIAM.

Vigilia nimia post cibos, noxia, quia cibum solvi non finit: ieiunos autem extenuat, minus tamen laedit.
De Viſſ. acut

VIGOR MORBI.

AD DIAGNOSIN.

Circa principia, & fines, omnia sunt debiliora: circa vigores vero, vehementiora. *Aph.* II. 30.

AD THERAPIAM.

Cum morbus in vigore fuerit, tunc vel tenuissimo viſſu uti neceſſe eſt. *Aph.* I. 8.

Incipientibus morbis, ſi quid movendum videatur, move: vigentibus vero, quieſcere melius eſt. *Aph.* II. 29.

VINVM.

EIVS VSVS.

Famem vini potio ſolvit. *Aph.* II. 21.

Anxietatem, oſcitationem, horrorem, vinum par pari aqua potum, ſolvit. *Aph.* VII. 56.

Solvit urinae ſtillicidium, & difficultatem. *Aph.* VII. 48.

Oculorum dolores. *Aph.* VI. 31. VII. 46.

Flatum, ardorem, morſum, repletionem, aut tormina, a cibo nata. *De Morb.*

EIVS NOXA.

Nocet in morbis, ubi vehemens capitis gravitas, aut mentis laeſio metuenda. *De Viſſ. acut.*

VIRIVM EXSOLVTIO .

In pueris ad septimum progressis , coloris foedatio , inter ambulandum spiratio coacervata , & terrae appetentia , sanguinis eruptionem , & virium exsolutionem indicat . *Coac.* 339.

Virium exsolutio dolorem solvens , alvum maxime humectam reddit . *Coac.* 629.

VISCERA .

In febribus acutis , convulsiones , & circa viscera dolores vehementes , malum . *Aph.* IV. 66

Eorum abscessus , ex dysenteria intempestive suppressa . *Coac.* 462.

VISVS HEBETVDO .

AD DIAGNOSIN .

CAUSAE ANTECEDENTES .

Aetas senilis . *Aph.* III. 31.

Austri . *Aph.* III. 5.

In vulneribus , quae in supercilium , aut paulo altius inferuntur , visus acies obtunditur ; & quo vulnus recentius est , eo magis vident . Inveterascente autem , aut tardante cicatrice , magis obtundi solet . *Coac.* 510.

AD PROGNOSIN .

Aurium sonitus , cum visus hebetudine , & ad nares gravitatis sensu , mentis excessum , ac sanguinis ex naribus profluvium praesagiunt . *Coac.* 194.

In his , qui propter imbecillitatem non vident , nec audiunt , aut quibus labrum , aut oculus , aut nasus pervertitur , mors denunciatur . *Coac.* 72. *Aph.* IV. 49. VII. 73.

VITA .

Vita brevis , ars longa , occasio celeris , experimentum periculosum , iudicium difficile . *Aph.* I. 1.

Vi-

Vita hominis septem dierum est. *De Aetat. I. 1.*

Qui longae vitae sunt, plures dentes habent. *Epid. II.*

VI. 2.

VITILIGINES.

Vere fiunt *Aph. III. 20.*

Ad vitiliginem & lepram, calcem in aqua adhibeto, ut ne exulceres. *Epid. II. V. 41.*

VLCERA.

AD DIAGNOSIN.

Pustulae ulcerosae vere fiunt. *Aph. III. 20.*

Oris exulcerationes aestate fiunt. *Aph. III. 21.*

Pituita acris humoribus permixta, quocunque pro-
ruperit, maxime in non consuetos locos, eos exul-
cerat. *De Flat. XVI.*

Vlcera exoriuntur, si quis, dum impurgatus est, la-
boraverit. *Epid. VI. V. 50.*

Serpentia ulcera supra inguina, ad laterum inanitatem
& pubem enata, male affectam alvum denunciant.
Coac. 628.

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Corporis naturae probandae sunt leves, moderatae,
firmis visceribus praeditae, neque admodum carno-
sae, neque durae; tum quae colore sunt albo, aut
nigro, aut rubro. Hae etenim omnes probantur, si
purae sunt. *Praedict. II. 61.*

Vlcera, si repurgando pus album reiiciant, celerem
curationem denunciant. *De Indicat. 27.*

Vlcerum eruptio interdum liberat ex capitis dolore.
Coac. 172.

Vlcus recens sanguinem fundens. *De Vlcer.*

Quibus tumores in ulceribus apparent, non valde con-
velluntur, neque insaniunt. *Aph. V. 65.*

Calidum suppuratorium, non in omni ulcere, maxi-
mum signum ad securitatem, *Aph. V. 22.*

DE-

DETERIORIS NOTAE.

Quoad naturas hominum, deterius est, si ex pallido mixtum colorem, aut pallidum, aut lividum habeant. *Praedict. II. 61.*

Ex locis difficilior sanantur alae, ac laterum cavitates, ac femora. In his namque humores subsident, & recidivae fiunt. *Praedict. II. 66.*

In his, quae circum articulos contingunt, in maximum discrimen praecipitant pollices, ac praecipue pedum. *Praedict. II. 67.*

Vlcera circumglabra, maligna. *Aph. VI. 4.*

Vlcera quaecunque annua fiunt, aut longius tempus occupant, necesse est os abscedere, & cicatrices cavas fieri. *Aph. VI. 45.*

Hydropicis ulcera in corpore orta, non facile sanantur. *Aph. VI. 8.*

Tumoribus ulcerum derepente disparentibus, quibus in postica quidem parte fuerint, convulsiones, tetani fiunt: quibus vero in antica, insaniae, aut lateris dolores acuti, aut suppuratio, aut dysenteria, si rubicundi fuerint tumores. *Aph. V. 65.*

A forti pulsu in ulceribus, sanguinis eruptio, malum. *Aph. VII. 21.*

Nomae vitiosae sunt, & in periculum praecipitant, quae saniem nigram reddunt. At albae, & mucosae putredines, mortem quidem adferunt minus, sed potius recidivas faciunt, & diutius perseverant. *Praedict. II. 75.*

LETHALIA.

Vlcus, siue ante morbum, siue in morbo natum sit, nosse oportet. Nam si periturus aeger est, ante mortem lividum, & sicum, aut pallidum, & sicum erit. *Praenot. 16.*

Vlcus lividum & aridum, aut pallidum effectum, mortem indicat. *Coac. 496.*

Nomae maxime sunt lethales, quae putredines altissime descendentes habent, suntque nigerrimae, & siccissimae. *Praedict. II. 75.*

Quum

Quum a morbo quopiam detento, debili iam existenti, livida ulcuscula enata fuerint, mortale. *De Loc. in hom. XLIV. 7. 8.*

AD THERAPIAM.

Ocium & quies maxime conferunt, *De Vicer. II. 3.*

Medicus cibus, & aqua, quam maxime omnibus ulceribus conducunt, & magis recentioribus, quam vetustioribus. *Ibid. I. 8. 9.*

Ulceribus ex recenti vulnere, oleum non conducit, neque mollientia, neque adiposa medicamenta, tum alias, tum quod ulcus ampliore purgatione opus habet. *Ibid. IV. 3. 4.*

Depurgatio ventris deorsum plurimis ulceribus confert. *Ibid. 6.*

Ulcera universa, nisi vino, humectare non oportet, si non in articulo fuerit ulcus. *Ibid. I. 1.*

Ulceribus frigida, mordax. *Aph. V. 20.*

VMBILICVS.

AD DIAGNOSIN.

Umbilici inflammationes, in parvis & recens natis pueris. *Aph. III. 24.*

AD PROGNOSIN.

Dolores circa umbilicum, cum palpitatione, mentis alienatae significationem quandam praebent. Sub indicationem vero his plurimus, & creber flatus, cum singulari contensione prodit. *Praedict. I. 36.* (At iis sub indicationem, conferta & crebra pituita cum dolore prodit. *Coac. 300.*

Qui praecordiorum doloribus, oris ventriculi, iecoris, ac earum, quae sunt circa umbilicum, partium, consistantur, cruenta alvi deiectione liberantur; secus autem moriuntur. *Coac. 295.*

Supra umbilicum labor, ac lumborum dolor, qui remediis non cedit, in hydropem siccum desinit. *Coac. 304. Aph. IV. 11.*

VN-

VNCTIO.

Calefacit, humectat, ac mollit. *De Diet. II. XXXV. 18.*

VNGVES.

AD DIAGNOSIN.

Ungues unci fiunt, & perfrigescunt, in empyicis.
Coac. 402.

AD PROGNOSIN.

Ungues nigri, & digiti manuum ac pedum frigidi, contracti, vel remissi, mortem in propinquo esse ostendunt. *Aph. VIII. 12.*

Si cum gravitate, digiti quoque ac ungues lividi fiunt, in propinquo mors est. *Coac. 493.*

At si omnino nigrescant, minus quam liveantes periculum ostendunt. Verum tunc reliqua consideranda sunt. Etenim si facile morbum sustinet aeger, & aliud quiddam ex his, quae securitatem pollicentur, se prodit, morbus in abscessum vergit, & denigratae corporis partes decidunt. *Coac. 493.*

Quibus purulentis, ab humeris concussis, nullus intus sit strepitus, difficultas tamen spirandi vehemens adest, & liveant ungues, ii pure pleni sunt, & perniciose habent. *Coac. 432.*

VOLVVLVS, vid. ILEVS.

VOMICA.

AD DIAGNOSIN.

Ex lateris morbo praecipue, aut pulmonis inflammatione purulentos, calores interdum quidem tennes, non autem vero intensiores consequuntur, neque quicquam effatu dignum exspuunt, circa cervicem & claviculam sudores occupant, oculi cavantur, malae vero rubent, digiti quidem manuum summi calent, & scabri redduntur, ungues autem unci fiunt, & perfrigescunt, in pedibus tumores, & pustulas toto corpore habent, ac cibos refugiunt. Atque hae sunt diuturnarum vomica-

micarum notae. Quae vero celerem eruptionem habent, tum ex notis, quae ad eas consequuntur, comprehenduntur, tum etiam ex doloribus, qui circa initia fiunt, simulque si spiritus aliquanto maiori cum difficultate trahitur. *Coac. 402. Praenot. 105. 106.*

Quod si in altero tantum latere suppuratio fuerit, tumvertere, tum ediscere ad haec convenit, num dolor aliquis alterum latus detineat, & num altero calidius fuerit, atque ubi in latus sanum decubuerit, interrogare, si quod ei pondus desuper impendere videatur. Sic enim altero latere, in quo pondus extiterit, suppuratio est. *Praenot. 104.*

Rumpuntur autem magna ex parte suppurationes, partim quidem 20. die, partim 40. partim etiam 60. Quibus igitur inter initia intensus dolor instat, nec non spirandi difficultas, & tussis, cum frequenti sputatione, circa vigesimum diem, aut celerius, ruptio expectanda est. Quibus autem leviora haec insunt, pro ratione serior eruptio futura est. Sed & dolorem, & spirandi difficultatem, ac crebram spirationem, eruptionem ipsam praecedere necesse est. Temporis autem ratio ineunda est, ex quo primum quis dolorem, aut gravitatem sensit, aut febricitavit aliquis, aut si quando etiam rigor apprehendit. *Coac. 402. Praenot. 107.*

AD PROGNOSIN.

NOTAE SALVTIS.

Vt plurimum brevi servantur, quos febris, statim atque eruptio facta est, dimittit, & cibos appetunt, & quibus pus facile educitur, album, odoris expers, leve, eiusdemque coloris, sine pituita, ac alvus exigua, & coacta reddit. *Coac. 402. Praenot. 108.*

NOTAE LETHALES.

At ii moriuntur, quos febres consequuntur, & sitis, & cibi fastidium, si pus lividum, aut ex pallido virescens, aut pituitosum, aut spumans, ac insuper si alvus est liquida. *Coac. 402. Praenot. 109.*

Qui-

Quibus autem ex praedictis, partim quaedam adsunt, partim vero absunt, hi quidem moriuntur, illi vero post longa temporum intervalla sani evadunt. *Coac.* 402. *Praenot.* 110.

CONF. ABSCESSVS, PVS, EMPYEMA, PERI-PNEUMONIA, PLEVRITIS.

VOMITVS SPONTANEVS.

AD DIAGNOSIN.

CAUSAE ANTECEDENTES.

Aetas infantum recens natorum. *Aph.* III. 24.

Tempus aestivum. *Aph.* III. 21.

Tumoris intus ruptio. *Aph.* VII. 8.

Vulnus cerebri. *Aph.* VI. 59.

Ileus. *Aph.* VII. 10.

NOTAE ANTECEDENTES.

Qui vomituri sunt, iis antea os crebra salivatione impletur. *Coac.* 566.

Si quis in febre non lethali, dixerit caput dolere, aut tenebrosus quiddam ante oculos obversari, si etiam oris & ventriculi morsus accesserit, biliosa vomitio aderit. Quod si quoque rigor obortus fuerit, & inferiores praecordiorum partes frigidas habuerit, adhuc citius vomitio aderit. Si vero sub id tempus biberit quidpiam, aut edierit, id quam-celerrime evomitur. *Praenot.* 144.

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

In perturbationibus alvi, & vomitibus sponte evenientibus, si quidem qualia oportet purgari, purgentur, confert, & facile ferunt: sin minus, contra. *Aph.* I. 2.

A diuturno alvi profluvio detento, sponte superveniens vomitus, alvi profluvium sistit. *Aph.* VI. 15.

Vomitio maxime innoxia est, quae pituita & bile permixta est, dum ne admodum copiosa sit. *Coac.* 556. *Praenot.* 81.

In

In surditate, ac torpore, ex naribus substillatio mole-
stiam quandam exhibet. Iis vomitio, ac alvi pertur-
batio conveniet. *Coac.* 208. 334.

In intenso lumborum dolore, & alvi subductione lac-
giore, sumpto veratro, spumosoformis crebra vomitio
prodest. *Coac.* 310. 570.

DETERIORIS NOTAE.

Sinceriores vomitiones, deteriores sunt. *Coac.* 556.
Praenot. 81.

Viridis quoque vomitus, & niger, & lividus, vitiosus
est. *Coac.* 556. *Praenot.* 82.

Omnes subputres, & graves odores, in omnibus vom-
itionibus, mali. *Praenot.* 85.

Vomitioes variae malo sunt, praesertim si continenter,
& assidue prodeant. *Praedict.* I. 60.

Vomitioes sinceræ, & cum angore, aut incontinenti
corporis iactatione, damnandæ sunt. *Praedict.* I. 62.

Vomitioes exiguae, biliosae, malum denunciant, tum
vero praecipue, si pervigilio consistantur aegri.
Coac. 558. *Praedict.* I. 79.

Vomitus parvi, & frequenter repetentes, biliosi, sin-
ceri, mali sunt, in copiosiore ventris subductione,
& intenso lumborum dolore. *Coac.* 560.

In vomitu, eum, qui siti prematur, sitis expertem
esse malum est. *Coac.* 562.

Bilis vomitus vulnere succedens, malum denunciat,
praecipueque in capitis vulneribus. *Coac.* 517.

A vomitu singultus, & oculi rubri, malum. *Aph.* VII. 3.

Ab ileo vomitus, &c. malum. *Aph.* VI. 10.

Crebro repetentes, iisdem perseverantibus casibus, vo-
mitioes, ad iudicationem nigra vomitione refundunt.

Quia etiam tremulos aegros faciunt. *Coac.* 571.

Vomitus pravi & maligni, post tumores humescente al-
vo sublato in altum, cum doloribus, dein alvo
suppressa celeriter ruptos. *Coac.* 623.

Quum pueri deglutire in tonsillarum ulceribus non pos-
sunt,

sunt, his multam bilem revomi, aut per alvum prodire, periculosum est. *De Dentit. III. 4.*

Vomitio parva, cum sopore, incontinenti corporis inactione, praecordiorum dolore, & parotidibus, *Coac. 183.*

In superflua purgatione, qui subinde vomunt, & siticulosi sunt, male habent. *Coac. 568*

LETHALIS.

Si quis omnes colores vomat, exitiale est. Celerrimum autem exitium indicat, vomitus lividus & mali odoris. *Coac. 556. Praenot. 83. 84.*

Mortem quoque adfert ruber vomitus, isque praecipue si cum maiore conatu, & dolore contingat. *Coac. 556.*

Vbi ex vomitu anxietudo occupat, vox stridula est, oculi pulvere obscuri, insania portenditur: ac tale vehementi insania correpti, voce defecti intereunt, *Coac. 561.*

Lumborum dolores ad os ventriculi recurrentes, cum febre, horrore, si tenuia & aquosa vomitione reiecerint, delirarint, voce defecti sint, si post nigrorum vomitionem moriuntur. *Coac. 316.*

Eae cerebri vulnere, febris ut plurimum, ac bilis vomitus succedit, & corporis resolutio, itaque perniciose habent. *Coac. 500.*

VOMITVS INSANIAM PORTENDENS.

Vomitus virulenti, & aeruginosi, cum capitis dolore, surditate, & insomnia, promptam insaniam significant. *Praedict. I: 10.*

AD THERAPIAM.

Ad vomitum solvendum confert, aquam calidam bibere, & vomere. *Epid. II. V. 35.*

VOMITVS CRVENVVS.

AD PROGNOSEIN.

MELIORIS NOTAE.

Qui sanguinem vomunt, siquidem sine febre, salutare. *Aph. VII. 37.*

Mulieri sanguinem evomenti , menstruis erumpentibus , solutio fit . *Aph. V. 32.*

His , quae non pariunt , ad conceptum sanguinis vomitus prodest . *Coac. 551.*

DETERIORIS NOTAE.

Vomitum sanguinis cum febre , malum , *Aph. VII. 37.*

Sanguis sursum quidem , qualis-unique sit , malum *Aph. IV. 25.*

A sanguinis vomitu tabes , & puris purgatio sursum . *Aph. VII. 78.*

LETHALIS.

Qui sanguinem evomunt cum febre multa , dolore ad mammam , thoracem & dorsum : quibus , inquam , haec insunt omnia , ii brevi moriuntur : quibus autem non omnia , neque intense adsunt , tardius . Ad summum autem , diebus 14. inflammationem concipiunt , *Coac. 426.*

AD THERAPIAM.

Curandum refrigerantibus , & astringentibus . *Aph. VII. 37.*

VOMITVS NIGER .

AD DIAGNOSIN.

NOTAE ANTECEDENTES.

In his , qui varie morbum trahunt , & mente moventur , si subinde sopor incidat , praenuncia expectandam esse nigram vomitionem . *Coac. 103.*

Crebrae in phreniticis cum perfrigeratione sputationes , nigrorum vomitionem praenunciant . *Coac. 102.*

Crebrae , iisdem perseverantibus casibus , morborum reversiones , impendente indicatione sanguinem profundentes , nigram vomitionem excitant . *Coac. 122.*

Lingua praeter rationem mollis reddita , ac nauseabunda , cum sudore frigido , ac alvo liquida , nigrae vomitionis significationem adfert . *Coac. 232.*

Lumborum dolor ad os ventriculi recurſans, cum febre, horrore, multorum tenuium & aquoſorum vomitu, delirio, & vocis defectione. *Praediſt. I. 83.*

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Humeroꝝ dolores, qui ad manus tendunt, torporesque & dolores exhibent, abſceſſus certe non conſequantur, at bilis atrae vomitione ſanantur. *Praediſt. II. 172.*

DETERIORIS NOTAE.

Vomitio nigra, cum laſtitudinis ſenſu, poſt linguam mollem redditam, ac naſeabundam, cum ſudore frigido, ab alvo liquida. *Coac. 232.*

LETHALIS.

Morbis quibuſvis incipientibus, ſi bilis atra vel ſuſum, vel deorſum prodierit, lethale. *Aph. IV. 22.*

Vomitio nigra, cum dolore capitis, levi ſurditate, manuum tremore, cervicis dolore, & urinis nigricantibus, ac denſis. *Coac. 176.*

AD THERAPIAM.

Qui nigra vomitione refundunt, &c. eos medicamentis purgare, tutum non eſt. *Praediſt. I. 71.*

VOMITVS MEDICVS.

INDICANTIA.

Purgandum, aeſtate quidem, magis ſuperiores ventres; hieme vero, inferiores. *Aph. IV. 4.*

Graciles, & facile vomentes, ſuſum purgandi, vitantes hiemem. *Aph. IV. 6.*

Non febricitanti, appetitus deieſtus, & oris ventriculi morſus, & tenebriſoſa vertigo, & os amareſcens, ſuſum purgante opus eſſe, indicat. *Aph. IV. 17.*

Supra ſeptum tranſverſum dolores, qui purgatione egent, ſuſum purgante opus eſſe, indicant. Qui vero infra, deorſum, *Aph. IV. 18.*

Sudor multus, calidus aut frigidus, semper fluens, humidi redundantiam habere significat. Educere igitur oportet, robusto quidem, superne: debili vero, inferne. *Aph. VII. 61.*

CONTRAINDICANTIA.

Tempus hiemale. *Aph. IV. 6.* Caniculare. *Aph. IV. 5.* Quibus alvi sunt lientericae, eos hieme sursum purgare, malum est. *Aph. IV. 12.*

Difficulter vomentes, & mediocriter carnosi, deorsum purgandi, vitantes aetatem. *Aph. IV. 7.*

Tabidi vero, vitantes (purgationes) sursum. *Aph. IV. 8.*

REGVLAE THERAPEVTICAE.

Corpora oportet, ubi quis purgare vult, facile fluentia reddere. Et si quidem velit efficere facile fluentia sursum, alvum sistere: si vero deorsum, humectare. *Aph. VII. 76.*

Si qualia purgari oportet, purgentur, confert, & facile ferunt: si vero contraria, difficulter. *Aph. I. 25. IV. 3.*

Alvum constipatam solvit vomitus, & nimis fluxam sistit. *De Diet. II.*

VOX.

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Facies ex tumida depressa, ac vox levior, & remissior evadens, spiritus quoque rarior ac lenior, postera die remissionem fore, denunciat. *Coac. 211.*

Dolor capitis, cum sedis ac pudendorum dolore, torpore ac impotentiam adfert, vocemque exsolvit, neque ista molestiam exhibent. Verum ex his somnolenti, ac singultuosi nono mense evadunt, & voce libera reddita in integrum restituuntur. *Coac. 164.*

DETERIORIS NOTAE.

In homine moderato, ferox & audax responsio, & vox acuta, malum portendunt. Iis praecordia intro trahuntur, & tendunt. *Coac. 51. Praedict. I. 44. 45.*

Vox acuta, & stridula, malo est. *Praedict. I. 47.*

Confractae voces, post medicamenti purgantis potionem, considerandae, num pravae sint? Horum plerisque tenues sudores diffuunt, & alvi humectantur. *Coac.*

251.

LETHALIS.

Desipientiae, cum voce stridula, linguae revulsione, ac ipsi quoque tremuli, vehementem mentis alienationem significant. In his durities, aut asperitas, perniciem minatur. *Coac.* 99.

Alvi solutio, quae praeter rationem accidit, cum voce tremula, in his, diutius perseverante perturbatione, perniciēs intentatur. *Coac.* 258.

Vbi ex vomitu anxietudo occupat, vox stridula est, oculi pulvere obiti, insania portenditur; ac tales vehementi insania correpti, voce defecti intereunt, *Coac.* 561,

In opisthotono, ubi per initia vox defecta fuit, clamare, aut nugari, lethale; postridie enim adfuturam mortem significat. *Coac.* 361.

VOX CONVULSIONES PORTENDENS.

Vox acuta, eiulabunda, ac oculorum hebetudo, convulsionem minantur. His dolores ad inferiores partes demissi, toleratu sunt faciles. *Coac.* 257.

CONF. RESPIRATIO, CAPITIS DOLOR.

VOCIS DEFECTIO. APHONIA.

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Quae ex rigore sunt vocis defectiones, tremore solvuntur; atque eos, qui subinde novo rigore corripiuntur, succedentes tremores iudicant. *Coac.* 27.

Qui in febre assidua defecti iacent, & oculis conniventibus nictantur, hi evadunt, si post sanguinis ex naribus fluxum, ac vomitum, ad loquelam, & ad seipsos redeant. *Coac.* 77.

DE-

DETERIORIS NOTAE.

In febre cum sudore, vocis ex capitis dolore defectiones; si per se resolvuntur aegri, ac praeter voluntatem excrementa remittantur, malumque remitti videatur, diuturni morbi metus est. In his subinde obortus rigor, damari non debet. *Coac.* 253. *Praedict.* I. 93.

Vocis defectiones, cum virium exsolutione, pessimae. *Praedict.* I. 24.

Vocis defectiones, cum singultu, pessimae. *Praedict.* I. 23.

LETHALIS.

Vocis defectiones, cum virium exsolutione, in acuta febre, sine sudore, sunt quidem lethales: cum sudore vero minus, ac temporis diuturnitas significatur. Ac fortasse quidem, quibus ex morbi reversione tale quid contingit, securissime habent. Ex iis autem maximo in periculo versantur, quibus sanguis ex naribus profluit, & alvi effunduntur. *Coac.* 256.

Ex rigore vox intercepta, perniciem denunciat. *Coac.* 39. 255.

Vehementes insaniae, cum vocis defectione, perniciem intendant. *Coac.* 254.

Vocis defectio, ac tenuis sudor, cum perfrigeratione ex rigore, capitis ac cervicis dolore. *Coac.* 1.

Vocis defectio, cum febre assidua, & oculis conniventibus, nisi post haemorrhagiam narium, ac vomitum, ad loquelam, & ad seipsos redeant. *Coac.* 77.

Vocis defectiones in febre, quae convulsionis speciem praeseferuat, & in mentis emotionem cum silentio desinunt, perniciem ostendant. *Coac.* 248. *Praedict.* I. 54.

Quos vox cum febre, & absque ulla indicatione deficit, ii tremuli intereunt. *Coac.* 247. *Praedict.* I. 91.

Quibus voces cum dolore deficiunt, ii tandem non sine summo cruciatu, vitam cum morte commutant. *Coac.* 249. *Praedict.* I. 55.

In vocis defectione, respiratio, velut iis qui suffocantur, conspicue elata, & visui exposita, perniciem minatur. Animadvertendum etiam est, num delirium praenunciet. *Coac* 252. *Praedict.* I. 25.

Quos palpitaciones in totum occupant, num voce defecti intereunt? *Coac.* 347.

In iis, qui longo tempore consumpti sunt, temerariae, & quae praeter rationem fiunt, alvi exsolutiones, una cum vocis defectione tremula, perniciem denunciant. *Coac.* 634.

VOCIS DEFECTIO CONVULSIONEM PORTENDENS.

Animadvertendum est, num vocis defectiones, cum alto sopore, convulsionem minentur? *Praedict.* I. 123. **TABEM.**

Crebrae, & quae cum sopore quodam consistunt, vocis defectiones, tabem denunciant. *Coac* 259.

VRETRA.

Quibus in fistula urinaria tuberculum nascitur, his suppuratio, eo & perrupto, solutio fit. *Aph.* IV. 82. VII. 57.

VRINA IN GENERE.

AD DIAGNOSIN.

Per vesicam prodeuntia inspicere oportet, an sint, quae fanis prodeunt. Quae igitur minime his similia, ea morbosiora: fanis vero similia, minime morbosa. *Aph.* VII. 66.

Quibus urinae distantes fiunt, iis vehemens est in corpore turbatio. *Aph.* VII. 33.

Quibus rigor adest, iis urina resistat. *Coac.* 29.

AD PROGNOSIN.

VARIAE NOTAE.

Et urinae, & alvi excrementa, & sudores, cum apparent, vel indicatu faciles, vel difficiles, vel breves, vel longos morbos ferre, indicant. *Aph.* I. 12.

Alvi

Alvi egestionēs, & urinae, probe secedentes, bonae: si vero nihil ex conducentibus excernatur per haec loca, malum. *Aph. IV. 47.*

In febre, variarum interdum urinarum mictiones, morbum produciunt. *Coac. 595.*

VRINA DETERIORIS NOTAE.

Vrinae laboriosae damnantur, atque ab his detentae rubrae quaedam efflorescentiae, & aeruginosae, parvaeque veluti quaedam stillae apparentes. *Praedict. I. 59.*

In praecipitibus morbis periculum denunciat urina, quae colore ac sedimento variat, praecipueque in iis, quae ex capite fiunt defluxionibus. *Coac. 578.*

In tumoribus ad aures, urinae celeriter ac paucopore concoctae, damno sunt. Quin & perfrigerari. itidem malum est. *Coac. 295. 587.*

Vrinae derepente praeter rationem parum concoctae, vitiosae sunt. Ac in totum, quae in morbo acuto urina praeter rationem cocta est, vitium denotat. *Coac. 579.*

Mala quoque, quae post potionem celeriter meitur, praesertimque in lateris doloribus, & pulmonis inflammationibus. *Coac. 579.*

In hydropse sicco, urina stillatim effluens, malum denunciat. Mala quoque est, quae exigua habet sedimenta. *Coac. 453.*

VRINA LETHALIS.

Vrinae, quae non sentientibus effluunt, alias perniciem denunciant. Animadvertendum, num tales his reddantur, quales sunt, ubi subsidentiam conturbaveris. *Coac. 596. Praedict. I. 29.*

Perniciosa est urina, quaecunque infcio aegro redditur. *Coac. 580.*

Quibus incogitantibus urina decedit, ac pudendum contrahitur, ii desperati sunt. *Coac. 474.*

Exitiosiores sunt urinae foetidae, & aquosae, & nigrae, & crassae. *Progenot. 76.*

Ad haec, in viris quidem, & mulieribus, urinae nigrae: in pueris aquosae, deterrimae. *Praenot.* 77.

VRINAE COPIA.

EXCEDENS.

Mictio noctu multa contingens, parvam deiectionem significat. *Aph.* IV. 83.

In praecordiorum dolore, cum aliquo mutmure, succedens lumborum dolor, in febribus, alvos plerumque humectat, nisi flatus eruperit, aut urinae copia prodierit. *Coac.* 291.

Loquendi impotentia in convulsionibus solvitur, magna urinarum confertim & derepente prodeuntium abundantia. *Coac.* 359.

Quibus circa initia alvus turbatur, urinae autem paucae sunt, temporis progressu alvus quidem resiccatur, urina vero tenuis abundat, his abscessus ad articulos fiunt. *Coac.* 619.

DEFICIENS.

Vesica intercepta, praesertim cum capitis dolore, convulsionem minatur. *Praedict.* I. 126.

Vrinarum, in praecipitibus malis, ex perfrigeratione interceptiones, pessimae. *Praedict.* I. 51. *Coac.* 5.

Vrinae, quae cum rigore resistarunt, malum & convulsionem praenunciant, tum vero praecipue, si antea alto sopore aeger detentus fuerit. In his autem abscessus ad aures sperare oportet. *Coac.* 25.

VRINAE CONSISTENTIA.

TENVIS.

In febribus longis, pravis, vagis, tenuium urinarum eiectiones, lienis affectionem denunciant. *Coac.* 594.

Quibus urinae crassae, grumosae, paucae, non sine febre, copia ex his succedens tenuis, iuvat. Tales autem maxime prodeunt, quibus ab initio, aut brevi subsidentiam continent. *Aph.* IV. 69. *Coac.* 597.

In

In pueris urina tenuis, magis pernicioſa, quam craſſa.

Coac. 580. *Praenot.* 77.

In pulmonis inflammatione, quibus circa initia urinae craſſae ſunt, dein ante 4. diem tenues evadunt, mors impendet. *Coac.* 415. 580.

Urina diluta, aut arenida, & facile diſſolubili aſperitate returbata, liquidam fore alvum denunciat. *Coac.*

583.

Qui circa initia tenuiter febricitantes, ad indicationem cum capitis pulſatione, & urina tenui ingraveſcunt, eos mentis emorione, ac inſuper pervigilio corripit, nil mirandum eſt. *Coac.* 81.

Urina cruda, quae ſic diu perſeſerat, ut reliqua ſigna ſalutaria ſint, abſceſſum & dolorem, praecipueque infra ſeptum tranſverſum, denunciat. Doloribus vero ad lumbos oberrantibus, ad coxam, idque in febre, & ſine febre. *Coac.* 582. *Praenot.* 78.

Urinae praeter conſuetudinem tenues, & crudae, abſque repletionem, morbo comitiali obnoxiiſ, novum inſultum denunciant, &c. *Coac.* 599.

CRASSA.

Quae urina admodum tenuis, ſpiſſa evadit, fortaiſſe erupturum ſudorem indicat, iam autem erupiſſe; quae ſpumam in ſe ipſam inſidentem habet. *Coac.* 583.

Urina returbida, cum ſudore, morbi reverſionem ſignificat. *Coac.* 482.

Quibus in febre urinae conturbatae, qualis iumentorum, hiſ capitis dolores aut adſunt, aut aderunt. *Aph.* IV. 70. *Coac.* 582.

Quibus in urina craſſa exiſtente, furfuracea ſimil min-
guntur, iis veſica ſcabie laborat. *Aph.* IV. 77.

Urina membranola, convulſionem ſignificat. *Coac.* 582.

Febres cum poſteriorum partium diſtentione, urinae genitale ſemen referentes ſolvunt. *Coac.* 362.

Urina, quae ante rigorem oleoſa redditur, mala. *Coac.*

579.

Vri-

Vrina, quae grandinem refert, & geniturae similis effunditur, itemque dolorem exhibet, perniciem indicat. *Coac.* 580.

VRINAE COLOR.

ALBICANS.

Quibus spes est abscessum fore ad articulos, eos abscessu liberat urina multa, & crassa, & alba reddita, qualis in febribus, cum lassitudine, 4. die quibusdam fieri incipit. Si vero etiam ex naribus sanguis eruperit, brevi admodum solvit. *Aph.* IV. 74.

In convulsione, confert urinae vitreae copiosus pertransitus. *Coac.* 358.

Vrina diluta, & alba, in diuturnis morbis perseverans, difficilem, & non securam iudicationem facit. *Coac.* 576.

Quibus urinae pellucidae, albae, malae. Maxime autem in phreniticis observantur. *Aph.* IV. 72.

Vrinae cineritiae, cum spirandi difficultate, aquam intercutem denunciant. *Coac.* 582.

Febre ardente, cum alto stupore (quem catochum dicunt) detentis, exalbida urina pessima est. *Coac.* 581.

RVBICVNDVS.

Quoad urina fulva fuerit, & tenuis, crudum esse morbum indicat. Quod si diutius talis urina perseveret, periculum est, ne non possit aeger sufficere, quoad urina concoquatur. *Praenot.* 75.

Laterum dolore affectis, urina aliquantulum rubra, levem habens subsidentiam, securam iudicationem praenunciat. *Coac.* 586. *Praenot.* 72.

Vrina admodum rubra, & bene florulenta, sedimentum pallidum, leve, ac parum habens, diuturnum valdeque turbulentum morbum fore, & in alium transiturum, non tamen perniciosum, designat. *Coac.* 586.

In praecipitibus morbis periculum denunciat urina biliosa, neque aliquantulum rubra, & quae hordei tosti,

non

non exacte moliti, crassioribus frustulis similia habet
sedimenta. *Coac.* 578.

Procedente morbo surditas, ac urina subrubra, cum
nullo sedimento, sed cum sublimamentis in medio in-
natantibus, mentis emotionem praenunciant. *Coac.*
148.

NIGRICANS.

In praecipitibus malis, iuxta tenues circa caput maxime
sudores, & corporis incontinentiam, urinae nigrae,
cum spiritu magno, & concitato, perniciem inten-
dunt. *Coac.* 49.

Urinae nigricantes, & densae, cum nigra vomitione, &c.
perniciosae. *Coac.* 175.

Perniciem indicat urina, in qua nigrum est quod subsi-
det, & quae nigra est. *Coac.* 580.

COLOR VARIVS.

In praecipitibus morbis, periculum denunciat urina al-
ba, & quae colore ac sedimento variat, praecipueque
in iis, quae ex capite fiunt, defluxionibus. *Coac.* 578.

Perniciem praefert, quae ex nigra in biliosam te-
nuem transit, & quae sedimentum habet divulsam,
quaeque ex his, quae densata per urinam feruntur,
quod subidet, habet aliquantulum livescens, & limo-
sum. *Coac.* 578.

In morbis acutis, urinae quae ex viridi pallescunt,
nec in colore persistunt, malae. *Coac.* 579.

Laterum dolore affectis, in propinquo mortem esse si-
gnificat, quae viridis nigrum habet sedimentum, aut
furfuribus simile. *Coac.* 581.

VRINAE CONTENTA.

VARIA.

Quibus in urinis bullae superstant, renum affectiones si-
gnificant, & longam fore invaletudinem. *Aph.* VII. 34.

Quibus autem pingue est, & confertum, quod super-
natat, his affectiones nephriticas, & acutas significat.
Aph. VII. 35.

Qui.

Quibus in urina crassa existente, carunculae parvae, aut veluti pili una exeunt, his de renibus excernuntur. *Aph. IV. 76.*

Si quis sanguinem, aut pus mingat, renum aut vesicae exulcerationem significat. *Aph. IV. 75.*

Si quis sanguinem, & pus mingat, & squamas, & odor gravis sit, vesicae exulcerationem significat. *Aph. IV. 81.*

Pinguedines supra innatantes, araneorum telas referentes, damnare oportet, colliquationem namque significant. *Praenot. 79.*

Missiones membranulatum speciem referentes, cum cervicis ac dorsi perfrigerationibus, ac multo magis quae totum corpus pervadunt, convulsiones portendere videntur. *Coac. 83. 584.*

Urina purulenta, ac vitrea, affatim reddita, cum sedimento laudabili, &c. morbos acutos solvit. *Coac. 150.*

Quibus inferiores partes male afficiuntur, vehementibus pruritibus prius obortis, iis urina fabulosa fit, & subsistit. At qui perniciose habent, iis mens obtorpescit. *Coac. 488.*

Urina cruenta circa initia reddita, morbi diuturnitatem significat. *Coac. 582.*

NVBECVLA.

Quibus morbi septima die iudicantur, iis nubeculam rubram urina die 4. continet, & alia secundum rationem. *Aph. IV. 71.*

Nubeculae, quae per urinas feruntur, albae quidem, bonae; nigrae vero, malae sunt. *Praenot. 74.*

In urinis, quae nubeculas habent, considerandum venit, an superne, an inferne fiantur, & quosnam habeant colores. Et quae quidem deorsum feruntur, cum dictis coloribus, bonae censendae, & commendandae: at quae sursum feruntur, malae, & vituperandae. *Praenot. 80.*

Urinae tenues, nubeculam quamdam in medio affumentes, rigorem denunciant. *Coac. 538.*

In urinis nubeculae, albae quidem, & quae infimum locum tenent, utiles sunt: rubrae vero, nigrae, ac lividae, molestiam exhibent. *Coac.* 577.

In errantibus febribus, nigrae nubeculae quartanam denunciant. *Coac.* 582.

Urinae decolores, suspensa quaedam in medio nigra habentes, cum pervigilio & perturbatione, phrenitidem denunciant. *Coac.* 582.

In tertianis cum horrore, nubeculis nigris similia, inconstantem horrorem indicant. *Coac.* 584.

SVSPENSVM. ENAEOREMA.

Surarum dolores maligni sunt, ac mentis emotio, tum vero praecipue, si sublime quid in urina innatet. *Coac.* 30.

Laboriosae urinae damnantur; atque ab his detentae rubrae quaedam efflorescentiae, & aeruginosae; parvaeque veluti quaedam stillae apparentes. *Praedict.* I. 59.

In his, in quibus speramus abscessus circa aures futuros, considerandum, num urina diluta, cum sublimibus quibusdam in medio suspensis, albidis, & aliquantum variantia, exalbicantia, aut graveolentia, appareant? *Coac.* 203.

SEDIMENTVM. HYPOSTASIS.

AD DIAGNOSIN.

Quibus in urina arenosa subsident, illis vesica calculo laborat. *Aph.* IV. 79.

Quibus febricitantibus, in urinis subsidentiae fiunt crassiori farinae similes, longam infirmitatem significant. *Aph.* VII. 3.

Quibus autem biliosae subsidentiae, ab initio vero tenues, acutum morbum significat. *Aph.* VII. 32.

Quae emittitur urina, in qua quod subsidet, pinguedinem habet, febrem significat. *Coac.* 582.

Quae vero sputo similia habet sedimenta, aut limosa, rigorem denunciat: quae araneorum telis similia quaedam habet, colliquationem. *Coac.* 582.

AD

AD PROGNOSIN.

MELIORIS NOTAE.

Quibus in urinis cito aliquid subsidet, hi brevi indicantur. *Coac.* 598. *Aph.* IV. 69.

Vrina optima est, in qua per omne tempus, quoad morbus indicatus fuerit, subsidet album, leve, & aequale. Securitatem enim, brevemque morbum fore significat. *Praenot.* 70.

At urina subrubra, simileque quod subsidet; & leve, haec longe quidem diuturnior, quam prima sit, valde tamen salutaris. *Praenot.* 72.

Vrina in febre album & leve depositum habens sedimentum, celerem liberationem denunciat. Celerem quoque, quae diluta indiscretam habet pinguedinem. *Coac.* 575.

Quae aliquantulum rubet, subrubrum habet sedimentum, & leve, siquidem ante 7. diem appareat, 7. die solutionem fore designat: post 7. autem, tardior, aut plane diuturnam. *Coac.* 575.

Quae 4. die subrubram nubeculam capit, 7. die liberat, dum reliqua pro ratione habeant. *Coac.* 575.

Febriticare incipientibus, sanguinis stillationes cum ster-
nutatione accedentes, & quod in urina desidet album, 4. die visum, 7. solutionem affore denunciant. *Coac.* 149.

Vesica graviter laborantes, metu liberat urina purulenta procedens, in qua album, & leve, subsidet. *Coac.* 471.

DETERIORIS NOTAE.

Si urina intermittat, & interdum quidem pura meiat, interdum etiam subsideat album & leve, diuturnior, & minus securus morbus evadit. *Praen.* 71.

Sedimenta in urinis, crassiores hordei tosti non exacte moliti partes referentia, prava sunt; hisque peiora, laminis similia. Alba vero, & tenuia, valde prava: atque his etiam deteriori, furfuracea. *Praenot.* 73.

Quibus feblicitantibus, in urinis subsidentiae sunt, cras-
sior

fiori farinae similes , longam infirmitatem significant.

Aph. VII. 31.

Urina tenuis , & biliosa , & aegre lentum habens sedimentum , & quae in melius ac deterius commutatur , temporis diuturnitatem postulat. Quod si istud diutius perleverat , aut ad indicationem temporis longinquitas requiratur , periculo non vacat. *Coac. 575.*

In praecipitibus morbis periculum denunciat , urina biliosa , neque aliquantulum rubra , & quae hordei tosti non exakte moliti crassioribus frustulis similia habet sedimenta. *Coac. 578.*

Urina , in qua quod subsidet , bonum est , & derepente evanescit , dolorem ac mutationem denunciat. At quae sedimentum habet , returbida , residens , rigorem circa indicationem , forte etiam & in tertianam , aut quartanam transitum , *Coac. 485.*

LETHALE.

In laterum doloribus , urina cruenta , obscura , cum eo quod subsidet vario & indiffereto , ut plurimum in 14. diebus mortem adfert. Laterum quoque dolore affectis , in propinquo mortem esse significat , quae viridis nigrum habet sedimentum , aut fuscis similibus. *Coac. 581.*

UTERVS.

AD DIAGNOSIN.

Quae frigidos ac densos uteros habent , non concipiunt , & quae praeumidos habent uteros , non concipiunt , extinguitur enim ipsis genitura. Et quae siccos magis , & adurentes : alimenti enim inopia semen corrumpitur. Quae vero ex utrisque temperamentum habent moderatum , hae ipsae proliferae sunt. *Aph. V. 62.*

Quae in utero gerunt , harum os uteri clausum est. *Aph. V. 51.*

Quibus os uteri durum est , his necesse est os uteri clausum esse. *Aph. V. 54.*

AD PROGNOSIN.

Vtero inflammato, urinae stilloidum supervenit. *Aph. V. 58.*

Si mulieri praegnantis erysipelas in utero fiat, lethale.

Aph. V. 43.

Vterorum procidentia, cum aliis notis, lethalis. *Coac. 526.*

Vterinae ventris duritates, cum dolore, celerem perniciem denunciant. *Coac. 528.*

AD THERAPIAM.

Vtero calidum amicum, frigidum vero inimicum. *Aph. V. 22.*

Si uterus coxae incumbens suppuratus fuerit, necesse est medicamenta in linteo carpto applicari. *Aph. V. 47.*

UTERI FLVOR ALBVS, ET FVLVVS.

AD DIAGNOSIN.

Fluxus albus in senioribus mulieribus magis fit, quam in iunioribus. *De Morb. Mul. II. V. 1.*

Quum fluxus albus obortus fuerit, velut urina asinina apparet. Et dolor inum ventrem habet, & lumbos, & lateris mollitudinem; & tumores sunt crurum ac manuum; & cava elevantur; & oculi humidi sunt, & color arcuatus, ac albus fit. Et cum iter facit, anhelat. *De Nat. Mul. XV. 1. ad. 8.*

Fluxus fulvus fluit, velut ex ovo vitioso, multus & graveolens; & uteri inflammantur, & dolor ex lumbis, & inguinibus emergit; & prodeuntia mala sunt, & si non liberetur, celeriter fluentia. At etiamsi tempus accedat, quae restant, putrefacit, quam maxime id fieri potest. Riget enim, & velut a carnibus assatis humor d. fluit, & cum his simul febres fortes, ac rigores fiunt. Ex huiusmodi vero fluxionibus multae pereunt, paucae effugiunt. *De Morb. Mul. II. VIII. 1. ad. 8.*

UTERI FLVXVS RVBER. HAE-
MORRHAGIA.

AD DIAGNOSIN

CAVSAE ANTECEDENTES.

Mora

Morbus hic maxime fit ex abortu. *De Morb. Mul. II. V. 11.*
Fit &, quum menses multo tempore retenti derepente
eruperint. *Ibid. 12.*

Morbus hic ex partu maxime corripit, si quid in ipsa
dilaniatum non prodierit, sed intus computruerit,
& foetus exasperatus fuerit. *De Morb. Mul. II. VI. 11.*

NOTAE COMITANTES.

Si fluxus in uteris obortus fuerit, sanguis multus fluit,
& grumi compacti excidunt; & dolor occupat lum-
bos, & laterum mollitudinem, ac imum ventrem;
& durus est venter, & ad contactum dolet; & ri-
gor ac febris acuta corripit; & debilitas oboritur;
& omnia praeter humeros, ac scapulas dolet; & ca-
lor invadit, & rubescit, & venae durae fiunt, ac
renitentes. *De Morb. Mul. II. V. 1. ad 10.*

Ruber fluxus fluit talis, qualis sanguis victimae recens
mactatae, & grumi pellucentes. Aliquando vero e-
tiam fluxum rubrum emittit, & venter imus attolli-
tur, & attenuatur, & impotens fit, & indurescit,
& ad contactum dolet, velut ulcere praesente; &
febris habet, & dentium fremitus; & dolor ad ipsa
pudenda, & pubem, & lateris mollitudinem, &
lumbos, & tendinem, & ventrem; & pectus, &
scapulas irruit; & alias partes omnes dolet; & im-
potentia ac pusillanimitas occupat; & color mutatur.
In principio quidem morbi haec corripunt. Si vero
haec omnia moram trahant, adhuc magis debilitatur;
& manifestus est morbus, & cavae partes attolluntur,
& pedes intumescunt. *De Morb. Mul. II. VI. 1. ad 10.*

AD PROGNOSIN.

Sanguinis fluxus, si 4. die oriatur, diuturnitatem in-
dicat, & alvus effunditur, cruraque intumescunt.
Coac. 533.

Si fluxui muliebri convulsio, & animi deliquium super-
veniat, malum. *Aph. V. 56.*

VTERI SVFFOCATIO, *vid. HYSTERICA AF-
FECTIO.*

VVA MORBUS.**AD DIAGNOSIN.**

Si uva morbus in faucibus fiat, summa gurgulionis pars aqua impletur, & rotunda fit, ac pellucida, & spirationem intercipit. *De Morb. II. XXIX. 1. 4.*

AD PROGNOSIN.

Si maxillae ab utraque parte inflammatae fuerint, suffocatur. Si vero ipse morbus per se consistat, maxillis non inflammatis, minus moritur. *Ibid. 5. 6.*

AD THERAPIAM.

Auxilia: gurgulionem digito apprehensum sursum ad palatum apprimere, & summam ipsius partem praefecare. Postea foliorum hortensium condimentarium decocto gargarizare, & farinam frigidam delingere, aquam insuper bibere; sed non lavare. *Ibid. 7. ad 11.*

VVAE.

Calidae & humidae sunt, alvumque laxant, praesertim albae. *De Diet. II.*

VVLNVS.**AD PROGNOSIN.****MELIORIS NOTAE.**

Minime ab his vulneribus mors impendit, quae in corporis partes minus nobiles, aut a nobilibus quam longissime remotas, infliguntur. *Coac. 509.*

DETERIORIS NOTAE.

Vbi dissectum fuerit os, aut cartilago, aut nervus, aut genae pars tenuis, aut praeputium, neque augetur, neque coalescit. *Aph. VI. 19. VII. 28. Coac. 504. 505.*
Si, magnis & pravis existentibus vulneribus, tumores non appareant, ingens malum. *Aph. V. 66.*

Bilis vomitus vulneri succedens, malum denunciat, praecipueque in capitis vulneribus. *Coac. 507.*

NOTAE VVLNERIS LETHALIS.

RATIONE PARTIS LAESAE.

Si ex intestinis tenuibus aliquod dissectum fuerit, non coalescit. *Aph. VI. 24. Coac. 503.*

Cui perfecta est vesica, aut cerebrum, aut cor, aut septum transversum, aut aliquod ex intestinis tenuibus, aut ventriculus, aut hepar, lethale. *Aph. VI. 18.*

Ex vulnere fere mors contingit, si cui vulneratum fuerit cerebrum, aut spinalis medulla, aut iecur, aut septum transversum, vel cor, aut vesica, aut quaedam grandis vena, *Coac. 509.*

Mors quoque subit, si in arteriam, & pulmonem, insignes valde plagae inflictæ sunt, ita ut percussio pulmone, minor sit, qui per os prodit spiritus, quam qui per vulnus excedit. *Coac. 509.*

Intereunt vero, quibus nervi interiores, sive tenuis aliquis, sive crassus, vulnus acceperit, si plaga transversa fuerit, & magna: quod si parva, & recta, nonnulli periculo eximuntur. *Coac. 509.*

Vulnera fere mortem adferunt, quae magnas venas, quae sunt in collo, & inguinibus, laeserunt; deinde quae cerebrum, & hepar; deinceps quae in intestina, & vesicam pertingunt. Quae sane omnia magnam perniciem adferunt, non eam tamen, ut (quod quidam existimant) nemo ex his servari possit. Nam & his nominibus praediti loci multum inter se differunt, atque ipsi modi. Nec parum etiam cuiusque corporis constitutio differt. *Praedict. II. 68.*

RATIONE SYPTOMATVM.

Vulneri convulsio superveniens, lethale. *Aph. V. 2. Coac. 506.*

Quibuscunque, ex morbis acutis, aut ex diuturnis, aut ex vulneribus, aut aliter quocunque modo extenuatis, bilis atra, vel qualis sanguis niger, prodierit, postmodum moriuntur. *Aph. IV. 23. De Loc. in hom, XLIV. 5.*

Qui

Qui ex vulnere subinde rigentes, sanguinem profundunt, ii maligne habent, ac inter loquendum deridente moriuntur. *Coac.* 328.

Ex cerebri vulnere, febris utplurimum, ac bilis vomitus succedit, & corporis resolutio, iique perniciose habent. *Coac.* 300.

NOXAE QVAEDAM VVLNERIBVS SVCCEDENTES.

In vulneribus, quae in supercilium, aut paulo altius inferuntur, visus acies obtunditur; & quo vulnus recentius est, eo magis vident; inveterascente autem, aut tardante cicatrice, magis obtundi solet. *Coac.* 510.

Quibus ex vulnere corporis impotentia accidit, ii quidem, febre citra rigorem oborta, sani evadunt; alioqui dextra aut sinistra parte fiderantur. *Coac.* 477.

Contingit (capite vulneratis) etiam vomitus accedere, & ad finem convulsiones; & ut clangorosam vocem edant, ac impotentes fiant; & si in dextris fuerit vulnus, in sinistra parte: si vero in sinistris, in dextra. *Epid. VII. XIX. 6. ad 9.*

Vulnere in thoracem accepto, siquidem externa vulneris pars sanitatem receperit, interna vero nequaquam, suppurationis periculum impendet. Quibus autem interni vulneris cicatrix debilis effecta est, prompte rescinditur. *Coac.* 430.

AD THERAPIAM.

Auxilia: vulneratos fame affligere, alvum subducere, aut per clysterem, aut pharmaco infra purgante; in potu aquam, aut acetum, aut sorbitiones dare; inflammata cataplasmatibus frigesacere. *De Affect. XXXVII. 1. ad 4.*

F I N I S.

THE
[Faint, illegible text follows in several paragraphs, appearing to be a historical or literary document.]

FINIS

